

## КРУГЛОРОТЫЕ И РЫБЫ

Б. С. Туниев

Разрозненные сведения о фауне рыб западнокавказского биосферного региона можно почерпнуть из работ К.Ф. Кесслера (1879), К.Н. Россыкова (1890), Ф.Ф. Каврайского (1896), Л.С. Берга (1912; 1948-1949), А.И. Александрова (1927), Г.П. Барача (1941). Однако самой заповедной территории посвящена единственная статья (Туниев, 1987).

На территории Кавказского государственного биосферного заповедника зарегистрировано обитание 1 вида круглоротых и 24 форм 20 видов рыб. Из них 85% представлены эндемичными кавказскими формами. Общее число видов круглоротых и рыб, встречающихся в Кавказском заповеднике и сопредельном Сочинском национальном парке достигает 31. Виды, обитающие в настоящее время на территории заповедника, имеют порядковый номер, вне его территории — обозначены значком «—».

### КРУГЛОРОТЫЕ

#### Семейство Миноговые - *Petromyzonidae*

1. Украинская минога - *Eudontomyzon mariae* Berg (*Eudontomyzon mariae mariae* Berg (Holciik) (1). Встречается в нижнем и среднем течении относительно крупных рек Сочи (Псоу, Мзымта, Шахе, Псеуапсе). В заповеднике отмечена в Западном отделе, в долине р. Шахе.

### РЫБЫ

#### ОТРЯД ОСЕТРООБРАЗНЫЕ - *ACIPENSERIFORMES*

##### Семейство Осетровые - *Acipenseridae*

2. Русский осетр - *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt. Рансе был обычен в нижнем течении рек Мзымта и Псоу, в последние годы отмечаются единичные заходы.

## ОТРЯД СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ - CLUPEIFORMES

### Семейство Лососевые - Salmonidae

- 3а. Черноморская кумжа - *Salmo trutta labrax* Pallas (4). Проходный вид, поднимающийся на нерест в реки Псезуапсс, Шахе, Сочи, Хоста, Мзымта, Псоу и их притоки. В начале XX века, по личным наблюдениям Х.Г. Шапошникова, встречался у северной границы заповедника (Берг, 1812). В настоящее время в заповеднике нерестовая популяция сохраняется только на южном макросклоне Западного Кавказа в бассейне р. Шахе (вверх до устья ручья Буший).
- 3б. Ручьевая форель - *Salmo trutta labrax morpha fario* L. Самая обычная рыба заповедника, встречающаяся почти во всех реках - от границ до участков рек в субальпийском поясе.
4. Радужная форель - *Salmo gairdneri irideus*. Акклиматизирована в бассейне р. Мзымта и расселяется по ее притокам. С 1982 г. отмечается в реках Южного отдела заповедника.

## ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ - CYPRINIFORMES

### Семейство Карповые - Cyprinidae

5. Кавказский голавль - *Leuciscus cephalus orientalis* Nordmann. Эндемик Западного Кавказа. В заповеднике встречается в Хостинском отделе.
6. Бобырец или калинка - *Leuciscus horysthenticus* Kessler. Встречается во многих реках Западного Закавказья, включая территорию Сочинского национального парка. Возможно нахождение в Хостинском отделе заповедника.
7. Колхидский голянь - *Phoxinus phoxinus colchicus* Berg (4). Эндемик Западного Закавказья. Обычный вид во всех реках Сочинского национального парка. В заповеднике многочисленная популяция обитает в р. Хоста и у границы Западного отдела в р. Шахе.
8. Колхидский подуст - *Chondrostoma colchicum* Kessler. Эндемик Западного Закавказья. В заповеднике обычен и многочислен в р. Хоста, заходит в охранную зону Западного отдела (р. Шахе).
- Западнозакавказский пескарь - *Gobio gobio lepidolaemus* Kessler. Обычный вид нижнего и среднего течения рек Сочинского национального парка от р. Аше до р. Псоу. В заповеднике не отмечен, но может быть найден в р. Хоста.
9. Северокавказский длинноусый пескарь - *Gobio ciscaucasicus* Berg. Эндемик Северного Кавказа. Вид отловлен в проточном озере на кордоне Черноречье. Не исключена возможность нахождения это-

- го вида в тепляках р. Малая Лаба между кордонами Черноречье и 3-я Рота.
10. Батумская шемая - *Chalcalburnus chalcoides derjugini* Berg. Эндемик Западного Закавказья. Единственный экземпляр отловлен в р. Хоста.
  - 11а. Южная быстрянка - *Alburnoides bipunctatus fasciatus* Nordmann. Эндемик Крыма и Западного Закавказья. В заповеднике в большом числе встречается в бассейнах рек Хоста и Шахе (до устья р. Монашка).
  - 11б. Русская быстрянка - *Alburnoides bipunctatus rossicus natio cubanicus* Berg (3). Эндемик бассейна р. Кубань. У границ заповедника встречается по притокам Большой Лабы в районе Загедана (Россигов, 1890) и в р. Малая Лаба у пос. Псебай (Берг, 1912).
  12. Верховка - *Leucaspis delineatus* (Heckel). Отмечена только в р. Хоста и ее притоках.
  - 13а. Колхидский усач - *Barbus tauricus escherichi* Steindachner. Эндемик Западного Закавказья. В заповеднике обычен в реках Хоста и Шахе.
  - 13б. Кубанский усач - *Barbus tauricus cubanicus* Berg. Эндемик бассейна р. Кубань. У границ заповедника встречается в районе Загедана (Россигов, 1890).
  14. Уклейка - *Alburnus alburnus* L. Экземпляр этого вида пойман в р. Хоста.
  15. Закавказская уклейка - *Alburnus charusini* Herzenstein. Эндемик Кавказа. В заповеднике встречается в р. Хоста.
  16. Кавказский, или малый рыбец - *Vimba vimba tenella* Nordmann (4). Крымско-кавказский эндемик. В заповеднике встречается в реках Сочи и Хоста (Берг, 1948-1949).
  17. Обыкновенный, или золотой карась - *Carassius carassius* L. Интродуцирован в пруду на Марьенкиной поляне в Северном отделе заповедника.
  - Красноперка - *Scardinius erythrophthalmus* L. Интродуцирована в водоемах Сочинского национального парка. В заповеднике отсутствует.
  - Горчак - *Rhodeus sericeus amarus* Bloch. Спорадично распространен в нижнем течении ряда рек Сочинского национального парка (реки Херота, Лоо и др.). В заповеднике отсутствует.
  18. Сазан - *Cyprinus carpio* L. Интродуцирован в искусственных водоемах Сочинского национального парка. В заповеднике интродуцирован в пруду на Шаропатиной поляне (Западный отдел).

**Семейство Вьюновые - Cobitidae**

19. Голец Крыницкого - *Nemachilus merga* Krynicki. Эндемик Кавказа. Обычен во многих реках Северного Кавказа. В заповеднике встречается по периферии Северного, Восточного и Юго-Восточного отделов, а также в верховье р. Пшеха.
20. Обыкновенный голец - *Nemachilus barbatulus* L. Редкий вид. Вблизи заповедника отмечен у пос. Псебай (реки Псебайка, Малая Лаба) (Берг, 1912).
- Щиповка - *Cobitis taenia* L. Обычный вид нижнего течения рек Сочинского национального парка. В заповеднике не обнаружена

**ОТРЯД БЫЧКООБРАЗНЫЕ - GOBIIFORMES**

**Семейство Бычковые - Gobiidae**

21. Бычок-кругляк - *Gobius melanostomus* Pallas. Эндемик Черноморского бассейна, заходит во многие реки. В заповеднике отмечен в р. Хоста.
22. Бычок-рыжик - *Gobius cephalarges* Pallas. В заповеднике обычен в реках Шахе (до устья р. Бушуйка), Ажу, Хоста.
23. Бычок-песочник, бабка - *Gobius fluviatilis* Pallas. Встречается в ряде рек Сочинского национального парка, в заповеднике отмечен в Хостинском отделе.

**ОТРЯД УГРЕОБРАЗНЫЕ - ANGUILLIFORMES**

**Семейство Угревые - Anguillidae**

24. Угорь речной - *Anguilla anguilla* L. (4). Редкий вид. Единственный экземпляр отловлен в р. Сочи.

**ОТРЯД КАРПОЗУБООБРАЗНЫЕ - CYPRINODONTIFORMES**

**Семейство Карпозубые - Cyprinodontidae**

- Миссисипская гамбузия - *Gambusia affinis* Baird et Girard. Интродуцирована во многие стоячие и полупроточные водоемы территории Сочи. В заповеднике отсутствует.

**ОТРЯД ОКУНЕОБРАЗНЫЕ - PERSIFORMES**

**Семейство Окуневые - Persidae**

- Речной окунь - *Perca fluviatilis* L. Найден в р. Восточный Дагомыс на территории Сочинского национального парка. В заповеднике вид отсутствует.

**ОТРЯД КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ - GASTEROSTEIFORMES**

**Семейство Колошковые - Gasterosteidae**

- 8) Трехиглая колюшка - *Gasterosteus aculeatus* L. Встречается в приустьевой части р. Мзымта. В заповеднике отсутствует.

**ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ  
АННОТИРОВАННОГО СПИСКА КРУГЛОРОТЫХ И РЫБ**

1. Берг Л. С. Рыбы бассейна Кубани // Ежегод. Зоол. Музея Имп. АН. 1912. Т.17, с.116-122.
2. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. 1 - III т. оми; изд. 4-е; М.-Л., изд. АН СССР, 1948-1949.
3. Красная книга Краснодарского края. 1994, Краснодар. кн. Изд. 275с.
4. Россиков К. Н. В горах Северо-Западного Кавказа // Изв. Русск. Геогр. Об-ва. 1890, Т.26, с. 193-256.
5. Гуннев Б. С. Ихтиофауна Кавказского заповедника // Охрана природы Адыгеи. Майкоп, 1987, с.169-173.