

ФЛОРА КАВКАЗСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Аннотированный список видов сосудистых растений заповедника

Сем. Aceraceae Juss. - Кленовые ✓

1. *Acer campestre* L. - Клен полевой. Повсеместно, в светлых и широколиственных лесах, по опушкам и полянам, по склонам и террасам иногда образует чистые древостои. До сред. (м.) (1-10). Бор.-евр.

2. *A. laetum* C.A. Mey. (*A. cappadocicum* auct. p.p.) - Клен красивый. Реликт. Как примесь в дубовых и буковых лесах, единично. До сред. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Древ.л.-колх. шрк.др.

3. *A. platanoides* L. - Клен остролистный. Как примесь в дубовых и в составе смешанно-широколиственных лесов, повсеместно. На г.Фишт изредка, на верхнем пределе леса. До сред. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Бор.-евр.

4. *A. pseudoplatanus* L. - Клен ложноплатановый, явор. Реликт. Повсеместно, как примесь в буковых и пихтовых лесах, образует и чистые древостои по террасовидным уступам, пологим склонам - «парковые кленовники». До сред. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-евр.

5. *A. trautvetteri* Medw. - Клен Траутфеттера, клен высокогорный. Реликт. Эндем. Повсеместно как примесь в пихтовых лесах. В виде чистых древостоев (или в смеси с явором) в «парковых кленовниках», по верхней границе леса - в криво-лесье. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-колх.

Сем. Adiantaceae (C.Presl) Ching - Адриантовые

6. *Adiantum capillus-veneris* L. - Адриантум венерин волос. Реликт. Редко, на влажных известняковых скалах. Нижн. (петр.) (1,8,9,10). Ксер.-средиз.

Сем. Alismataceae Vent. - Частуховые

7. *Alisma gramineum* Jej. (*A. loeselii* Gorski) - Частуха травянистая. Редко, по сырым местам, болотам. До сред. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

Сем. Alliaceae J.Agardh - Луковые ✓

8. *Allium candolleianum* Albov - Лук Декандоля. Эндем. Ред-

ко. На субальпийских лугах в верховье р.Мзымта. Верхн. (м.) (8).

9. *A.globosum* Bieb. ex Redoute - Лук шаровидный. Эндем. На каменистых склонах и в трещинах скал лесного и лугового пояса. До сред. (петр.) (1-9).

10. *A.kunthianum* Vved. - Лук Кунта. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Собран А.И.Лесковым на г.Фишт. До суб. (м.) (11).

11. *A.paniculatum* L. - Лук метельчатый. Нередко в сосняках, на скалах, сухих каменистых склонах лесного и субальпийского поясов. Редко (кс.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

12. *A.ruprestre* Stev. - Лук наскальный. Редко, на каменистых склонах лесного и лугового пояса. До верх. (петр.) (8-9).

13. *A.ruprechtii* Boiss. - Лук Рупрехта. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Г.Абаго. Верхн. (петр.) (3).

14. *A.saxatile* Bieb. - Лук скальный. На скалах субальпийского пояса. Очень редко г.Фишт, скалы у истоков р.Белая. До средн. (петр.) (11).

15. *A.schoenoprasum* L. - Лук скорода. На лугах и заболоченных местах альпийского и субальпийского поясов. На ст. Джуга. Верхн. (гигр.) (1-9).

16. *A.szovitsii* Regel - Лук Шовица. На скалистых местах субальпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-3).

17. *A.ursinum* L. - Лук медвежий, черемша. Реликт. Нередко в тенистых лесах. До средн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

18. *A.victoralis* L. - Лук победный, черемша. Довольно часто, на увлажненных местах в лесном поясе. На альпийских и субальпийских лугах. На ст. Джуга. Верхн. (гигр.-м.) (1-9). Бор.-голар.

Сем. *Amaranthaceae* Juss. - Амарантовые

19. *Amaranthus blitum* L. (*A.lividus* L.) - Щирица синеватая. Редко, на сорных местах (пос.Гузерибль). Нижн., (м.) (2). Ксер.-средиз.

20. *A. retroflexus* L. - Щирица запрокинутая. Редко, на сорных местах (кордоны Гузерибль, Киша). Нижн. (м.) (1,2). Адв. - адв.

Сем. *Amaryllidaceae* J.St. - Хи - Амариллисовые

21. *Galanthus nivalis* L. (*G. caucasicus* (Baker) Grossh.) - Подснежник белоснежный. Эндем. В лесах, кустарниках, по опушкам. Изредка в субальпийском поясе, найден на г. Абаго. До верхн. (м.) (1-6). Кавк.-кавк. О.

22. *G. rizehensis* Stern. (*G. cilicicus* Baker, *G. glaucescens* A. Khokhr.) - Подснежник ризейский. Очень редко. Тисо-самшитовая роща, в грабово-буковых лесах. Новый вид для флоры РФ (Лебедева, 1989). Нижн. (м.) (10).

23. *G. platyphyllus* Traub et Moldenke (*G. latifolius* Rupr.) - Подснежник плосколистный. Эндем. Очень редко, в лесах (хр. Ачишхо). До верх. (м.) (8). Кавк.-кавк. О.

24. *G. woronowii* Losinsk. (*G. ikariae* auct. p.p.) - Подснежник Воронова. Эндем. Редко, в лесах (пос. Красная поляна). Тисо-самшитовая роща, в широколиственных лесах. До средн. (м.) (3,8,9,10). Кавк.-кавк. О.

Сем. Anacardiaceae Lindl. - Сумаховые

25. *Cotinus coggygria* Scop. - Скумпия обыкновенная. Тисо-самшитовая роща, по опушкам широколиственных лесов. Нижн. (м.) (10). Ксер.-средиз.-п.аз.

26. *Rhus coriaria* L. - Сумах дубильный. Реликт. Тисо-самшитовая роща, очень редко, в ущелье р. Хоста, на скалах, всего около 40 особей (Лебедева, 1989). Нижн. (петр.) (10). Ксер.-средиз.-п.аз.

Сем. Apiaceae Lindl. - Зонтичные

27. *Aegopodium podagraria* L. - Сныть обыкновенная. Нередко, в широколиственных и хвойных лесах, в долинах рек, на луговинах, повсеместно в сырых тенистых местах. На ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

28. *Aethusa cynapium* L. - Кокорыш обыкновенный, собачья петрушка. Изредка, преимущественно в широколиственных лесах, в кустарниках на засоренных местах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,9). Бор.-палеар.

29. *Agasyllis latifolia* (Bieb.) Boiss. (*A. caucasica* Spr.) - Агазиллис широколистная. Эндем. Реликт. Нередко, на луговых полянах в верхней части лесного пояса. На субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верх. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

30. *Angelica purpurascens* (Ave-Lall.) Gilli (*Xanthogalum purpurascens* Ave-Lall.) - Дудник пурпуровый. Реликт. Нередко, по опушкам и на высокотравных полянах. Изредка на массиве Фишт - Оштен. До верхн. (1-9,11). Ксер.-п.аз.

31. *A. sylvestris* L. - Дудник лесной. Рассеянно на лугах, высокотравных полянах, на галечниках, по берегам рек. На массиве Фишт - Оштен, среди высокотравья, в районе Черкесского перевала. Изредка, среди высокотравья субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

32. *A. tatianae* Bordz. (*Xanthogalum tatianae* (Bordz.) Schischk.) - Дудник Татьяны. Эндем. Редко, на высокоотравных полянах лесного пояса и среди высокоотравья субальпийского пояса (найден на г.Бамбак). Верхн. (м.) (1-9). Кавк. - кавк.

33. *Anthriscus nemorosa* (Bieb.) Spreng. - Купырь дубравный. Редко, в ольшаниках, на лугах и лесных полянах, в кустарниках, среди субальпийского высокоотравья. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

34. *A. sylvestris* (L.) Hoffm. (*A. nemorosa* (Bieb.) Trautv.) - Купырь лесной. Иногда как сорное. А так же в ольшаниках, на лесных полянах, в кустарниках. Среди высокоотравья, на субальпийских лугах. Средн., верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-колх.др.

35. *A. schmalhauseni* (Albov) K.-Pol. - Купырь Шмальгаузена. Эндем. Реликт. Нередко, под пологом леса, на крупнотравных полянах. Среди высокоотравья на субальпийских лугах. Средн. Верх. (м.) (1-9). Древн.л.-колх.др.

36. *A. velutina* Somm. et Levier - Купырь бархатистый. Эндем. В верхнем лесном и субальпийских поясах. До верхн. (м.) (1-9).

37. *Astrantia biebersteinii* Trautv. - Звездочка Биберштейна. Эндем. Только на массиве Фишт - Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (11). Кавк.-кавк.

38. *A. colchica* Albov - Звездочка колхидская. Эндем. На каменистых склонах субальпийского пояса. Редко. Верхн. (м.) (8). Кавк.-кавк.

39. *A. maxima* Pall. - Звездочка наибольшая. Реликт. Часто, в светлых лесах и на полянах. На субальпийских лугах повсеместно. На ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

40. *A. pontica* Albov - Звездочка понтийская. Эндем. Реликт. Нередко, в лесу и на полянах, преимущественно на известняках. Изредка, на субальпийских лугах в районе массива Фишт - Оштен, в низовье р. М. Лаба. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-колх.

41. *A. trifida* Hoffm. - Звездочка трехнадрезанная. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-7). Кавк.-кавк.

42. *Vupleurum exaltatum* Bieb. - Володушка высокая. Нередко, в светлых лесах, на скалах, каменистых местах и щебнистых почвах. Изредка, на лугах и осыпях субальпийского пояса. До верхн. (к.) (1-9). Ксер.-п.аз.

43. *V. polymorphum* Albov - Володушка многообразная. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко, г.Б.Бамбак (Введенский, 1939). Верхн. (м.) (2). Кавк.-кавк.

44. *V. polyphyllum* Ledeb. - Володушка многолистная. Нередко, на верхнем пределе леса как компонент среднетравья. Часто в субальпийских лесах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

45. *V. rischawii* Albov - Володушка Ришави. Эндем. Реликт. На альпийских лугах. Очень редко г.Аибга, Б.Бамбак, Умпырский перевал. Верхн. (м.) (2,6). Кавк.-колх. О.

46. *Carum alpinum* (Bieb.) Benth. et Hook. fil. = *Seseli alpinum* Bieb. - Тмин альпийский. Эндем. Часто под пологом леса и на лесных полянах в верхней части лесного пояса. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

47. *C. caucasicum* (M.B.) Boiss. - Тмин кавказский. Повсеместно на альпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

48. *C. colchicum* Lipsky - Тмин колхидский. Эндем. На лугах, скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (8,9). Ев.кавк.

49. *C. meifolium* (Bieb.) Boiss. - Тмин рассеченнолистный. Эндем. На альпийских лугах, в т.ч. на массиве Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-колх.

50. *Chaerophyllum aureum* L. - Бутень золотистый. На субальпийских лугах. Изредка, г.Фишт и Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-евр.

51. *Ch. borodinii* Albov - Бутень Бородина. Эндем. На осыпях субальпийского пояса. Редко. Г.г.Фишт, Оштен, Чуба, Житная. Верхн. (петр.) (11). Кавк.-колх.

52. *Ch. bulbosum* L. (*Ch. caucasicum* (Hoffm.) Schischk.) - Бутень клубненосный. Нередко, в лесах, лощинах, на прибрежных лугах, высокотравных лесных полянах. На каменистых альпийских лугах. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

53. *Ch. confusum* Woronow - Бутень сомнительный. Эндем. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

54. *Ch. humile* Stev. - Бутень низкий. Эндем. На осыпях альпийского пояса. Редко, г.г. Оштен, Б.Бамбак, Ятыргварта, хр. Аишха. Верхн. (петр.) (2,6,11). Кавк.-кавк.

55. *Ch. millefolium* DC. - Бутень тысячелистный. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. На ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

56. *Ch. roseum* Bieb. - Бутень розовый. Эндем. На лугах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9). Колх.-колх.

57. *Ch. rubellum* Albov - Бутень красный. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9, 11). Кавк.-колх.

58. *Ch.temulum* L. - Бутень опьяняющий. Очень часто, в лесах, по опушкам, на луговинах по берегам рек. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

59. *Chamaescadium acaule* (Bieb.) Boiss. - Низкозонтичник бесстебельный. Реликт. На лугах, скалах, осыпях и каменистых местах альпийского пояса. На массиве Фишт - Оштен, обычно на альпийских лугах. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

60. *Cnidium pauciradium* Somm. et. Levier = *Seseli saxicolium* (Albov) M.Pimen. - Жгун-корень малолучевой. Эндем. Редко, на полянах, в верхней части лесного пояса и на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

61. *Daucus carota* L. - Морковь дикая. Пос.Гузерипля как сорное. В тисо-самшитовой роще. Нижн. (м.) (2, 10). Бор.-палеар.

62. *Eleutherospermum cicutarium* (Bieb.) Boiss. - Свободосемянник цикutowый. Нередко в высокотравье на верхнем пределе леса. Изредка на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

63. *Eryngium campestre* L. - Синеголовник полевой. Отмечен на лесной поляне по склону к устью р.Бескес, вне заповедника. Средн. (м.). Бор.-палеар.

64. *E.giganteum* Vieb. - Синеголовник гигантский. Довольно часто на полянах лесного пояса, среди сорняков. Изредка на субальпийских засоренных лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.

65. *Heraclium aconitifolium* Woronow - Борщевик аконитолистный. Эндем. Редко, на верхнем пределе леса. Изредка на субальпийских лугах. Гг. Абаго, Оштен. Верхн. (м.) (3,11). Кавк.-колх.

66. *H. apiifolium* Boiss. - Борщевик сельдереелистный. На сильно увлажненных местах, вдоль русел водных потоков альпийского и субальпийского поясов. На ст.Джуга. Верхн. (гигр.-м) (1-9,11). Кавк.-колх.

67. *H.asperum* (Hoffm.) Vieb. - Борщевик жесткий. Эндем. Нередко, по опушкам, полянам, в светлых лесах. На субальпийских лугах. Редко, г.Б.Бамбак, массив Трю - Ятыргварта. На массиве Фишт - Оштен, среди высокотравья, близ Черкесского перевала. Средн., верхн. (м.) (2,6,11). Кавк.-кавк.

68. *H.freyanium* Somm. et Levier (*H.colchicum* Lipsky) - Борщевик колхидский. Эндем. На каменистых россыпях, моренах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (8,9). Кавк.-колх.

69. *H.cyclocarpum* C.Koch - Борщевик круглоплодный.

Эндем. Редко, по лесным полянам. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.

70. *H.leskovii* Grossh. - Борщевик Лескова. Эндем. На каменистых местах и осыпях субальпийского пояса. Редко. Гг. Оштен, Тыбга, хр. Аспидный. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-колх.

71. *H. mantegazzianum* Somm. et. Levier (*H.grosheimii* Manden.) - Борщевик Мантегацци. Эндем. Реликт. Нередко, в составе лесного крупнотравья и субальпийского высокоотравья, по лесным полянам, опушкам, берегам рек и ручьев. В верхней части лесного пояса, среди субальпийского высокоотравья. На ст. Джуга. Средн., верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-колх.-

72. *H.ponticum* (Lipsky) Schischk. ex Grossh. - Борщевик понтийский. Эндем. На субальпийских лугах. На массиве Фишт в верхней части лесного пояса. Верхн. (м.) (1-9, 11). Кавк. ПОНТ.

73. *H.scabrum* Albov - Борщевик шероховатый. Эндем. Редко, в верхней части лесного пояса. В субальпийском поясе среди высокоотравья. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.

74. *H.sibiricum* L. - Борщевик сибирский. Редко, в лесах. До средн. (м.) (2,3,6). Бор.-палеар.

75. *Laser trilobum* (L.) Borkh. - Лазурник трехлопастный. Редко, в светлых лесах и на полянах. Изредка на субальпийских лугах. В тисо-самшитовой роще, в широколиственных лесах. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

76. *Laserpitium hispidum* Bieb. - Гладыш щетинистоволосистый. Редко, на галечниках по берегам рек. До средн. (м.) (2,3,5,6,8). Кавк.-кавк.

77. *Libanotis transcaucasica* Schischk. = *Seseli transcausicum* (Schischk.) M.Pimen. et Sdobnina - Порезник закавказский. На каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

78. *Ligusticum alatum* (Bieb.) Spreng. = *Macrosciadium alatum* (Bieb.) V.Tichomirov et Lavrova - Лигустикум крылатый. Часто, в лесах, на высокоотравных полянах, в долинах рек, на верхнем пределе леса. На субальпийских лугах и среди высокоотравья. Массив Оштен среди высокоотравья. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

79. *L.arafae* Albov = *Arafae aromatica* M.Pimen. et Lavrova - Лигустикум ладанный. Эндем. Реликт. Иногда, в высокоотравье на верхнем пределе леса. На субальпийских лугах, ст. Джуга. На субальпийских высокоотравных лугах массива Оштен. До верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-колх.

80. *L.physospermifolium* Albov = *Macrosciadium*

physospermifolium (Albov) V.Tichomirov et Lavrova - Лигустикум вздутоплодникolistный. Эндем. Реликт. Часто, в лесах по опушкам и полянам. На субальпийских лугах. Г.Фишт среди высокотравья. До верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-колх.

81. *Osmorhiza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe - Осмориза остистая. Реликт. Рассеянно, под пологом буково-пихтовых и еловых лесов. До верхн. (м.) (3,6,7). Бор.-палеар.

82. *Pastinaca armena* Fisch. et C.A. Mey. - Пастернак армянский. Часто на субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

83. *P.aurantiaca* (Albov) Kolak. - Пастернак оранжевый. Эндем. На лугах в альпийском поясе. Верхн. (м.) (1-9).

84. *P.pimpinellifolia* Vieb. - Пастернак бедреницелистный. Эндем. Очень редко, пос.Гузерибль, на лугу. Нижн. (м.) (2). Кавк.-кавк.

85. *Peucedanum calcareum* Albov = *P.longifolium* Waldst. et Kit. Горичник известняковый. Эндем. От нижнего до верхнего лесного пояса. На известняковых и сухих скалах лесного пояса. Изредка на каменистых и щебнистых склонах субальпийского пояса. До верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-колх.

86. *P.lubimenkoanum* Kotov (*P.alsaticum* L.) = *Xanthoselinum alsaticum* (L.) Schur. - Горичник Любименко. На скалистых местах субальпийского пояса. Очень редко, хр.Пшекиш. Верхн. (петр.) (2). Бор.-евр.

87. *P.caucasicum* (Vieb.) C.Koch = *Cervaria caucasica* (Vieb.) M.Pimen. - Горичник кавказский. Часто, от нижнего до верхнего лесного пояса. Среди высокотравья. Изредка на г.Оштен (Альпер, 1960). До верхн. (м.) (1-11). Кавк.-колх.

88. *P.pschawicum* Boiss - Горичник пшавский. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко пастбище Лагонаки. Верхн. (м.) (2). Кавк.-колх.

89. *P.ruthenicum* Vieb. - Горичник русский. Изредка. От нижнего до верхнего лесного пояса. На скалистых местах. До верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

90. *Physospermum cornubiense* (L.) DC. (*Danaa nudicaulis* (Vieb.) Grossh.) - Вздутоплодник двурогий. Нередко, в лесах. Редко, на субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-средиз.

91. *Pimpinella rhodantha* Boiss. - Бедренец розоцветный. На субальпийских и альпийских лугах. Массив Оштен, изредка на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-11). Кавк.-м.аз.

92. *P.saxifraga* L. - Бедренец камнеломковый. На субальпийских лугах. Редко. Пастбище Абаго. Изредка, в светлых

лесах и на полянах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

93. *Sanicula europaea* L. - Подлесник европейский. Реликт. Часто, под пологом тенистых лесов. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

94. *Scaligeria glaucescens* (DC.) Boiss. = *Elaeosticta glaucescens* (DC.) Boiss - Скалигерия сизоватая. Реликт. Нередко, в кустарниках, по берегам рек. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Ксер.-п.аз.

95. *Seseli petraeum* Bieb. (*S. floribundum* Somm. et Levier) - Жабрица щербистая. Эндем. Изредка, на склонах, особенно известняковых. Очень редко на скалах г. Фишт. До средн. (петр.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Кавк.-кавк.

96. *Seseli peucedanoides* (Bieb.) K.-Pol. - Жабрица горичниковидная. На субальпийских лугах. Редко, г. Б. Бамбак. Верхн. (м.) (2) Кавк.- м.-аз

97. *Torilis anthriscus* (L.) Gmel. - Торилис купыревидный. Тисо-самшитовая роща, в смешанных лесах. Нижн. (м.) (10).

98. *T. japonica* (Houtt.) DC. - Торилис японский. Изредка, в лесах, на вырубках, сорных местах. До средн. (м.) (2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

Сем. Arosynaceae Juss. - Кутровые

99. *Vinca herbacea* Waldst. et Kit. - Барвинок травянистый. Очень редко (бассейн р. Чвижепсе) по сухим остепненным склонам. До средн. (кв.) (9). Степн.-ев.понт.

100. *V. minor* L. - Барвинок малый. Редко, в лесах (между пос. Гузерипль и кордоном Лагерный). В тисо-самшитовой роще, по опушкам. Нижн. (м.) (2,10). Бор.-евр.

101. *V. pubescens* D'Urv. - Барвинок опушенный. Отмечен в бассейне р. Мзымта (ущелье р. Ачипсе). Изредка, по ущелью р. Хоста. Нижн. (м.) (8,10). Кавк.-колх.

Сем. Aquifoliaceae Bartl. - Падубовые

102. *Ilex colchica* Pojark. - Падуб колхидский. Реликт. В подлеске тенистых лесов. До верхн. (м.) (8,9,10). Древн.л.-колх.др.

103. *I. stenocarpa* Pojark. - Падуб узкоплодный. Эндем. Реликт. В подлеске буковых и пихтовых лесов, в бассейне р. Белая. До верхн. (м.) (2,3,9,11) Кавк.-кавк.

Сем. Araceae Juss. - Аройниковые

104. *Arum albispatum* Stev. ex Ledeb. - Аройник белокрылый. Редко, в тисо-самшитовой роще. Нижн. (м.) (10). Кавк.-кавк.

105. *A. orientale* Bieb. - Аройник восточный. Изредка, в тенистых лесах. В тисо-самшитовой роще. Редко, преимущественно в самшитовых, буковых и грабовых лесах. До нижн. (м.) (1-9,10). Бор.-палеар.

Сем. Araliaceae Juss. - Аралиевые

106. *Hedera colchica* (C.Koch) C.Koch - Плющ колхидский. Реликт. В ущельях, на земле под пологом леса, на скалах, стволах деревьев. До средн. (м.) (3,8,9,10). Древн.л.-колх.др.

107. *H. helix* L. - Плющ обыкновенный. Реликт. В лесах по земле, на стволах деревьев, по скалам. До сред. (м.) (1,2,3,4,5,8,9,10). Древн.л.-колх.Др.

Сем. Aristolochiaceae Juss. - Кирказоновые

108. *Aristolochia iberica* Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss. - Кирказон грузинский. Эндем. Реликт. Изредка, в светлых лесах. Нижн., (м.) (8,9). Древн. л. - малоаз. - средиз. др.

109. *A. steupii* Woronow - Кирказон Штейпа. Эндем. Реликт. Очень редко, в тенистых лесах. В тисо-самшитовщй роще. До средн. (м.) (8,9,10) Древн. л. - малоаз. - средиз. др.

110. *Asarum intermedium* (C.A.Mey.) Grossh. - Копытень промежуточный. Эндем. Нередко, в тенистых лесах. До средн. (м.) (1-10). Кавк. - кавк.

Сем. Asclepidaceae R.Br. - Ласточниковые

111. *Periploca graeca* L. - Обвойник греческий. Реликт. Редко, под пологом леса. Нижн. (м.) (8,9,10). Древн.л.-м.аз.-средиз. др.

112. *Vincetoxicum funebre* Boiss. et Kotschy - Ластовень погребальный. Очень редко, на сухих склонах, осыпях и скалах. До верхн. (кв.) (1-9). Кавк.-кавк.

113. *V. scandens* Somm. et Levier - Ластовень лазящий. Редко, в широколиственных лесах, в долинах и по берегам рек, на скалах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Кавк.-кавк.

Сем. Asparagaceae Juss. (Ruscaceae Hutch.) - Спаржевые

114. *Ruscus colchicus* P.F.Yeo (*R. hypophyllum* auct.) - Иглица колхидская. Реликт. Под пологом пихтарников и буко-пихтарников, в верховье р. Белая и в тисо-самшитовой роще. До верхн. (м.) (3,8,9,10). Древн.л.-колх.др. О.

115. *R. ponticus* Woronow ex Grossh. (*R. aculeatus* L.) - Иглица понтийская. Реликт. Входит в состав вечнозеленого подлеска колхидских лесов. Нижн. (м.) (10). Древн.л.-колх.др.

Сем. Aspleniaceae Mett. ex Frank - Костенцовые

116. *Asplenium adiantum-nigrum* L. - Костенец черный. Редко, на обнаженных силикатных горных породах. Нижн. (петр.) (1-10). Бор.-палеар.

117. *A.ruta-muraria* L. - Костенец рута-постенная. Нередко, преимущественно на известняковых скалах, по берегам рек, изредка на скалах субальпийского пояса. До верхн. (петр.) (1-9,11). Бор.-голар.

118. *A.septentrionale* (L.) Hoffm. - Костенец северный. Нередко, преимущественно на скалах в лесном поясе. В трещинах скал и между камнями в субальпийском поясе. Редко. До верхн. (петр.) (1-9). Бор.-голар.

119. *A.trichomanes* L. - Костенец волосовидный. Часто, преимущественно в трещинах скал. До верхн. (петр.) (1-11). Бор.-голар.

120. *A.viride* Huds. - Костенец зеленый. Редко, на известняковых обнажениях, в трещинах скал лесного пояса. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1,6,9,11). Бор.-голар.

121. *A.woronowii* Christ. - Костенец Воронова. Редко, в трещинах известняковых скал г. Фишт, у Черкесского перевала (Туниев, 1999). Верхн. (петр.) (11).

122. *Ceterach officinarum* Willd. (*Asplenium ceterach* L.) - Скребница аптечная. Тисо-самшитовая роща, на скалах. До верхн. (петр.) (10).

123. *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. (*Asplenium scolopendrium* L.) - Листовик сколопендровый. Реликт. Часто, по берегам рек, ручьев, на обрывах, скалах и осыпях, в затененных местах. До средн. (петр.) (1-11). Бор.-евр.

Сем. Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke) - Астровые

124. *Achillea biserrata* Bieb. = *Ptarmica biserrata* (Bieb.) DC. - Тысячелистник дважды-пильчатый. Эндем. Преимущественно в светлых лесах, по лесным остепненным полянам, опушкам, в кустарниках. До верхн. (к.) (1-9). Кавк.-кавк.

125. *A.griseo-virens* Albov = *Ptarmica griseo-virens* (Albov) Galushko - Тысячелистник серо-зеленый. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

126. *A.millefolium* L. - Тысячелистник обыкновенный. Нередко, на остепненных луговых склонах лесного пояса. Изредка, на субальпийских лугах. До верхн. (к.) (1-9). Бор.-палеар.

127. *A.nobilis* L. - Тысячелистник благородный. Редко. По

опушкам и лесным полянам. Нижн. (м.) (2,3,6,8,9). Бор.-палеар.

128. *A.setacea* Waldst. et Kit - Тысячелистник щетинистый. По полянам, опушкам при дорогах и в поймах рек лесного пояса. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

129. *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. = *Trommsdorfa maculata* (L.) Bernh. - Пазник кромчатый. Изредка на полянах на верхнем пределе леса. На субальпийских лугах, гг.Фишт, Б.Бамбак. Верхн. (м.) (2,11). Бор.-палеар.

130. *Aetheorappus caucasicus* Sosn. - Этеопаппус кавказский. Эндем. На щербнистых местах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Редко, гг.Б.Бамбак, Мраморная, хр.Аишха, Псеашха. Верхн. (петр.) (2,8).

131. *A.pulcherrimus* (Willd.) Gass. - Этеопаппус красивейший. На лугах в альпийском и субальпийском поясах. Верхн. (м.) (2).

132. *A.wedenskii* (Sosn.) Sosn. - Этеопаппус Введенского. Эндем. На субальпийских лугах. Довольно редко. Верхн. (м.) (2).

133. *Ambrosia artemisiifolia* L. - Амброзия полыннолистная. В тисо-самшитовой роще. Вдоль троп на осветленных местах. Нижн. (м.) (10). Adv.-adv.

134. *Antennaria caucasica* Boriss. - Кошачья лапка кавказская. На лугах и каменистых местах альпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-9).

135. *Anthemis abagensis* Fed. - Пупавка абагинская. Эндем. Нередко, на лесных полянах верхнего лесного пояса. На субальпийских лугах, очень редко. Г.Абаго. Верхн. (м.) (3). Кавк.-кавк.

136. *A.cotula* L. - Пупавка собачья. Повсеместно у дорог и жилищ. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6). Бор.-евр.

137. *A.dumetorum* Sosn. (*Cota dumetorum* (Sosn.) Holub) - Пупавка кустарниковая. По опушкам и лесным полянам, на субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

138. *A.iberica* Vieb. (*A.ptarmiciformis* C.Koch) - Пупавка грузинская. Эндем. На субальпийских лугах. Изредка Верхн. (м.) (1-9).

139. *A.macroglossa* Somm. et Levier - Пупавка крупноязычковая. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

140. *A.marschalliana* Willd. - Пупавка Маршалла. Эндем. На

каменистых местах альпийского пояса. Верховья рек Лаба и Мзымта. Верхн. (к.) (8).

141. *A.melanoloma* Trautv. (*Cota melanoloma* (Trautv.) Holub) - Пулавка темноокаймленная. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

142. *A.platyglossa* C.Koch - Пулавка плоскочешуйчатая. Массив Фишт - Оштен. Часто на щебнистых местах в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9).

143. *A.rigescens* Willd. (*Cota rigescens* (Willd.) Holub) - Пулавка жестковатая. На лесных полянах, по опушкам. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

144. *A.rudolphiana* Ad. - Пулавка Рудольфа. Массив Фишт - Оштен. Обычно, на каменистых местах в субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (петр.) (11).

145. *A.saroptana* Albov - Пулавка Сапорты. Эндем. Реликт. На лугах и склонах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.

146. *A.sosnovskyana* Fed. - Пулавка Сосновского. Эндем. На лугах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Ст. Джуга. Верхн. (к.-м.) (1-9,11).

147. *A.zyghia* Woronow (*Cota zygia* (Woronow) Holub) - Пулавка эгейская. Эндем. Реликт. На щебнистых местах субальпийского пояса. Изредка. Верхн. (петр.) (8,9).

148. *Arctium lappa* L. - Лопух репейник. Обычно, на сорных местах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

149. *A.minus* (Hill) Bernh. - Лопух малый. По опушкам. Тисо-самшитовая роща. До средн. (м.) (10).

150. *A.palladinii* (Marc.) Grossh. (*A.tomentosum* Mill.) - Лопух Палладина. Эндем. Часто, на сорных местах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,7). Кавк.-кавк.

151. *A.platylepis* (Boiss. et Bal.) Sosn.ex Grossh. - Лопух плоскочешуйчатый. Эндем. Изредка, в составе крупнотравных фитоценозов лесных полян и в субальпийском высокотравье. Верхн. (м.) (2-9). Кавк.-кавк.

152. *Artemisia absinthium* L. - Полынь горькая. На сорных местах, редко. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

153. *A.chamaemelifolia* Vill. - Полынь ромашколистная. Нередко, по сухим степным и луговым склонам, на субальпийских лугах. Редко. Верхн. (к.) (2-9). Ксер.-п.аз.

154. *A.scoparia* Waldst. et Kit. (*Oligosporus scoparius* (Waldst. et Kit) Less.) - Полынь метельчатая. Изредка, при дорогах, в светлых лесах, на сорных местах. Собрано у устья р. Аципсе (бассейн р.Мзымта). Нижн. (м.) (8). Бор.-палеар.

155. *A. vulgaris* L. - Полынь обыкновенная. Часто, по опушкам и кустарникам, в долинах рек и по галечниковым отмелям. На субальпийских лугах. Редко. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

156. *Aster alpinus* L. - Астра альпийская. Часто на альпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9).

157. *A. amelloides* Bess. - Астра ложноитальянская. Нередко на скалистых сухих склонах. До средн. (петр.) (1-7). Бор.-евр.

158. *Bellis perennis* L. - Маргаритка многолетняя. На открытых местах. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (10).

159. *Bidens tripartita* L. - Череда трехраздельная. На сырых местах, болотах. До средн. (гигр.) (1-10). Бор.-голар.

160. *Carduus acanthoides* L. - Чертополох колючий. На сорных местах, по обочинам дорог. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

161. *C. adpressus* C.A. Mey. - Чертополох прижатый. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-7).

162. *C. crispus* L. - Чертополох курчавый = Чертополох даурский. Как сорное в кустарниках, на сырых тенистых местах. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

163. *C. multijugus* C. Koch. - Чертополох многопарный. Эндем. Нередко, по полянам, опушкам, на сорных местах. На сорных субальпийских, реже альпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

164. *C. nutans* L. (*C. thoermeri* Weinm.) - Чертополох поникающий. Изредка, на сорных местах, вырубках, полянах при дорогах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

165. *Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem. - Колючник Биберштейна. Редко, на полянах, у дорог, в светлых лесах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

166. *C. vulgaris* L. - Колючник обыкновенный. Нередко, на сорных и сухих склонах. До верхн. (к.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

167. *Carpesium abrotanoides* L. - Карпезиум полынный. Редко, по опушкам, в тенистых местах. В тисо-самшитовой роще. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

168. *C. cernuum* L. - Карпезиум поникающий. В тисо-самшитовой роще, по опушкам. Нижн. (м.) (10).

169. *Centaurea abbreviata* (C. Koch) Hand.-Mazz. (*C. phrygia* L., *Jacea abbreviata* (C. Koch) Sojak) - Василек укороченный. Нередко, в составе луговых ассоциаций на верхн. пределе леса. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

170. *C. abchasica* (Albov) Sosn. - Василек абхазский. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (8).

171. *C.alutacea* Dobrocz. (*Jacea alutacea* (Dobrocz.) Sojak) - Василек серовато-желтый. Эндем. Изредка на лугах и в кустарниках на верхнем пределе леса, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

172. *C.cheiranthifolia* Willd. (*Cyanus cheiranthifolius* (Willd.) Sojak) - Василек желтофиолетовый. На альпийских и субальпийских лугах, ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9).

173. *C.colchica* (Sosn.) Sosn. = *Psephellus colchicus* D.Sosn. - Василек колхидский. Эндем. На известняках альпийского пояса. Очень редко. Г.Фишт. Приводится В.Н.Альпер (1960), по сборам Р.А.Еленевского. Верхн. (м.) (11).

174. *C.cyanus* L. - Василек синий. Изредка, сорное, в огородах, посевах, пос.Гузерибль на огороде. До средн. (м.) (2,3,5). Бор.-голар.

175. *C.fischeri* Schlecht. (*Cyanus fischeri* (Schlecht.) Sojak) - Василек Фишера. Эндем. На субальпийских лугах, часто. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (2-9).

176. *C.nigrofimbria* (C.Koch) Sosn. (*Cyanus nigrofimbrius* (C.Koch) Sojak) - Василек чернобахромчатый. На субальпийских лугах Эвксинской провинции. Верхн. (м.) (8).

177. *C.phrygia* L. (*Jacea phrygia* (L.) Sojak) - Василек Фрига. Часто, на субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9).

178. *C.salicifolia* Vieb. (*Jacea salicifolia* (Vieb.) Sojak) - Василек иволистный. Часто на лесных полянах, в светлых лесах, на субальпийских лугах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Кавк.-кавк.

179. *Chamaemelum caucasicum* (W.) Boiss. - Хамемелум кавказский. В альпийском поясе на влажных щебнистых лугах. Верхн. (петр.) (1-9).

180. *Cicerbita bourgaei* (Boiss.) Beauverd - Цицербита Буржо. Редко, на высокотравных полянах, по вырубкам и опушкам. До верхн. (м.) (1-9).

181. *C.cacaliaefolia* (M.V.) Beauverd - Цицербита известняковая. Массив Фишт - Оштен. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (11).

182. *C.deltoidea* (M.V.) Beauverd - Цицербита дельтовидная. Эндем. Реликт. Преимущественно в пихтовых и буково-пихтовых лесах, в составе высокотравья. Средн., верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

183. *C.macrophylla* (Willd.) Wallr. (*C.grandis* (C.Koch) A.Schchian) - Цицербита крупнолистная. Эндем. Редко, в составе высокотравья верхнего предела леса и на субальпийских лугах (м.) (2-9). Кавк.-кавк.

184. *C.olgae* Leskov - Скабиоза Ольги. Эндем. Реликт. Ред-

ко, в составе высокотравья и лесного крупнотравья. (Лесков, 1932, Гогнидзе, 1979, на г.Оштен, в верхнем лесном поясе). Верхн. (м.) (2,3,4,6,8,11). Древн.л.-колх.др.

185. *C.prenanthoides* (M.B.) Beauverd - Цицербита пернантоидная. Редко, в высокотравных фитоценозах. До верхн. (м.) (2-9). Кавк.-кавк.

186. *C.pontica* (Boiss.) Grossh. (*Prenanthes pontica* (Boiss.) Leskov) - Цицербита понтийская. Реликт. Редко, в тенистых лесах. Верхн. (м.) (2,3,4).

187. *C.racemosa* (Willd.) Beauverd - Цицербита кистевидная. Изредка, преимущественно на каменистых участках в лесном поясе. На субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, на щебнистых местах и осыпях в субальпийском поясе. До верхн. (петр.) (1-9,11). Ксер.-п.аз.

188. *Cichorium intybus* L. - Цикорий обыкновенный. В тисо-самшитовой роще, по опушкам. До средн. (м.) (10).

189. *Cirsium aggregatum* Ledeb. - Бодяк скученный. Редко, в высокотравье и кустарниках. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

190. *C.arachnoideum* (M.B.) Bess. - Бодяк паутинистый. Эндем. Нередко, по опушкам, у границы леса на лугах. На субальпийских лугах. Средн., верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

191. *C.arvense* (L.) Scop. - Бодяк полевой. На сорных местах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

192. *C.chlorocomos* Somm. et Levier - Бодяк зеленоверхий. Эндем. Отмечен в продольных долинах рек Умпырь и Закан на остепненных лугах. Средн. (кс.) (6). Кавк.-кавк.

193. *C.czercessicum* Charadze - Бодяк черкесский. На высокотравных лугах в верхнем лесном и субальпийском поясе. Эндем. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

194. *C.dealbatum* Bieb. - Бодяк беловатый. Эндем. Часто в составе высокотравья, на увлажненных местах лесного и субальпийского пояса. Верхн., средн., (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

195. *C.esculentum* (Siev.) С.А.Меу. - Бодяк съедобный. На субальпийских лугах, в т.ч. на массиве Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

196. *C.gagnidzei* Charadze - Бодяк Гагнидзе. Эндем. В субальпийском высокотравье. Бассейн р. Мзымта. Верхн. (м.) (8).

197. *C. hypoleucum* DC. - Бодяк снизу-белый. Редкий вид на с.-з. Кавказе. Отмечен в заповеднике однажды, в крупнотравном березняке в долине р.Уруштен (Альпер, 10.08.1935). Верхн. (м.) (7). Бор.-палеар.

198. *C. incanum* (S.G.Gemel.) Fisch. - Бодяк седой. Как сорняк вдоль дорог, на речных террасах единично и зарослями. (урочище Умпыр, галечник р. М.Лаба.) До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

199. *C. kusnezowianum* Somm. et Levier - Бодяк Кузнецова. Эндем. Нередко, в высокотравье лесного и субальпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

200. *C. macrocephalum* С.А.Мей. - Бодяк крупноголовчатый. Эндем. На массиве Оштен. Часто на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (11).

201. *C. oblongifolium* С.Коч. - Бодяк продолговатолистный. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Район озера Кардывач. Верхн. (м.) (8).

202. *C. obvallatum* (Vieb.) Fisch. - Бодяк окутанный. На субальпийских засоренных лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

203. *C. pugnae* Somm. et Levier - Бодяк воинственный. Эндем. Изредка, на лесных субальпийских полянах, на верхн. пределе леса, на засоренных субальпийских лугах. Верхн.(м.) (1-9). Кавк.-кавк.

204. *C. rhizocephalum* С.А.Мей. - Бодяк корнеголовчатый. Эндем. На субальпийских и альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

205. *C. simplex* С.А.Мей. - Бодяк простой. Эндем. На влажных заболоченных альпийских и субальпийских лугах, в т.ч. на альпийских лугах массива Фишт - Оштен. Верхн. (гигр.-м.) (1-9,11).

206. *C. sychnosanthum* Petrak - Бодяк многоцветковый. Эндем. Часто, в лесном поясе преимущественно на высокотравных полянах. На массиве Оштен в лесном поясе близ Черкесского перевала, на берегу ручья. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

207. *C. tricholoma* Fisch. et Mey. - Бодяк волосисто-каёмчатый. Эндем. Высокотравные луга. Редко. Близ лагеря Тегеня, г.Фишт. Вид сомнительный. Необходимы дополнительные сборы. Верхн. (м.) (6-11).

208. *Crepis caucasica* С.А.Мей. - Скерда кавказская. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

209. *C. glabra* Boiss. - Скерда голая. Эндем. Часто, на лесных полянах на верхнем пределе леса и на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

210. *C. sibirica* L. - Скерда сибирская. Часто в лесах по опушкам и полянам, на лугах и в кустарниках. На высокотравных субальпийских лугах. На массиве Оштен, изредка на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

211. *Crinitaria linosyris* (L.) Less. = *Galatella linosyris* (L.) Reichenb. - Грудница обыкновенная. Редко, на сухих каменистых склонах. До средн. (к.) (1,2,3,5,6,8,9). Ксер.-средиз.

212. *Dichrocephalalatifolia* (Lam.) DC. (*Hippia latifolia* auct.) - Двухцветоголовник широколистный. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (10).

213. *Dolichorrhiza caucasica* (Bieb.) Galushko (*Ligularia caucasica* (Bieb.) G. Don fil.) - Бузульник кавказский. Эндем. На субальпийских лугах, в зарослях рододендрона. Верхн. (м.) (1-9).

214. *D. correvoniana* (Albov) Galushko (*Ligularia correvoniana* (Albov) Pojark.) - Бузульник Корревона. Эндем. Среди зарослей кавказского рододендрона. Очень редко, г. Аибга. Верхн. (м.) (8).

215. *D. renifolia* (C.A. Mey.) Galushko (*Ligularia renifolia* (C.A. Mey.) DC.) - Бузульник почковидный. Эндем. На затененных склонах альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

216. *Doronicum macrophyllum* Fisch. et Hornem. (*D. dolichotrichum* Cavill.) - Дороникум крупнолистный. Часто, на крупнотравных лесных полянах. На высокотравных субальпийских лугах. Г. Оштен, среди высокотравья. Верхн. (м.) (1-9, 11). Кавк.-кавк.

217. *D. oblongifolium* DC. - Дороникум продолговатолистный. Эндем. На субальпийских лугах ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9).

218. *D. orientale* Hoffm. - Дороникум восточный. Реликт. Нередко, в тенистых лесах. В тисо-самшитовой роще, преимущественно в дубовато-грабовых лесах. До средн. (м.) (1-9, 10). Бор.-палеар.

219. *Echinops colchicus* Sosn. - Мордовник колхидский. На каменистых местах субальпийского пояса. Редко. Верхн. (к.) (8). Кавк.-колх.

220. *E. galaticus* Freyn - Мордовник галатский. Редко, по лесным опушкам и в кустарниках. До средн. (к.-м.) (1-9). Ксер.-п. аз.

221. *E. sphaerocephalus* L. - Мордовник шароголовый. Изредка, на сорных местах в лесном поясе. На субальпийских лугах, сорное. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

222. *Erigeron acris* L. (*E. acer* auct.) = *E. podolicus* Bess. - Мелколепестник едкий. Изредка, на полянах, залежах, вырубках. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

223. *E. alpinus* L. - Мелколепестник альпийский. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9, 11).

224. *E.canadensis* L. = *Conyza canadensis* Cronq. - Мелколепестник канадский. Около жилищ, по берегам рек, при дорогах как сорное. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Адв.-адв.

225. *E.caucasicus* Stev. - Мелколепестник кавказский. Эндем. На лугах и каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (кс.) (8,9,11).

226. *E.orientalis* Boiss. - Мелколепестник восточный. На сухих местах в субальпийском поясе. Верхн. (кс.) (1-9).

227. *E.pulchellus* (W.) DC. - Мелколепестник красивый. На массиве Фишт - Оштен. Изредка на осыпях. Верхн. (петр.) (11).

228. *E.uniflorus* L. - Мелколепестник однокорзиночный. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (8,9).

229. *E.venustus* Botsch. - Мелколепестник приятный. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

230. *Eupatorium cannabinum* L. - Посконник коноплевидный. На сорных местах, у канав, речек, в кустарниках и на лесных полянах. До верхн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9) Бор.-палеар.

231. *Filago arvensis* L. - Жаберник полевой. Очень редко, на песчаных обрывах, сухих склонах, по опушкам сосняков. До средн. (кс.-м) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

232. *Galinsoga parviflora* Cav. - Галинсога мелкоцветковая. Редко. Сорное, в огородах, у изгородей и строений. Нижн. (м.) (1,2,5,8,9). Адв.-адв.

233. *Gnaphalium caucasicum* Somm. et Levier = *Omalotheca caucasica* (Somm. et Levier) - Сушеница кавказская. Эндем. Редко, по полянам и опушкам березняков. На щербнистых лугах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (2-9). Кавк.-кавк.

234. *G.supinum* L. = *Omalotheca supina* (L.) DC. - Сушеница низкая. На каменистых местах альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9,11).

235. *G.sylvaticum* L. = *Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. et F.Schultz - Сушеница лесная. Нередко, в светлых лесах, на опушках, полянах и вырубках. До средн. (м.) (1,2,5,6,8,9). Бор.-палеар.

236. *Grossheimia polyphylla* (Ledeb.) Holub. (*G.ossica* (C.Koch) Sosn. et Takht., *Centaurea polyphylla* Ledeb.) - Гроссгеймия многолистная. Эндем. Реликт. Среди высокотравья. Энгельмановы поляны. Верхн. (м.) (8,9,11).

237. *Hieracium adenobrachion* (Litv. et Zahn) Juxip / - Ястребинка железистоветочковая. Субальпийские крупнотравные и среднетравные луга, изредка. Верхн. (м.) (1-9).

238. *H.amphitrophodes* (Sosn. et Zahn) Juxip - Ястребинка

повсюду-пепельная. На альпийских лугах, г. Фишт. Верхн. (м.) (11).

239. *H. auratum* Fries (*H. sabaundum* L.) - Ястребинка желтая. Массив Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (11).

240. *H. bauhini* Bess. (*H. besserianum* Spreng.) - Ястребинка Баугина. Массив Оштен, на субальпийских лугах, близ Черкесского перевала. Верхн. (м.) (11).

241. *H. beschtavicum* (Litv. et Zahn) Juxip - Ястребинка бештауская. Эндем. Очень редко. Пос. Гузерипль, галечники. Нижн. (м.) (2). Кавк.-кавк.

242. *H. bupleurifolium* Tausch - Ястребинка володушколистная. В лесах и на лугах от среднего до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9).

243. *H. epichlorum* (Litv. et Zahn) Juxip - Ястребинка сверхузелая. По лесным опушкам и на лугах. В верхнем лесном и субальпийском поясах. До верхн. (м.) (1-9).

244. *H. floribundum* Wimm. et Grab. - Ястребинка длиннострелковая. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

245. *H. gigantellum* Litv. et Zahn - Ястребинка гигантская. Эндем. На субальпийских лугах. Собран Н.П. Введенским на г. Оштен. (Альпер, 1960) необходимы дополнительные сборы. Верхн. (м.) (11).

246. *H. kreczetoviczii* Juxip - Ястребинка Кречетовича. В сосняках, по скалистым склонам. В субальпийском поясе. (г. Аибга). Верхн. (кс.) (8).

247. *H. macrolepis* Boiss. - Ястребинка крупночешуйная. По опушкам и на лугах. В верхнем лесном и субальпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9).

248. *H. perfoliatum* Froel. - Ястребинка пронзеннолистная. На лесных полянах и на лугах в верхнем лесном и субальпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9).

249. *H. pilosella* L. (*Pilosella officinarum* F. Schultz et Sch. Bip.) - Ястребинка волосистая. На сухих субальпийских лугах. Долина реки Дамхурц, кордон Карапырь. До средн. (м.) (7).

250. *H. procerum* Fries (*H. echioides* Lumn., *Pilosella echioides* (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip.) - Ястребинка видная. Редко, в лесном поясе, долина р. Уруштен, среди кустарников. Средн. Верхн. (м.) (6,7).

251. *H. schmalhausenanum* Litv. et. Zahn - Ястребинка Шмальгаузена. Эндем. Плато Лагонаки. Урочище Мурзыкау, на лугах. Верхн. (м.) (11).

252. *H. simplicicaule* (Somm. et Levier) Peter - Ястребинка простостебельная. Оз. Хуко. Злаково разнотравный луг близ

леса. Верхн. (м.) (6).

253. *H.umbellatum* L. - Ястребинка зонтичная. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

254. *H.vulgatum* Fries - Ястребинка обыкновенная. В лесном поясе. Пос.Гузерибль, берег р. Белой (Васильева, 1935). Лагерь Холодный, на субальпийских лугах (Кожевников, 1931) Лагонаки, у р.Псыдыч (Печушина, 1932). Верхн. (м.) (2,4,11).

255. *Inula aspera* Poir. (*I.salicina* L.) - Девясил шероховатый. Изредка, по лесным опушкам и полянам, преимущественно южных освещенных и сухих склонов. До средн. (кс.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

256. *I.conyza* DC. (*I.vulgaris* Trevis.) - Девясил обыкновенный. Изредка, на вырубках и опушках, каменистых склонах. До средн. (кс.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

257. *I.ensifolia* L. - Девясил мечевидный. На склонах субальпийского пояса, редко. Изредка на склонах массива Фишт. Верхн. (петр.) (1-9,11).

258. *I.germanica* L. - Девясил германский. Изредка, по сухим остепненным склонам и опушкам. До средн. (кс.) (1-9). Бор.-палеар.

259. *I.grandiflora* Willd. - Девясил крупноцветковый. Повсеместно, на лесных полянах верхнего предела леса, на субальпийских лугах. Массив Фишт -Оштен, обычно, на высокотравных субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

260. *I.helenium* L. - Девясил высокий. Изредка, на влажных лугах и высокотравных лесных полянах, в кустарниках. Массив Оштен, на верхнем пределе леса. В тисо-самшитовой роще. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-палеар.

261. *I.magnifica* Lipsky - Девясил великолепный. Эндем. Реликт. На высокотравных полянах и опушках. На субальпийских высокотравных лугах. Массив Фишт - Оштен, часто, среди высокотравья. Средн. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

262. *I.orientalis* Lam. - Девясил восточный. Эндем. Изредка, на скалах и каменистых участках лесного пояса. На субальпийских лугах. Верхн. (кс.-м.) (1-9). Кавк.-кавк.

263. *Jurinea arachnoidea* Bunge - Наголоватка паутинистая. Эндем. На сухих склонах субальпийского пояса. Г.Фишт, на каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-9,11).

264. *J.coronopifolia* Somm. et Levier - Наголоватка вороньяпалая. Эндем. На склонах альпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-9,11).

265. *J.levieri* Albov - Наголоватка Левье. Эндем. На каме-

нистых местах альпийского пояса. Редко, г.г.Тыбга, Фишт, верховья р. Лаба. Верхн. (к.с.) (2,7,11).

266. *J.sosnowskyi* Grossh. - Наголоватка Сосновского. Эндем. На склонах в верховьях р.Лаба. Верхн. (петр.) (7).

267. *J.subacaulis* Fisch. et Mey. - Наголоватка бесстебельная. На осыпях альпийского пояса. Изредка, на г.Оштен. Верхн. (петр.) (1-9,11).

268. *Kemulariella caucasica* (Willd.) Tamamsch. - Кемуляриелла кавказская. Эндем. Часто, на альпийских и субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

269. *K.colchica* (Albov) Tamamsch. - Кемуляриелла колхидская. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (8).

270. *Lactuca chaixii* Vill. - Латук Ше. Редко, в лесах и кустарниках (пос.Гузерибль). До средн. (к.с.) (2). Ксер.-средиз.

271. *L.serriola* L. - Латук дикий. Редко, на сорных местах (галечник на р.Ачипсе выше устья р. Лаура.) До средн. (м.) (8). Бор.-палеар.

272. *L.vimineae* (L.) Presl. - Латук прутьевидный. Г.Фишт, на осыпи в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (11).

273. *Lapsana communis* L. - Бородавник обыкновенный. В лесах, кустарниках и по берегам рек, повсеместно. Изредка, на субальпийских лугах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6). Бор.-палеар.

274. *L.grandiflora* Vieb. - Бородавник крупноцветковый. Реликт. Встречается в лесах и на лесных полянах, нередко. На субальпийских лугах, в т.ч. на г. Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

275. *L.intermedia* Vieb. - Бородавник средний. Реликт. Изредка, на лесных полянах и по опушкам. До средн. (м.) (2,3,5,6,8,9,10). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

276. *Leontodon asper* (Waldst. et Kit.) Poir. - Кульбаба шероховатая. На субальпийских лугах. Редко, в т.ч. на г. Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

277. *L.autumnalis* L. - Кульбаба осенняя. Найдена только в районе пос.Гузерибль. Нижн. (м.) (2). Бор.-палеар.

278. *L.caucasicus* (Vieb.) Fisch. - Кульбаба кавказская. На лугах и лесных полянах от верхнего лесного до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

279. *L.danubialis* Jacq. (*L.hastilis* L.) - Кульбаба дунайская. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

280. *L.hispidus* L. - Кульбаба щетинисто-волосистая. На альпийских и субальпийских лугах, на лесных полянах, в кустарниках. До верхн. (м.) (1-9,11).

281. *Leucanthemum vulgare* Lam. - Нивяник обыкновен-

ный, поповник, ромашка луговая. Нередко, на лесных полянах, в кустарниках, по открытым склонам при дорогах как сорное. На лесных полянах. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-голар.

282. *Ligularia sibirica* (L.) Cass. - Бузульник сибирский. На сырых, болотистых лугах, лесных полянах, на высокогорных болотах и на влажных субальпийских лугах. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

283. *L. subsagittata* Pojark. - Бузульник полустреловидный. На влажных альпийских лугах. Верхн. (гигр.) (1-9).

284. *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter (*Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt., *Chamomilla suaveolens* (Pursch) Rydb.) - Ромашка ромашковидная. На сорных местах, изредка. До верхн. (м.) (1-9).

285. *Mycelis muralis* (L.) Dumort. - Мицелис стенной. Обычно, в тенистых местах, в верхнем лесном и субальпийском поясах. До верхн. (петр.) (1-10). Бор.-палеар.

286. *Petasites albus* (L.) Gaertn. - Белокопытник белый. Нередко, по берегам рек и ручьёв, в лесах и на лугах. Изредка, в субальпийском поясе. До верхн. (гигр.) (1-10). Бор.-евр.

287. *P. georgicus* Manden. = *P. hybridus* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. - Белокопытник гибридный. Нередко, на влажных местах под пологом леса, по балкам и берегам ручьёв. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-евр.

288. *Picris hieracioides* L. - Горюха ястребинковая. На сорных местах (вырубках, в посевах). До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

289. *Prenanthes abietina* (Boiss. et Bal.) Kirp. - Косогорник пихтовый. Реликт. На субальпийских лугах. Изредка, в пихтарниках. Верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

290. *P. cacaliifolia* (Vieb.) Beauverd (*Cicerbita petiolata* (C. Koch) Gagnidze) - Косогорник недоспелколистный. В составе субальпийского высокотравья. Изредка в лесном крупнотравье. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

291. *P. pyrethrum corymbosum* (L.) Scop. - Пиретрум щитковидный. Изредка, в лиственных лесах, на полянах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

292. *P. parthenifolium* Willd. - Пиретрум девичьелистный. Нередко, в тенистых лесах, на каменистых местах и галечниках. На субальпийских и альпийских лугах. Редко г. Фишт, Аибга. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

293. *P. poteriifolium* Ledeb. - Пиретрум черноголовниковый. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Редко г. Фишт, Аибга. Верхн. (м.) (11).

294. *P. roseum* (Adams) Bieb. (*P. coccineum* (Willd.) Worosch. - Пиретрум розовый. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

295. *P. starkianum* W.Alb. - Пиретрум Штарка. Эндем. Редко, г.Оштен. В альпийском поясе. Верхн. (м.) (11).

296. *Scariola viminea* (L.) F.W.Schmidt - Скариола прутовидая. Редко, на сухих каменистых склонах лесного пояса. На осыпях субальпийского пояса. До средн. (кс.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

297. *Scorzopera meyeri* (C.Koch.) Lipsch. (*S. cana* (C.A.Mey.) O.Hoffm). - Козелец Мейера. На альпийских лугах. Редко. Хр.-Магишо. Верхн. (м.) (7).

298. *S. tilifolia* Boiss. (*S. lipskyi* Lipsch.) - Козелец нителистный. Эндем. В расщелинах скал альпийского пояса. Очень редко г.Ачешбок. Верхн. (м.) (6).

299. *Senecio amphibolis* C.Koch. - Крестовник двусмысленный. Собран А.И.Лесковым на гг.Фишт и Оштен. Верхн. (м.) (11).

300. *S. buschianus* Sosn. - Крестовник Буша. Эндем. Изредка, в составе субальпийского высокотравья в верхнем лесном поясе. На субальпийских лугах. Редко. Гг.Фишт, Оштен, район оз. Кардывач. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

301. *S. caucasigenus* Schischk. = *Tephroseris caucasigena* (Schischk.) Czer. - Крестовник оранжевый. Изредка, на скалах и осыпях среднего и верхнего лесного пояса, на субальпийских и альпийских лугах. Ст. Джуга. Часто на субальпийских лугах массива Фишт - Оштен. Средн., верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

302. *S. cladobotrys* Ledeb. = *Tephroseris cladobotrys* (Ledeb.) Griseb. - Крестовник ветвистый. Эндем. Реликт. На лесных высокотравных полянах среднего и верхнего лесного пояса. Среди субальпийского высокотравья. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

303. *S. fulvus* (Stev.) Schischk. - Крестовник буро-желтый. На лугах и скалах субальпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

304. *S. grandidentatus* Ledeb. (*S. arenarius* Bieb., *S. erucifolius* L.) - Крестовник крупнозубчатый. Изредка на лесных террасах, по лесным полянам и опушкам. До средн. (м.) (2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

305. *S. jacobaea* L. - Крестовник Якова. Изредка, на сорных местах по опушкам и в кустарниках, около дорог. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

306. *S. kolenatianus* C.A.Mey. - Крестовник Коленати. Эн-

дем. На субальпийских лугах. Редко, г. Фишт - Оштен, район озера Кардывач. На субальпийских лугах. Редко. Верхн. (м.) (8,11).

307. *S.orientalis* W. - Крестовник восточный. На субальпийских лугах, массив Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

308. *S.othonnae* Bieb. - Крестовник Отонны. Реликт. На высокотравных лугах и лесных полянах, по опушкам и берегам рек. Характерный представитель субальпийского высокотравья. Средн., верхн. (м.) (1-9,11). Древн.л.-колх.др.

309. *S.platyphylloides* Somm. et Levier = *Adenostyles platyphylloides* (Somm. et Levier) Czer. - Крестовник плосколистный. Эндем. Реликт. Часто, в высокотравных луговых фитоценозах лесных полей. На субальпийских лугах и среди высокотравья. На склонах г. Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Древн.-л.-м.аз.-средиз.др.

310. *S.pojarkovae* Schischk. - Крестовник Поярковой. Эндем. Изредка, на опушках леса, галечниках рек, по вырубкам. В верхнем лесном и субальпийском поясах. Средн., верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

311. *S.propinquus* Schischk. - Крестовник близкий. Эндем. Реликт. Обычно в пихтовых лесах, в составе высокотравья. Средн. Верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

312. *S.pseudoorientalis* Schischk. - Крестовник ложновосточный. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

313. *S.pyroglossus* Kar. et Kir. = *Tephroseris pyroglossa* (Kar. et Kir.) Holub - Крестовник огненнаяязычковый. Эндем. Изредка, на альпийских лугах. Массив Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (11).

314. *S.racemosus* (Bieb.) DC. - Крестовник кистистый. Эндем. На субальпийских и альпийских лугах массива Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (11).

315. *S.rhombifolius* (Adams) Sch. Bip. = *Adenostyles macrophylla* (Bieb.) Czer. - Крестовник ромболистный. Реликт. Изредка, по берегам рек, в светлых лесах, на полянах. Средн., верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-колх.др.

316. *S.sosnovskiyi* Sof. - Крестовник Сосновского. Эндем. На осыпях и щебнистых местах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

317. *S.subfloccosus* Schischk. = *Tephroseris subfloccosa* (Schischk.) Czer. - Крестовник клочковатый. Эндем. Изредка по лесным опушкам, в светлых лесах. На субальпийских и альпийских лугах. Средн., верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

318. *S.taraxacifolius* (Bieb.) DC. - Крестовник одуванчиковый.

лиственный. На скалах, осыпях и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9).

319. *S. vernalis* Waldst. et Kit. - Крестовник весенний. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (10).

320. *Serratula quinquefolia* Bieb. ex Willd. - Серпуха пятилисточковая. Реликт. Часто, под пологом лиственных и смешанных лесов. До средн. (м.) (1-9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

321. *Sigesbeckia orientalis* L. - Сигесбекия восточная. Изредка, у дорог, жилищ, сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

322. *Solidago caucasica* Kem.-Nath. - Золотая розга. Эндем. Нередко, по полянам и опушкам. На лугах и осыпях альпийского и субальпийского поясов, среди зарослей кавказского рододендрона. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

323. *S. virgaurea* L. - Золотарник обыкновенный. Обычно на лугах и в лесах, на лесных опушках. На субальпийских лугах. Ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-палеар.

324. *Sonchus arvensis* L. - Осот полевой. На сорных местах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

325. *S. asper* (L.) Hill. - Осот шероховатый. На сорных местах (пос.Гузерибль) Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (2-10). Бор.-голар.

326. *Stenactis annua* (L.) Cass. = *Phalacrolooma annuum* (L.) Dumort. - Стенактис однолетний. Тисо-самшитовая роща, занесено из Америки. Нижн. (м.) (10). Адв.-адв.

327. *Tanacetum vulgare* L. - Пижма обыкновенная. Изредка, на сорных местах. До средн. (м.) (1,2,5,6,8,9). Бор.-палеар.

328. *Taraxacum confusum* Schischk. - Одуванчик неясный. Эндем. На лугах и щербнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (к.) (1-9,11).

329. *T. officinale* Wigg. - Одуванчик лекарственный. Повсеместно, на лесных полянах, вторичных лугах, у дороги огородов. На субальпийских лугах, Б.Бамбак. Как адвентивный вид в тисо-самшитовой роще. Сорное. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

330. *T. porphyranthum* Boiss. - Одуванчик пурпурноцветковый. Эндем. Часто, на скалах альпийского пояса. Ст. Джуга Редко, г. Абаго. Верхн. (м.) (1-9).

331. *T. stevenii* DC. (*T. litwinowii* Schischk.) - Одуванчик Стевена. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах, в том числе на массиве Фишт - Оштене, часто на влажных альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

332. *T. tenuisectum* Somm. et Levier - Одуванчик тонкорас-

сеченный. Эндем. На скалах альпийского пояса. Редко г. Аибга. Верхн. (к.) (3).

333. *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. - Телекия прекрасная. Реликт. На крупнотравных лесных полянах, во влажных местах. Среди субальпийского высокоотравья. Средн., верхн. (гигр.) (1-9,11). Древн.л.-колх.др.

334. *Tragoragon brevirostris* DC. - Козлобородник коротконосный. Эндем. Редко, на сухих остепненных склонах. Известен из урочища Умпырь. Средн. (к.) (5). Кавк.-кавк.

335. *T.colchicus* Albov - Козлобородник колхидский. Эндем. Нередко, в составе луговых ассоциаций, на верхнем пределе леса на субальпийских лугах, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

336. *T.filifolius* Rehm. ex Boiss. - Козлобородник нителестный. Эндем. На лугах и скалах альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

337. *T.ketzkhovellii* Kunth. - Козлобородник Кецховели. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

338. *T.reticulatus* Boiss. et Huet - Козлобородник сетчатоволокнистый. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

339. *Tripleurospermum caucasicum* (Willd.) Hayek (*Matricaria caucasica* (Willd.) Poir.) - Трехреберник кавказский. На влажных каменистых местах и осыпях альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

340. *Tussilago farfara* L. - Мать-и-мачеха обыкновенная. Широко на свежих глинистых обрывах, молодых аллювиальных наносах, на сырых местах. В тисо-самшитовой роще. На щебнистых местах субальпийского пояса, редко. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

341. *Xanthium spinosum* L. - Дурнишник игольчатый. Изредка, у дорог, жилищ. Сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,8,9). Бор.-голар.

342. *X.strumarium* L. - Дурнишник зобовидный. Изредка, у жилищ, заборов, при дорогах, сорное. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

Сем. *Athyriaceae* Alst. - Кочедыжниковые.

343. *Athyrium distentifolium* Tausch ex Opiz (*A.alpestre* (Hoppe) Nyl.) - Кочедыжник расставленнолистный, кочедыжник альпийский. Нередко, преимущественно на скалах верхнего предела леса. На альпийских и субальпийских лугах. На южном макросклоне образует самостоятельные заросли. Фишт - Оштен, на верхнем пределе леса и на субальпийских лугах. Верхн. (петр.) (1-9,11). Бор.-голар.

344. *A.felix-femina* (L.) Roth - Кочедыжник женский. Широко,

повсеместно в лесах. Г. Фишт, часто на верхнем пределе леса. Тисо-самшитовая роща. В субальпийском поясе, редко. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-голар.

345. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. - Пузырник ломкий. На каменистых склонах и скалах. До верхн. (петр.) (1-9). Бор.-палеар.

346. *C. montana* (Lam.) Desv. = *Rhizomatopteris montana* (Lam.) A. Khokhr. - Пузырник горный. Редко. У верхнего предела леса, на скалах и камнях. Верхн. (петр.) (1-9). Бор.-палеар. О.

347. *C. regia* (L.) Desv. - Пузырник великолепный. На скалах альпийского пояса. Изредка. Верхн. (петр.) (1-9).

348. *C. sudetica* A. Br. et Milde = *Rhizomatopteris sudetica* (A. Br. et Milde) A. Khokhr. - Пузырник судетский. Изредка, преимущественно в темнохвойных лесах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар. О.