

Сем. Balsaminaceae A.Rich. - Бальзаминовые

349. *Impatiens noli-tangere* L. - Недотрога обыкновенная. Часто, на полянах и под пологом леса, иногда доминирующий вид в буко-пихтарниках. В тисо-самшитовой роще. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

Сем. Berberidaceae Juss. - Барбарисовые

350. *Berberis vulgaris* L. - Барбарис обыкновенный. Изредка, на освещенных местоположениях, по полянам, каменистым склонам, на каменистых и зарастающих осыпях. Изредка, по скалам альпийского, субальпийского поясов. Г.Фишт, редко, на скалах в субальпийском поясе. До верхн. (петр.) (1-9). Бор.-евр.

351. *Epimedium colchicum* (Boiss.) Trautv. - Горянка колхидская. Эндем. Реликт. По сырым тенистым местам, тисо-самшитовая роща. Нижн. (гигр.) (8,9). Древн.л.-колх.др. О.

Сем. Betulaceae S.F.Gray. - Березовые

352. *Alnus barbata* С.А.Меу. - Ольха бородатая. В тисо-самшитовой роще. Нижн. (гигр.) (10).

353. *A.glutinosa* (L.) Gaertn. - Ольха клейкая. Реликт. Обычно, по берегам рек и ручьев, на галечниковых отмелях, на переувлажненных участках горных склонов. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

354. *A.incana* (L.) Moench - Ольха серая. Часто, по берегам рек и ручьев, единично и группами. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-евр.

355. *Betula litwinowii* Doluch. - Береза Литвинова. Образует чистые древостои и в смеси с другими видами лиственных пород на верхнем пределе леса. Изредка встречаются единичные экземпляры выше верхней границы леса. Массив Фишт - Оштен, до субальпийского пояса, на северных склонах. Верхн. предел леса (м.) (1-7,11). Бор.-палеар.

356. *B. pendula* Roth (*B. verrucosa* Ehrh.) - Береза повислая. Входит в состав древостоя (верхний предел леса), а также образует вторичные древостои на вырубках, пожарищах. До верхн. (м.) (1-9).

357. *Carpinus betulus* L. (*C. caucasica* Grossh.) - Граб обыкновенный. Реликт. Обычен в I и II ярусах широколиственных лесов, под пологом темнохвойных. Играет заметную роль при зарастании вырубок, полей. Редко, единичные экземпляры выше границы леса. На субальпийском лугу восточного склона г. Фишт на высоте 1700 м н.ур.м. До верхн. (м.) (1-11). Ксер.-средиз.

358. *C. orientalis* Mill. - Граб восточный, грабинник. Реликт. Нередко, по лесным опушкам, на известняковых склонах и вырубках, реже под пологом широколиственного леса. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Ксер.-средиз.

359. *Corylus avellana* L. - Лещина обыкновенная. Повсеместно в подлеске широколиственных лесов, на полянах и опушках, в составе лавинного криволесья. До средн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

360. *Ostrya carpinifolia* Scop. - Хмелеграб обыкновенный. Реликт. Редко, в лесах и по опушкам в заповеднике и близ него, известны местонахождения в долине р.Тегинка близ лагеря Тегеня, у подножия г.Фишт, урочище «Горелое». В районе р. М.Тепляки на известняках. Тисо-самшитовая роща, редко. До средн. (м.) (2,3,10,11). Древн.л.-м.аз.-средиз.др. О.

#### Сем. Blechnaceae (C.Presl) Copel. - Дербянковые

361. *Blechnum spicant* (L.) Roth (*Osmunda spicant* L.) - Дербянка колосистая. Реликт. Буковые леса, г. Маврикошка, Армянский хр. (Альпер, 1941). До верхн. (м.) (11).

#### Сем. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые

362. *Aegonychon purpureocaeruleum* (L.) Holub (*Lithospermum purpureocaeruleum* L.) - Воробейник фиолетовый. Тисо-самшитовая роща, в широколиственных лесах. Нижн. (м.) (10). Средиземн.-евр.

363. *Brunnera macrophylla* (Adams) Johnst. - Брунера

крупнолистная. Эндем. Реликт. Редко, в лесах. Тисо-самшитовая роща, изредка, преимущественно, в дубовых лесах. Нижн. (м.) (8,9,10). Древн.л.-колх.др.

364. *Cerintho alpina* Kit. = *C. glabra* Mill. - воскоцвет альпийский. В альпийском поясе на щебнистых местах и осыпях. Массив Фишт - Оштен, на каменистых местах и осыпях в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Бор.-евр.

365. *C. minor* L. - Воскоцвет малый. Редко, на осыпях и альпийских лугах. Массив Оштен, редко, как сорное. Верхн. (петр.) (1-9,11). Ксер.-средиз.

366. *Cynoglossum montanum* L. (*C. germanicum* Jacq.) - Чернокорень горный. Нередко, в тенистых местах, в лесах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

367. *C. officinale* L. - Чернокорень лекарственный. Челепсинский хребет, среди субальпийского высокоотравья, хр. Ачишхо, Черкесский перевал, подножие г.Оштен. Встречается как сорное. Верхн. (м.) (6,8,11).

368. *Echium maculatum* L. (*E. rubrum* Jacq., *E. ruscicum* J.F.Gmel.) - Синяк пятнистый. Повсеместно, довольно редко на травянистых склонах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

369. *E. vulgare* L. - Синяк обыкновенный. Нередко как сорное при дорогах, на пустырях и каменистых склонах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

370. *Eritrichium caucasicum* (Albov) Grossh. - Незабудочник кавказский. Эндем. Изредка на альпийских лугах, осыпях, скалах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк..

371. *Lappula myosotis* Moench = *L. squarrosa* (Retz.) Borb.) (*L. heteracantha* (Ledeb.) Borb.) - Липучка незабудка. Редко, как сорное, при дорогах, по обрывам, галечникам. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

372. *Lithospermum officinale* L. - Воробейник лекарственный. Редко, в светлых лесах, среди кустарников. Сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

373. *Macrotomia echioides* (L.) = *Huynhia pulchra* (Roem et Schult.) - Макротомия синяковидная. На субальпийских лугах, часто. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

374. *Myosotis alpestris* F.W.Schmidt - Незабудка альпийская. На субальпийских и альпийских лугах. Ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, часто на альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

375. *M. amoena* (Rupr.) Boiss. - Незабудка приятная. Эндем. Редко, на лесных полянах. Ст. Джуга. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

376. *M. arvensis* (L.) Hill - Незабудка полевая. Нередко, в

355. *Betula litwinowii* Doluch. - Береза Литвинова. Образует чистые древостои и в смеси с другими видами лиственных пород на верхнем пределе леса. Изредка встречаются единичные экземпляры выше верхней границы леса. Массив Фишт - Оштен, до субальпийского пояса, на северных склонах. Верхн. предел леса (м.) (1-7,11). Бор.-палеар.

356. *B. pendula* Roth (*B. verrucosa* Ehrh.) - Береза повислая. Входит в состав древостоя (верхний предел леса), а также образует вторичные древостои на вырубках, пожарищах. До верхн. (м.) (1-9).

357. *Carpinus betulus* L. (*C. caucasica* Grossh.) - Граб обыкновенный. Реликт. Обычен в I и II ярусах широколиственных лесов, под пологом темнохвойных. Играет заметную роль при зарастании вырубок, полян. Редко, единичные экземпляры выше границы леса. На субальпийском лугу восточного склона г. Фишт на высоте 1700 м н.ур.м. До верхн. (м.) (1-11). Ксер.-средиз.

358. *C. orientalis* Mill. - Граб восточный, грабинник. Реликт. Нередко, по лесным опушкам, на известняковых склонах и вырубках, реже под пологом широколиственного леса. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Ксер.-средиз.

359. *Corylus avellana* L. - Лещина обыкновенная. Повсеместно в подлеске широколиственных лесов, на полянах и опушках, в составе лавинного криволесья. До средн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

360. *Ostrya carpinifolia* Scop. - Хмелеграб обыкновенный. Реликт. Редко, в лесах и по опушкам в заповеднике и близ него, известны местонахождения в долине р.Тегинка близ лагеря Тегеня, у подножия г.Фишт, урочище «Горелое». В районе р. М.Тепляки на известняках. Тисо-самшитовая роща, редко. До средн. (м.) (2,3,10,11). Древн.л.-м.аз.-средиз.др. О.

Сем. Blechnaceae (C.Presl) Copel. - Дербяנקовые

361. *Blechnum spicant* (L.) Roth (*Osmunda spicant* L.) - Дербянка колосистая. Реликт. Буковые леса, г. Маврикошка, Армянский хр. (Альпер, 1941). До верхн. (м.) (11).

Сем. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые

362. *Aegonychon purpureoaeeruleum* (L.) Holub (*Lithospermum purpureoaeeruleum* L.) - Воробейник фиолетовый. Тисо-самшитовая роща, в широколиственных лесах. Нижн. (м.) (10). Средиземн.-евр.

363. *Brunnera macrophylla* (Adams) Johnst. - Брунера

крупнолистная. Эндем. Реликт. Редко, в лесах. Тисо-самшитовая роща, изредка, преимущественно, в дубовых лесах. Нижн. (м.) (8,9,10). Древн.л.-колх.др.

364. *Cerintho alpina* Kit. = *C. glabra* Mill. - воскоцвет альпийский. В альпийском поясе на щебнистых местах и осыпях. Массив Фишт - Оштен, на каменных местах и осыпях в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Бор.-евр.

365. *C. minor* L. - Воскоцвет малый. Редко, на осыпях и альпийских лугах. Массив Оштен, редко, как сорное. Верхн. (петр.) (1-9,11). Ксер.-средиз.

366. *Cynoglossum montanum* L. (*C. germanicum* Jacq.) - Чернокорень горный. Нередко, в тенистых местах, в лесах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

367. *C. officinale* L. - Чернокорень лекарственный. Челепсинский хребет, среди субальпийского высокотравья, хр. Ачишо, Черкесский перевал, подножие г.Оштен. Встречается как сорное. Верхн. (м.) (6,8,11).

368. *Echium maculatum* L. (*E. rubrum* Jacq., *E. russicum* J.F.Gmel.) - Синяк пятнистый. Повсеместно, довольно редко на травянистых склонах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

369. *E. vulgare* L. - Синяк обыкновенный. Нередко как сорное при дорогах, на пустырях и каменных склонах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

370. *Eritrichium saucasicum* (Albov) Grossh. - Незабудочник кавказский. Эндем. Изредка на альпийских лугах, осыпях, скалах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк..

371. *Lappula myosotis* Moench = *L. squarrosa* (Retz.) Borb.) (*L. heteracantha* (Ledeb.) Borb.) - Липучка незабудка. Редко, как сорное, при дорогах, по обрывам, галечникам. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

372. *Lithospermum officinale* L. - Воробейник лекарственный. Редко, в светлых лесах, среди кустарников. Сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

373. *Macrotomia echioides* (L.) = *Huynhia pulchra* (Roem et Schult.) - Макротомия синяковидная. На субальпийских лугах, часто. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

374. *Myosotis alpestris* F.W.Schmidt - Незабудка альпийская. На субальпийских и альпийских лугах. Ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, часто на альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

375. *M. amoena* (Rupr.) Boiss. - Незабудка приятная. Эндем. Редко, на лесных полянах. Ст. Джуга. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

376. *M. arvensis* (L.) Hill - Незабудка полевая. Нередко, в

светлых лесах и на луговых полянах, пустырях. Тисо-самшитовая роща. На субальпийских лугах. Сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-голар.

377. *M. sparsiflora* Pohl - Незабудка редкоцветная. Редко, по влажным тенистым местам, под пологом леса, в кустарниках. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

378. *M. sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. - Незабудка лесная. Редко, под пологом леса. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

379. *Nonea intermedia* Ledeb. - Нонеа промежуточная. Эндем. На лугах. От верхнего лесного до альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

380. *Omphalodes cappadocica* (Willd.) DC. - Пупочник копадокийский. По берегам ручьев в тенистых лесах, тисо-самшитовая роща. Высоко декоративное. До средн. (гигр.-м.) (8,11). Кавк.-колх.

381. *O. lojkae* Somm. et Levier - Пупочник Лойки. Эндем. На скалах в альпийском поясе. Верхн. (к.) (1-7). Кавк.-колх.

382. *Onosma armeniaca* Klok. ex M. Pop. = *O. setosa* Ledeb. - Оносма армянская. На субальпийских лугах. Ст. Джуга. Туровая крепость. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-м.аз.

383. *Pulmonaria mollissima* M. Pop. = *P. mollis* Wulf. ex Hornem. (*P. dastica* Simonc.) - Медуница мягчайшая. Реликт. Часто на высокотравных лугах и полянах лесного пояса, по опушкам. На альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

384. *Symphytum asperum* Lepech. - Окопник жесткий. Эндем. Часто, по опушкам, высокотравным полянам. На верхней границе леса и среди субальпийского высокотравья. Ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, обычен среди высокотравья. Средн., верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-колх.

385. *S. grandiflorum* DC. - Окопник крупноцветковый. Эндем. Реликт. Редко, в тенистых широколиственных лесах. До средн. (м.) (2,3,8,9,10). Древн.л.-колх.др.

386. *Trachystemon orientalis* (L.) G. Don fil (*Nordmannia orientalis* (L.) Stev.) - Трахистемон восточный. Реликт. Редко, под пологом тенистых лесов, в тисо-самшитовой роще. До верхн. (м.) (2,3,8,9,10). Древн.л.-колх.др.

Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss. nom. altern.) -  
Крестоцветные

387. *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande, (*A. officinalis* Andrz. ex Bieb.) - Чесночник черешчатый. Реликт.

Изредка, под пологом лесов. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

388. *Alyssum murale* Waldst. et Kit. - Бурачек степной. На скалах и каменистых склонах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (к.) (1-9). Ксер.-вост. средиз.

389. *A. rostratum* Stev. - Бурачек носатый. На скалах альпийского и субальпийского поясов. Редко. Верхн. (к.) (1-9).

390. *A. tortuosum* Waldst. et Kit. ex Willd. (*A. bracteatum* auct.) - Бурачек извилистый. На скалах и щебнистых местах альпийского пояса. Массив Оштен, редко, на осыпях. Верхн. (петр.) (11). Вост.-средиз.

391. *A. trichostachum* Rupr. - Бурачек пушистый. Эндем. На лугах, скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, обычно на осыпях и каменистых склонах. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк. - колх.-гирк.-горн.

392. *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. - Резушка Тяля. Редко, при дорогах, в посевах, на каменистых склонах. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

393. *Arabis caucasica* Schlecht. (*A. dolichothrix* N. Busch. (Grossh.), *A. flaviflora* Bunge) - Резуха кавказская. Эндем. Часто, на скалах. Нижн. (петр.) (1,2,3,5,6,8,9). Древн.л.-колх. др.

394. *A. gerardii* (Bess.) Koch - Резуха Жерара. Изредка в лесах и кустарниках на обнажениях известняковых скал, по берегам рек. До средн. (петр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

395. *A. hirsuta* (L.) Scop. - Резуха шершавая. Редко, на сухих склонах и луговых полянах. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

396. *A. nordmanniana* Rupr. - Резуха Нордманна. Эндем. Реликт. Редко, в самшитниках, пихтарниках и буко-пихтарниках, на сырых местах и скалах. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Древн.л.-колх. др.

397. *A. sachokiana* (N. Busch.) N. Busch (*Arabis magna* (N. Busch.) Grossh., *Cardamine sachokiana* N. Busch.) - Резуха Сахока. Эндем. На известняковых скалах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (11).

398. *Barbarea arcuata* (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. = *B. vulgaris* R.Br. - Сурепка дуговидная. Редко, в лесах, на сорных лугах. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

399. *B. minor* C.Koch - Сурепка малая. На влажных каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-м.аз.

400. *Brassica campestris* L. (*B. rapa* L.) - Капуста полевая. Изредка, на открытых сорных местах, в огородах, при дорогах. Нижн. (м.) (1,2,5). Ксер.-ц.аз.

401. *Bunias orientalis* L. - Свеберга восточная. Редко, на полянах, по открытым склонам, при дорогах как сорное. Нижн. (м.) (1,2,5). Ксер.-п.аз.

402. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. (*C. hircana* Grossh.) - Пастушья сумка обыкновенная. Изредка, по обочинам троп и дорог, на сорных местах лесного и субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

403. *Cardamine hirsuta* L. - Сердечник шершавый. Редко, на влажных местах. Нижн. (гигр.) (1,2,3). Бор.-евр.

404. *C. impatiens* L. - Сердечник недотрога. Реликт. Повсеместно, под пологом леса и на субальпийских лугах. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

405. *C. lazica* Boiss. et Bal. - Сердечник лазистанский. Реликт. Редко, по берегам рек и ручьев. Нижн. (гигр.) (1,2,3,8,9). Древн. л.-колх.др.

406. *C. parviflora* L. - Сердечник мелкоцветный. На влажных осыпях альпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

407. *C. pectinata* Pall. ex DC. - Сердечник гребенчатый. Реликт. Редко, в тенистых лесах по берегам рек. По влажным местам субальпийских лугов. До верхн. (гигр.) (1,9). Древн.-л.-колх.др.

408. *C. seidlitziana* Albov (*C. acris* auct.) - Сердечник Зейдлица. Эндем. Реликт. По влажных местах и у ручьев в субальпийском поясе. Верхн. (гигр.) (1-9,11). Древн. л.-колх.др.

409. *C. tenera* S.G.Gmel. ex C.A.Meу. - Сердечник нежный. На влажных местах. Тисо-самшитовая роща. До средн. (гигр.) (10). Кавк.-колх.-гирк.

410. *C. uliginosa* Vieb. - Сердечник болотный. На влажных местах и у ручьев лесного, субальпийского и альпийского поясов. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

411. *Dentaria bipinnata* C.A.Meу. - Зубянка двояко-перистая. Эндем. На осыпях альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, характерен для движущихся осыпей в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

412. *D. bulbifera* L. - Зубянка клубненосная. Реликт. Обычно, в пихтовых и буково-пихтовых лесах. Массив Оштен, в верхнем лесном поясе. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-евр.

413. *D. microphylla* Willd. - Зубянка мелколистная. Эндем. На осыпях в высокогорных поясах. Верхн. (петр.) (1-9).

414. *D. quinquefolia* Vieb. - Зубянка пятилистная. Реликт. Часто, под пологом тенистых лесов. На осыпях субальпийского пояса, в т.ч. на г. Оштен. Тисо-самшитовая роща, в самшитовых лесах. До верхн. (м.) (1-11). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.



415. *Draba bruniifolia* Stev. (*D. diversifolia* Boiss. et Huet) - Крупка буроватолистная. Эндем. На скалах и осыпях альпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, изредка, на скалах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

416. *D. bryoides* DC. - Крупка моховидная. Эндем. На скалах альпийского пояса, в т.ч. на г.Оштен. Верхн. (к.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

417. *D. hispida* Willd. - Крупка щербистая. Реликт. Повсеместно, на скалах, осыпях, щербистых местах, по берегам озер и рек лесного пояса. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. До верхн. (петр.) (1-9,11). Древн.л.-колх.др.

418. *D. longisiliqua* Schmalh. - Крупка длинностручковая. Эндем. На известняковых скалах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (к.) (1-9).

419. *D. nemorosa* L. - Крупка перелесковая. Редко, на луговых полянах, травянистых склонах, галечниковых отмелях лесного пояса. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

420. *D. scabra* С.А.Мей. - Крупка шершавая. Эндем. На скалах и осыпях альпийского пояса, часто на каменистых склонах и осыпях массива Фишт - Оштен, в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-зап.кавк.

421. *D. sibirica* (Pall.) Thell. - Крупка сибирская. На альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

422. *D. siliquosa* Bieb. (*D. subglabra* (Rupr.) Tolm.) - Крупка стручковая. Эндем. На скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Ст. Джуга. Массив Оштен, изредка на щербистых местах. Верхн. (петр.) (1-9,11). Ксер.-п.аз.

423. *D. subsecunda* Somm. et Levier - Крупка однобокая. Эндем. На скалах альпийского пояса, очень редко. Морены Б.Уруштенского ледника (собрана А.И.Лесковым). Верхн. (петр.) (4).Кавк. - колх.-горн.

424. *Erysimum aureum* M.B. - Желтушник золотистый. Эндем. Реликт. Изредка, по влажным местам в лесном поясе. До верхн. (гигр.) (1-9). Кавк.-кавк.

425. *E. cuspidatum* (Bieb.) DC. - Желтушник щитовидный. На скалах и осыпях субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9,11). Ксер.-вост.-средиз.

426. *E. ibericum* (Adams) DC. - Желтушник грузинский. Эндем. На скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (к.) (1-9). Кавк.-кавк.

427. *Eunomia rotundifolia* С.А.Мей. - Эвномия круглолистная. Эндем. На осыпях альпийского пояса, верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

428. *Hesperis matronalis* L. (*H.caucasica* Rupr. p.p) - Вечерница ночная фиалка. Эндем. Обычно, под пологом леса, на полянах, по опушкам. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-средиз.

429. *H. voronovii* N.Busch. (*H.sylvestris* auct.p.p.) - Вечерница Воронова. Эндем. На известняках. Очень редко, г.-Фишт. Верхн. (м.) (11).

430. *Iberis taurica* DC. - Разнолистник крымский. Эндем. Осыпи и каменистые места альпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, характерен для движущихся осыпей и каменистых лужаек альпийского пояса. Верхн. (петр.)(1-9,11). Ксер.-п.аз.

431. *Matthiola boissieri* Grossh. (*M.odoratissima* Bieb .R. Br.) - Левкой Буасье. На известняках массива Балканы. Тисо-самшитовая роща. Нижн. Средн. (к.) (6,10). Ксер. - таврич.

432. *Pachyphragma macrophyllum* (Hoffm.) N.Busch - Толстостенка крупнолистная. Реликт. Часто, преимущественно в широколиственных и буково-пихтовых лесах. До верхн. (м.) (1,2,3,4,8,9). Др.л.-колх.др.

433. *Phryne huetii* (Boiss.) O.E.Schulz = *Murbeckiella huetii* (Boiss.) Rothm. - Фрина Хюта. На каменистых и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (к.) (1-9). Кавк.-кавк.

434. *Rorippa palustris* (L.) Bess. (*Rorippa islandica* auct.) - Жерушник болотный. Нередко, на влажных местах, по болотам, по берегам. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.

435. *Sinapis arvensis* L. - Горчица полевая. Нередко как сорное у огородов, троп и дорог в лесном поясе и на субальпийских лугах. До верхн. (м.) 9 1-9). Ксер.-средиз.

436. *Sisymbrium erucastrifolium* (Rupr.) Trautv. - Гулявник эриколистный. Эндем. Под навесом скал. Очень редко, хр.М.Бамбак. Верхн. (к.) (2). Кавк.-вост.-кавк.

437. *S. officinale* (L.) Scop. - Гулявник лекарственный. Обычно, у дорог, изгородей, в кустарниках как сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,8,9). Бор.-евр.

438. *Thlaspi arvense* L. - Ярутка полевая. На субальпийских лугах. Сорное. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

439. *T.orbiculatum* Stev. = *Neurotropis orbiculata* (Stev.) F.K.Mey. - Ярутка округлая. Эндем. Редкое для Кавказа растение. Найдено А.И.Лесковым только один раз (ущелье в верховье р.Циде у г.Нагой-Чук, на галечнике). Верхн. (м.) (11). Иберийск.

440. *T. pumilum* (Stev.) Ledeb. = *Nossaea pumila* (Stev.) Steud.  
- Ярутка карликовая. Эндем. На осыпях и каменистых местах альпийского пояса. Очень редко. Хребет на водоразделе рек Рошкоа, Блыб. Верхн. (м.) (11). Кавк.-кавк.

441. *Turritis glabra* L. - Башенница (вяжечка) гладкая. Нередко, на сухих склонах, вырубках, сорных местах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

Сем. Вухасеае Dumort. - Самшитовые

442. *Vuxus colchica* Rojark. - Самшит колхидский. Реликт. Спорадически в нижних ярусах лиственных лесов, в ущельях, на известняках, преимущественно на южном макросклоне Главного Кавказского хребта. Реки Шахе, Бзыч. Тисо-самшитовая роща. По северному макросклону р. Цице, Гуамское ущелье, по р. Курджипс. До средн. (м.) (9,10,11). Древн.-л.-колх.др. О.