

Сем. Callitricaceae Link - Водянные звездочки
(Болотниковые)

443. *Callitriche verna* L= *C. palustris* L. - Болотник весенний. На болотах субальпийского пояса. Редко. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.

Сем. Campanulaceae Juss. - Колокольчиковые

444. *Asyneuma campanuloides* (Bieb. ex Sims) Bornm. - Ази-неума колокольчиковидная. Повсеместно, на полянах и в составе высокотравья на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

445. *Campanula albobovii* Kolak. - Колокольчик Альбова. На субальпийских и альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

446. *C. alliariifolia* Willd. (*C. ochroleuca* Kem.-Nath.) - Колокольчик чесночницелистный. Изредка на скалах (преимущественно известняковых) и сухих склонах. До верхн. (петр.) (1-9). Ксер.-п.аз.

447. *C. anomala* Fomin - Колокольчик необычный. Эндем. В альпийском поясе на скалах. Верхн.(м.) (1-9,11).

448. *C. argunensis* Rupr. - Колокольчик аргунский. Эндем. На альпийских лугах. Редко. Гг.Ятыгварта, Тхач, Ачешбок, хр. Псеашха. Верхн. (м.) (1,2,5,7).

449. *C. aucheri* A. DC. - Колокольчик Оше. В альпийском поясе на скалах. Верхн. (петр.) (1-9).

450. *C. autraniana* Albov - Колокольчик Отрана. Эндем. Реликт. На скалах г. Фишт. Верхн. (петр.) (11). Древн.л.-колх.-др. О.

451. *C. biebersteiniana* Schult. (*C. tridens* Rupr., *C. tridentata* Schreb.) - Колокольчик Биберштейна. Эндем. На альпийских лугах, повсеместно, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

452. *C. bononiensis* L. - Колокольчик болонский. Редко, на суховатых послелесных лугах, в кустарниках. Нижн. (к.м.) (1,2,3). Бор.-палеар.

453. *C. ciliata* Stev. - Колокольчик реснитчатый. Эндем. На скалах и альпийских лугах. Верхн. (петр.) (1-9,11).

454. *C. circassica* Fomin - Колокольчик черкесский. Эндем. На осыпях и альпийских лугах. Перевал Псеашха, г. Уруштен. Верхн. (петр.) (4, 8).

455. *C. collina* Sims. - Колокольчик холмовой. На альпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, часто на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

456. *C. cordifolia* C.Koch. - Колокольчик сердцелистный. Эндем. Редко, по лесным опушкам, по берегам рек. До средн. (1,2,3,5,6,8,9,10). Кавк.-кавк.

457. *C. glomerata* L. - Колокольчик сборный. На лугах и лесных полянах. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

458. *C. grossheimii* Charadze = *C. rapunculoides* L. - Колокольчик Гроссгейма. Эндем. На лугах. В субальпийском поясе. Верхн. (м.) (1-9).

459. *C. hohenackeri* Fisch. et Mey. - Колокольчик Гогенаккера. Эндем. Редко, на галечниках, по берегам рек в лесном поясе. В субальпийском поясе на скалистых местах. Верховье р. М.Лаба. Верхн. (м.) (1-9).

460. *C. kluchorica* Kolak. - Колокольчик клухорский. Эндем. На щебнистых местах. В верхнем и субальпийском поясах. Верховье р. М.Лаба. Верхн. (к.) (6).

461. *C. kryophila* Rupr. - Колокольчик холодолюбивый. Эндем. На скалах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

462. *C. lactiflora* Bieb. = *Gadellia lactiflora* (Bieb.) Schulkina - Колокольчик молочнокветковый. Реликт. Часто в составе высокотравья, по опушкам и на лесных полянах. На субальпийских высокотравных лугах. Верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

463. *C. latifolia* L. - Колокольчик широколистный. Реликт. Часто, в составе лесного и субальпийского высокотравья. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

464. *C. leskovii* Fed. - Колокольчик Лескова. Эндем. Редко, на известняковых скалах. Встречен на водоразделе рек Мзымта и Шахе (над р.Сочи.), в верховьях р.М. Лаба.. Верхн. (петр.) (6,8,9). Кавк.-кавк.

465. *C. longistyla* Fomin - Колокольчик длинностолбиковый. Эндем. Реликт. Тисо-самшитовая роща, по опушкам. Нижн. (м.) (10).

466. *C. oblongifolia* (C. Koch.) Charadze - Колокольчик продолговатолистный. На субальпийских лугах, в т.ч. на г. Фишт. Верхн. (м.) (1-9,11).

467. *C. rapunculoides* L. - Колокольчик рапунциевидный. Реликт. Часто, на лугах, галечниках, по берегам рек, на каменистых местах. Массив Фишт, редко, на субальпийских лугах. До верхн. (к.с.м.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Бор.-палеар.

468. *C. sarmatica* Ker-Gawl. - Колокольчик сарматский. Эндем. Изредка, на скалах и осыпях. Массив Фишт - Оштен, часто на каменистых местах в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11).

469. *C. saxifraga* Bieb. - Колокольчик камнеломка. Эндем. Изредка, на скалах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11).

470. *C. siegismundi* Fed. - Колокольчик Сигизмунда. На скалах. В верховье р. М.Лаба, г. Оштен. Верхн. (петр.) (7,11).

471. *C. sphaerocarpa* Kolak. - Колокольчик округлоплодный. На скалах в альпийском поясе, г. Тхач. Верхн. (петр.) (6).

472. *C. taurica* Juz. - Колокольчик крымский. Редко, на галечниках и лесных полянах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Кавк.-кавк.

473. *C. trautvetteri* Grossh. ex Fed. - Колокольчик Траутфеттера. Эндем. На лугах и скалах, в альпийском поясе. В верховьях рек М. Лаба и Мзымта. Верхн. (петр.) (7,8).

474. *C. woronowii* Charadze - Колокольчик Воронова. Эндем. На альпийских лугах, г. Фишт. Указан А.А.Гроссгеймом. (1940) Верхн. (м.) (11).

475. *Symphyantra pendula* (Bieb.) A. DC. = *Campanula pendula* (Bieb.) A. DC. - Симфиандра повислая. Эндем. На скалах, редко. Средн. (петр.) (2,5). Кавк.-кавк.

Сем. Cannabaceae Endl. - Коноплевые

476. *Humulus lupulus* L. - Хмель обыкновенный. Довольно редко. В зарослях кустарников по берегам рек, в широколиственных лесах. До средн. (м.) (1,2,5,9). Бор.-палеар.

Сем. Caprifoliaceae Juss. - Жимолостные

477. *Lonicera buschiorum* Pojark. - Жимолость Бушей. Эндем. Редко, под пологом леса. Известна с хр. Пшекиш (пихтовый лес). Верхн. (м.) (2). Кавк.-кавк.

478. *L. caprifolium* L. - Жимолость душистая, каприфоль.

Реликт. Повсеместно, в смешанно-широколиственных, дубовых, сосновых лесах, по опушкам, в кустарниках. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,10). Древн.л.-колх.др.

479. *L. caucasica* Pall. = *L. orientalis* Lam. - Жимолость кавказская. Повсеместно, единично под пологом леса на лугах и в кустарниках. Верхн. (м.) (2,3,4,5,6,8,9). Кавк.-кавк.

480. *L. steveniana* Fisch. ex Pojark. - Жимолость Стевена. Нередко в лесах, по берегам и в субальпийском поясе. Средн. Верхн. (м.) (5,6,7). Кавк.-кавк.

481. *Sambucus ebulus* L. (Сем. *Sambucaceae* Batsch ex Borkh.) - Бузина травянистая. Нередко, на сорных местах, полянах, у дорог, жилищ, по опушкам. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

482. *S. nigra* L. - Бузина черная. Повсеместно, в составе подлеска смешанно-широколиственных и буково-пихтовых лесов, у дорог, по берегам рек. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

483. *Viburnum lantana* L. (Сем. *Viburnaceae* Rafin) - Калина гордовина. Реликт. Повсеместно, по опушкам, полянам, на каменистых участках и скалах, единично. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

484. *V. opulus* L. - Калина обыкновенная. Повсеместно, в смешанно-широколиственных лесах, по опушкам, берегам рек, единично и группами. Тисо-самшитовая роща, очень редко, по опушкам, на влажных местах. До средн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

Сем. *Caryophyllaceae* Juss. - Гвоздичные

485. *Agrostemma githago* L. - Куколь полевой. Редко, на сорных местах, вырубках. До средн. (м.) (1,2,3,5,8,9). Бор.-палеар.

486. *Arenaria lychnidea* Vieb. = *Eremogone lychnidea* (Vieb.) Rupr. - Песчанка горчицветная. Эндем. На скалистых и щебнистых местах лугового пояса. Верхн. (м.) (1-9).

487. *A. rotundifolia* Vieb. - Песчанка круглолистная. На субальпийских и альпийских лугах, скалах. Изредка. Верхн. (м.) (1-9).

488. *A. serpyllifolia* L. - Песчанка тимьянолистная. Изредка, в светлых лесах и редколесьях, в долинах рек. В субальпийском поясе, сорное. Изредка. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

489. *Cerastium arvense* L. - Ясколка полевая. Редко, на скалистых участках лесного и осыпях субальпийского пояса. Средн. (петр.) (1-9). Бор.-голар.

490. *C. cerastoides* (L.) Britt. = *Dichodon cerastoides* (L.) Reichenb. - Ясколка трехстолбиковая. Редко, на щебнистых влажных местах и осыпях, у ручьев в лесном поясе. На влажных щебнистых местах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, на влажных альпийских лугах. Средн., верхн. (гигр.-м.) (1-9,11). Бор.-голар.

491. *C. davuricum* Fisch. ex Spreng. - Ясколка даурская. Часто, по опушкам, полянам и в высокоотравье. В верхней части лесного пояса среди субальпийского высокоотравья, на альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

492. *C. hemschianicum* Schischk. - Ясколка хемшинская. До альпийского пояса, по опушкам и на лугах. До верхн. (м.) (1-9).

493. *C. holosteum* Fisch. ex Hornem. - Ясколка кавказская. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

494. *C. multiflorum* C.A. Mey. - Ясколка многоцветковая. Эндем. На скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9).

495. *C. polymorphum* Rupr. - Ясколка полиморфная. Эндем. На осыпях и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, часто на скалах и осыпях в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11).

496. *C. purpurascens* Adams - Ясколка пурпурная. На альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. Массив Фишт-Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

497. *C. ruderale* Vieb. - Ясколка сорная. Эндем. На альпийских лугах. Редко. Верховье р. Мзымта. Верхн. (м.) (8).

498. *C. undulatifolium* Somm. et Levier - Ясколка волнистолистная. Эндем. На щебнистых местах альпийского пояса. Собрана Н.П. Введенским на г. Оштен, на скалах. Верхн. (м.) (8,11).

499. *C. vulgatum* L. = *C. holosteoides* Fries. - Ясколка обыкновенная. Нередко, на лугах и сорных местах. Средн., верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

500. *Dianthus armeria* L. - Гвоздика армериевидная. Редко, в светлых лесах, на опушках, полянах, галечниковых отмелях. Редко, выше верхней границы леса. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

501. *D. capitatus* Valb. ex DC. - Гвоздика головчатая. На каменистых склонах субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

502. *D. caucaseus* Smith (*D. discolor* Smith, *D. seguieri* auct. p. p.) - Гвоздика кавказская. Эндем. Редко, на полянах, на

субальпийских и альпийских лугах. До средн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

503. *D.cretaceus* Adams - Гвоздика скальная. На лугах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, изредка на каменистых субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

504. *D.fragrans* Adams - Гвоздика душистая. Эндем. Довольно редко, на каменистых склонах и скалах лесного и субальпийского пояса. До верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

505. *D.imereticus* (Rupr.) Schischk. - Гвоздика имеретинская. Эндем. На скалах субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

506. *D.kusnezovii* Marg. - Гвоздика Кузнецова. Эндем. На альпийских лугах и скалах. Массив Оштен, найдена на альпийском лугу. Верхн. (м.) (1-9,11).

507. *D.oschtenicus* Galushko - Гвоздика оштенская. Эндем. На лугах, от среднегорного до альпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9).

508. *D.ruprechtii* Schischk. - Гвоздика Рупрехта. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Изредка, в светлых лесах и на луговых полянах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

509. *Gypsophila elegans* Vieb. - Кичим изящный. Нередко, на каменистых склонах, галечниках, известняках лесного пояса и на каменистых местах в субальпийском поясе. До верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

510. *G.silenoides* Rupr. - Кичим смолевковидный. На каменистых местах. Верховье р.Мзымта, в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (8).

511. *G.tenuifolia* Vieb. - Кичим узколистный. Эндем. На каменистых местах и скалах альпийского пояса. Часто, на скалах и камнях на массиве Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

512. *Melandrium album* (Mill.) Garcke - Дрема белая. Редко. На сорных местах лесного и субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1,2,3,5,9). Бор.-палеар.

513. *M.balansae* Boiss. (*M.latifolium* (Poir.) Maire) - Дрема Балансы. Часто, в лесах, на лугах, по опушкам, на полянах и сорных местах лесного пояса. В субальпийском поясе, сорное. Массив Оштен, близ Черкесского перевала. Собрана А.И.Лесковым на осыпях. До верхн. (м.) (1-7,11). Кавк.-кавк.

514. *M.noctiflorum* (L.) Fries = *Silene noctiflora* L. - Дрема ночная. Редко, в кустарниках, на луговых полянах и по опушкам. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

515. *Minuartia aizoides* (Boiss.) Bornm. - Минуарция ан-

цovidная. На щебнистых местах и скалах альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

516. *M. biebersteinii* (Rupr.) Schischk. - Минуарция Биберштейна. Эндем. На каменистых местах и скалах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9).

517. *M. brotherana* (Trautv.) Woronow - Минуарция Бротеруса. Эндем. Массив Оштен, осыпь на восточном склоне. Верхн. (петр.) (11).

518. *M. buschiana* Schischk. - Минуарция Буша. Эндем. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского пояса. Массив Оштен, редко на осыпях и скалах. Верхн. (петр.) (1-9,11).

519. *M. caucasica* (Adam ex Rupr.) Mattf. = *M. circassica* (Albov) Woronow - Минуарция кавказская. На скалах и щебнистых местах альпийского пояса. Массив Оштен, изредка на скалах. Верхн. (петр.) (1-9,11).

520. *M. colchica* Charadse - Минуарция колхидская. Эндем. На скалах и моренах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9).

521. *M. imbricata* (Bieb.) Woronow - Минуарция черепитчатая. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9).

522. *M. oreina* (Mattf.) Schischk. - Минуарция горная. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов, ст. Джуга, массив Фишт - Оштен, обычно на осыпях и скалах. Верхн. (петр.) (1-9,11).

523. *M. rhodocalyx* (Albov) Woronow - Минуарция краснотрапезная. Эндем. На осыпях альпийского пояса. Редко, гг. Фишт, Уруштен, Чуба. Верхн. (петр.) (4,9,11).

524. *M. verna* (L.) Hiern. - Минуарция весенняя. На скалах и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9).

525. *Moehringia trinervia* (L.) Clairv. - Морингия трехжилковая. Редко, под пологом леса. Средн., верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

526. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench. - Мягковолосник водяной. Нередко, на влажных местах под пологом буково-пихтового леса. На галечниках рек. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

527. *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link (*Tunica saxifraga* (L.) Scop.) - Туника камнеломка. На каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

528. *Sagina procumbens* L. - Мшанка лежачая. Изредка, на влажных местах в лесном поясе, а также на сырых местах и ключевых болотах субальпийского пояса. Верхн., средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

529. *S. saginoides* (L.) Korst. - Мшанка моховидная. Изредка на каменистых и влажных местах, на галечниках и по ручьям лесного пояса. На каменистых и влажных местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Оштен, около троп. Средн., верхн. (гигр.) (1-9,11). Бор.-палеар.

530. *Saponaria officinalis* L. - Мыльнянка лекарственная. Изредка, на лесных полянах и по опушкам в долинах рек. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

531. *Scleranthus annuus* L. - Дивала однолетняя. Редко, по берегам рек, на каменистых участках. Изредка, в субальпийском поясе, на сорных местах. До верхн. (петр.) (1-9). Бор.-евр.

532. *S. uncinatus* Schur - Дивала крючковатая. Редко, на сухих каменистых местах, в долинах рек. Изредка, в субальпийском поясе, на сорных местах. До верхн. (петр.) (1-9). Ксер.-средиз.

533. *Silene alpicola* Schischk. - Смолевка альпийская. Эндем. На скалах и каменистых местах альпийского пояса. Очень редко, г.Абаго, Псеашха, Б.Бамбак, Лохматый Шихан. Верхн. (петр.) (2,3,7).

534. *S. commutata* Guss. = *Oberna commutata* (Guss.) Ikonn. - Смолевка замещающая. Нередко, в разреженных лесах, по открытым склонам и опушкам. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

535. *S. compacta* Fisch. ex Hornem. - Смолевка скученноцветковая. Нередко, в лесу и на открытых местах. На альпийских и субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-п.аз.

536. *S. italica* (L.) Pers. - Смолевка итальянская. Редко, в светлых лесах, изредка на субальпийских лугах. Массив Оштен, на лугах близ пастушеских балаганов. До верхн. (м.) (2,3,11). Бор.-палеар.

537. *S. lacera* (Stev.) Sims = *Oberna lacera* (Stev.) Ikonn. - Смолевка разрезная. Эндем. На осыпях и каменистых местах альпийского пояса. Редко, г.Ачешбок, Тыбга, Мраморная. Верхн. (петр.) (2,4).

538. *S. latifolia* (Mill.) Britt. et Rendle = *Oberna behen* (L.) Ikonn. - Смолевка широколистная. Массив Оштен, встречена в субальпийском поясе, на склоне. Верхн. (м.) (11).

539. *S. lychnidea* С.А.Мей. - Смолевка горицветовидная. Эндем. На скалах и каменистых местах альпийского пояса. Редко, г.г. Ачешбок, Абаго, Б. Бамбак. Верхн. (петр.) (2,3).

540. *S. marcowiczii* Schischk. - Смолевка Марковича. Эндем.

На скалистых и каменистых местах альпийского пояса. Очень редко, г. Фишт, Джуга. Верхн. (петр.) (6, 11).

541. *S. multifida* (Adams) Rohrb. = *Oberna multifida* (Adams) Ikonn. - Смолевка многорассеченная. Изредка, на субальпийских лугах. Массив Оштен, на высокотравных лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

542. *S. pygmaea* Adams - Смолевка маленькая. Эндем. На скалах альпийского пояса. Очень редко, г. Ачешбок. Верхн. (петр.) (2).

543. *S. ruprechtii* Schischk - Смолевка Рупрехта. Эндем. На лугах и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, часто на скалах и осыпях в субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (петр.) (1-9,11).

544. *S. vulgaris* (Moench.) Garcke = *Oberna behen* (L.) Ikonn. - Смолевка обыкновенная. Нередко, в светлых лесах и на лугах. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

545. *S. wallichiana* Klotzsch. = *Oberna wallichiana* (Klotzsch) Ikonn. - Смолевка Валлиха (Уоллича). Обычно на лугах, в кустарниках, в лесном поясе, в составе высокотравья. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-ц.аз.

546. *Stellaria anagalloides* C.A. Mey. ex Rupr. - Звездчатка курослепая. Эндем. По берегам ручьев, на сорных местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (гигр.) (1-9).

547. *S. holostea* L. - Звездчатка ланцетовидная. Нередко, по опушкам и под пологом светлых лесов. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

548. *S. media* (L.) Vill. - Звездчатка мокрица. Изредка, в окрестностях кордонов. Нижн. (м.) (1,2,3,5,8,9). Бор.-палеар.

549. *S. nemorum* L. (*S. montana* auct.) - Звездчатка лесная. Нередко, в лесах, по сырым местам. Нижн., средн. (гигр.- мез.) (1,2,35,8,9). Бор.-евр.

550. *S. persica* Boiss. - Звездчатка персидская. На влажных местах и у ручьев в верхнегорном и субальпийском поясах. Верхн.(гигр.) (1-9).

Сем. Celastraceae R.Br. - Бересклетовые

551. *Euonymus europaea* L. - Бересклет европейский. Повсеместно, в подлеске дубовых и сосновых лесов, по опушкам. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

552. *E. latifolia* (L.) Mill. (*E. europaea* L., *Kolonymus latifolia* (L.) Prokh.) - Бересклет широколистный. Реликт. Спорадически под пологом тенистых лесов в долинах рек, единично и группами. До верхн. (м.) (1-10). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

553. *E. leiophloea* Stev. - Бересклет гладкокорый. Эндем. Реликт. Редко, в тенистых лесах, по склонам ущелий, единично. До верхн. (м.) (1-10). Древн.л.-колх.др.

554. *E. sempervirens* Rupr. - Бересклет вечнозеленый. Эндем. Тисо-самшитовая роща, преимущественно в широколиственных лесах. Нижн. (м.) (11). Древн.л.-колх.др.

555. *E. verrucosa* Scop. - Бересклет бородавчатый. Спорадически, по опушкам, в кустарниках, под пологом широколиственных лесов. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

Сем. Celtidaceae Link - Каркасовые

556. *Celtis australis* L. - Каркас южный. Тисо-самшитовая роща. Очень редко. В Агурском ущелье. Нижн. (м.) (10).

Сем. Chenopodiaceae Vent. - Маревые

557. *Atriplex patula* L. - Лебеда раскидистая. Редко, около кордонов, при дорогах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

558. *Chenopodium album* L. - Марь белая. Редко, около кордонов, по сорным местам. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

559. *Ch. foliosum* Aschers. - Марь многолистная. Редко, по полянам и опушкам. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

560. *Ch. glaucum* L. - Марь сизая. Редко, по сорным местам и огородам. Нижн. (м.) (1,2,5,8,9). Бор.-палеар.

561. *Ch. polyspermum* L. - Марь многосеменная. Редко, по сорным местам и огородам. Нижн. (м.) (1,2,5,8,9). Бор.-палеар.

Сем. Cistaceae Juss. - Ладанниковые

562. *Helianthemum buschii* (Palib.) Juz. et Pozd. (*H. canum* (L.) Baumg., *H. italicum* (L.) Pers.) - Солнцецвет Буша. На субальпийских и альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

563. *H. chamaecistus* Mill = *H. ovatum* (Viv.) Dun. - Солнцецвет войлочный. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

564. *H. grandiflorum* (Scop.) DC. (*H. nitidum* (Clementi) - Солнцецвет крупноцветковый. На лугах и скалах. От верхнего лесного до альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

565. *H. italicum* (L.) Pers. = *H. buschii* (Palub.) Juz. et Pozd. - Солнцецвет итальянский. На субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, обычно на щебнистых склонах в субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9,11).

566. *H. nummularium* (L.) Mill. - Солнцецвет монетный. Из-

редка, на известняковых склонах в светлых лесах на остепненных полянах. До верхн. (кс.) (1-9). Бор.-палеар.

567. *H. ovatum* (Viv.) Dun. - Солнцецвет яйцевидный. На щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, но реже чем предыдущий вид. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

Сем. *Commelinaceae* R.Br. - Коммелиновые

568. *Commelina communis* L. - Коммелина синеглазка. Редко, как сорное в огородах и населенных пунктах. (пос. Гузерипль). Нижн. (м.) (2). Адв.-адв.

Сем. *Convolvulaceae* Juss. - Вьюнковые

569. *Calystegia sepium* (L.) R.Br. - Повой заборный. Часто как сорное у дорог, в кустарниках и садах. До средн (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

570. *C. silvatica* (Kit.) Griseb. - Повой лесной. Нередко, на лесных полянах, по осыпям, в оврагах. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Ксер.-средиз.

571. *Convolvulus arvensis* L. - Вьюнок полевой. Часто в огородах, при дорогах как сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

Сем. *Cornaceae* Dumort. - Кизилы

572. *Cornus mas* L. - Кизил мужской. Реликт. Повсеместно, в лесах и на полянах, единично и группами. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Кавк.-кавк.

573. *Swida australis* (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. - Свида южная. Изредка, в подлеске дубовых лесов, единично. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Ксер.-п.аз.-ц.аз.

Сем. *Crassulaceae* DC. - Толстянковые

574. *Rosularia pilosa* (Bieb.) Boiss. = *Prometheum pilosum* (Bieb.) H. Ohba - Розеточница волосистая. Редко, на скалистых местах лесного пояса. До верхн. (петр.) (1-9). Ксер.-п.аз.

575. *Sedum acre* L. - Очиток едкий. Часто, на сухих склонах, песчаных местах, каменистых участках лесного пояса. Изредка, на осыпях субальпийского пояса. До средн. (кс.-м.) (1-9,11). Бор.-евр.

576. *S. caucasicum* (Grossh.) Voriss. = *Hylotelephium caucasicum* (Grossh.) H. Ohba - Очиток кавказский. Эндем. На скалах, по сухим и каменистым склонам, нередко. До верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

577. *S. gracile* C.A.Mey. - Очиток тонкий. На скалах и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-м.аз.

578. *S. hispanicum* L. - Очиток испанский. Редко, на сухих каменистых склонах. Средн. (петр.) (1-9). Ксер.-средиз.

579. *S. involocratum* Vieb. - Очиток обертковый. На лугах и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

580. *S. pallidum* Vieb. - Очиток бледный. На щебнистых и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9). Ксер.-вост.средиз.

581. *S. spurium* Vieb. - Очиток ложный. Реликт. Изредка, на скалистых местах, щебнистых склонах лесного пояса. На скалистых и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов, ст. Джуга, г.Оштен. Средн., верхн.(петр.) (1-9,11). Древн.л.-колх.др.

582. *S. stoloniferum* S.G.Gmel. - Очиток побегоносный. Реликт. Нередко, под пологом леса. Массив Фишт, в лесном поясе. До средн. (м.) (1-9,11). Древн.л.-колх.гирк.

583. *S. tenellum* Vieb. - Очиток тоненький. На скалах и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт, на скалах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

584. *Sempervivum caucasicum* Rupr. ex Boiss. - Молодило кавказское. Эндем. Нередко, на обнажениях песчаников и сланцев, а также известняковых скалах. На скалах альпийского и субальпийского поясов. Ст. Джуга. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

585. *S. pumilum* Vieb. (*S. altum* Turritill) - Молодило малорослое. Эндем. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) Кавк.-кавк.

586. *Umbilicus oppositifolius* (Ledeb.) Ledeb. = *Chiastophyllum oppositifolium* (Ledeb.) Berger - Умбиликус супротиволистный. Реликт. Эндем. Нередко, на влажных скалах. Массив Фишт, часто на скалах в лесном поясе. Тисо-самшитовая роща, на известняковых скалах. До верхн. (гигр-петр.) (10,11). Древн.л.-колх.Др.

Сем. *Cryptogrammaceae* Pichi Sermolli - Криптограммовые

587. *Cryptogramma crispa* (L.) R.Br. - Криптограмма курчавая. На скалах субальпийского пояса. Редко. Верхн. (петр.) (1-9).

Сем. Cupressaceae Rich. ex Bartl. - Кипарисовые.

588. *Juniperus depressa* Stev. = *J. hemisphaerica* C. Presl - Можжевельник прижатый. На скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (к.с.) (1-9).

589. *J. oblonga* Bieb. (*J. communis* L.) - Можжевельник длиннолистный. Нечасто, на открытых каменистых склонах лесного, субальпийского и альпийского поясов. Массив Фишт, в верхней полосе леса. До верхн. (к.с.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

590. *J. oxycedrus* L. (*J. rufescens* Link) - Можжевельник красный. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (10).

591. *J. pugnata* C. Koch. - Можжевельник карликовый. На скалах альпийского и субальпийского поясов. Очень редко. Каменное море (плато Лагонаки), верховье р. Мзымта. Верхн. (петр.) (8,11).

592. *J. sabina* L. - Можжевельник казацкий. Нередко, на скалистых местах лесного и субальпийского пояса. Массив Оштен, изредка на каменистых местах в субальпийском поясе. Средн. (к.с.) (1-9,11). Бор.-палеар.

Сем. Cuscutaceae Dumort. - Повиликовые

593. *Cuscuta europaea* L. - Повилика европейская. На полянах, в кустарниках, в лесном поясе. Массив Фишт, на верхнем пределе леса. Паразитирует на валериане и тысячелистнике. До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

Сем. Cyperaceae Juss. (Kobresiaceae Gilly) - Осоковые

594. *Blysmus comperessus* (L.) Panz. ex Link - Блисмус сжатый. Очень редко. Ключевое болото в истоках р. Мастык. До верхн. (гигр.) (5). Бор.-палеар.

595. *Carex auta* L. (*C. gracilis* Curt.) - Осока острая. На лугах в верховье р. М.Лаба. Верхн.(м.) (7).

596. *C. appropinquata* Schum. - Осока сближенная. На болотах в высокогорье. Верхн. (гигр.) (1-9).

597. *C. brevicollis* DC. - Осока парвская. На субальпийских лугах. Редко. Каменное море (плато Лагонаки), хр.Аишха. Верхн. (м.) (8,11).

598. *C. buschiorum* V.Krecz. = *C. humilis* Leys. - Осока Бушей. Эндем. На сухих субальпийских лугах и в сосняках на верхнем пределе леса. Массив Оштен, на щebinистых лугах в субальпийском поясе. Верхн. (к.с.) (1-9,11).

599. *C. buxbaumii* Wahlenb. - Осока Буксбаума. На болотистых лугах в верховье р. М.Лаба. Верхн. (гигр.) (7).

600. *C. caespitosa* L. = *C. cespitosa* L - Осока дернистая. На болотах субальпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9).

601. *S. capillaris* L. - Осока волосовидная. На заболоченных лугах субальпийского пояса. Очень редко. Истоки р.Мастык. Верхн. (гигр.) (6).

602. *S. capitellata* Boiss. et Bal. - Осока мелкоголовчатая. На альпийских и субальпийских лугах. Очень редко. Верховья рек Белая и Мзымта, хр. Аишха. Собрано А.И.Лесковым в истоках р.Белая. Верхн. (м.) (8,11).

603. *S. caryophyllea* Latourr. (*S. verna* Chaix) - Осока гвоздичная. На субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9).

604. *S. caucasica* Stev. - Осока кавказская. Очень редко, в сосняках, по скалистым местам. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (петр.) (1-9). Бор.-палеар.

605. *S. chordorrhiza* Ehrh. - Осока струнокорневая. В высокоотравье, на моховых болотах. Верхн. (гигр.) (1-9).

606. *S. cinerea* Poll. (*S. canescens* auct.) - Осока пепельно-серая. Изредка, в пихтовых лесах и по заболоченным участкам. На сырых лугах альпийского и субальпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

607. *S. contigua* Hoppe (*S. muricata* L.) - Осока смежная. Редко, в полосе широколиственных лесов, по опушкам и полянам. На субальпийских лугах. Редко. До верхн. (м.) (5,6). Бор.-евр.

608. *S. cuspidata* Host - Осока заостренная. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (10).

609. *S. dascia* Neuff. - Осока дакийская. На влажных и заболоченных лугах альпийского и субальпийского поясов. Ст. Джуга. Массив Оштен, на заболоченных местах. По ключевым болотам, сырым лужайкам, берегам ручьев. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

610. *S. digitata* L. - Осока пальчатая. Довольно часто, в светлых лесах, на луговых полянах, в кустарниках. Массив Фишт, в полосе верхнего предела леса. Средн., верхн. (м.) (1-11). Бор.-палеар.

611. *S. divulsa* Stokes (*S. polyphylla* Kar. et Kir.) - Осока превранная. Изредка, в светлых лесах. Тисо-самшитовая роща. До средн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

612. *S. echinata* Murr. - Осока ежисто-колючая. По берегам зарастающих озер и молодым болотам. Гг. Ачишхо, Б. Чура, Кудо 1500-2000м н.ур.м. Верхн. (гидр.) (8,9).

613. *S. elongata* L. - Осока удлиненная. На болотах субальпийского пояса. Верхн. (гидр.) (1-9).

614. *S. grioletii* Roem. - Осока Гриолети. Реликт. Тисо-самшитовая роща, преимущественно под пологом самшитовых лесов. Нижн. (м.) (10).

615. *C.hirta* L. - Осока волосистая. Редко, под пологом леса. На субальпийских лугах. Очень редко. Пастбище Абаго. До верхн. (м.) (3). Бор.-евр.

616. *C.huetiana* Boiss. - Осока Юта. На альпийских и субальпийских лугах, ст. Джуга. Массив Оштен, на альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

617. *C.inflata* Huds = *C.vesicaria* L. - Осока вздутая. На болотах субальпийского пояса. Верхн. (гидр.) (1-9).

618. *C.irrigua* (Wahlenb.) Smith ex Horpe = *C.raupercula* Michx. - Осока заливная. На сфагновых болотах. Очень редко. Г.Б.Бамбак. Верхн. (гидр.) (6).

619. *C.kotschyana* Boiss. et Hohen. - Осока Кочи. На влажных лугах субальпийского пояса. Впервые приводится Гроссгеймом для Западного Кавказа.(1940) Ранее указывался только для Дагестана и Восточного Закавказья. В заповеднике - г.Гузерибль, ур. Мурзакау и пастбище Лагонаки. Верхн. (гигр.) (2,11).

620. *C.lasiocarpa* Ehrh. - Осока волосистоплодная. На болотах субальпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9).

621. *C.latifrons* V.Krecz. - Осока широколистная. На субальпийских лугах. Очень редко. Район оз.Кардывач. Верхн. (м.) (8).

622. *C.leporina* L.= *C.lachenalii* Schkuhr - Осока заячья. Нередко, на влажных полянах, по берегам рек, в лесном поясе. На влажных субальпийских лугах. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

623. *C.limosa* L. - Осока топяная. На болотах субальпийского пояса. Очень редко, г. Алоус, истоки р.Рашкоа. Верхн. (гигр.) (6).

624. *C.medwedewii* Leskov - Осока Медведева. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, часто на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

625. *C.meinshauseniana* V.Krecz. - Осока Мейнсгаузена. Эндем. Реликт. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Фишт- Оштен, часто, эдификатор альпийских лугов. Верхн. (м.) (1-9,11).

626. *C.michelii* Host - Осока Микели. Изредка, на сухих склонах, в дубовых и сосновых лесах, г. Абадзеш, ю.-з. склон, пестроовсяницево-вейниковый луг. До верхн. (кс.-м.) (1-7). Бор.-палеар.

627. *C.micropodioides* V.Krecz. - Осока ложно-коротконожчатая. Эндем. На влажных, щелнистых альпийских лугах. Верхн. (гигр.) (1-9).

628. *S. mingrellica* Kuk. - Осока мингрельская. Эндем. На субальпийских высокотравных лугах. Редко, гг.Нагой-Чук, Б. Тхач, Аибга, Оштен, в альпийском поясе. Верхн. (м.) (3,11).

629. *S. muricata* L. - Осока остроконечная. Нередко, на ключевых болотах и заболоченных лугах лесного пояса. На высокотравных болотах в субальпийском поясе. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-евр.

630. *S. oreophila* С.А.Меу. - Осока горолюбивая. На заболоченных лугах субальпийского пояса. Верхн. (гигр.) (м.) (1-11).

631. *S. pallescens* L. - Осока бледноватая. Нередко, на лугах по долинам рек, горным склонам. На влажных субальпийских лугах. Массив Оштен, изредка на влажных субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1,2,11). Бор.-голар.

632. *S. rapicea* L. - Осока просяная. В субальпийском поясе на болотах. Верхн. (м.) (1-9).

633. *S. raupergcula* Michx. - Осока заливная. По берегам зарастающих озер и молодым болотам (гг.Аишха, Б.Чура, Кудо). Верхн. (гигр.) (8,9).

634. *S. pendula* Huds. - Осока висячая. Реликт. Редко, в широколиственных лесах. Массив Фишт, на верхнем пределе леса. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (м.) (2,10,11). Др.л.-средиз.др.

635. *S. pontica* Albov - Осока понтийская. На лугах в альпийском поясе. Верхн. (м.) (1-9).

636. *S. remota* L. - Осока раздвинутая. Нередко, в долинах рек, по берегам, на террасах. Средн. (гигр.-м.) (1,2,5,6). Бор.-палеар.

637. *S. rostrata* Stokes - Осока клювовидная. По берегам зарастающих озер и молодым болотам.(Гг.Ачишхо, Б.Чура, Кудо). Верхн. (гигр.) (8,9). Бор.-палеар.

638. *S. scabricuspis* V.Krecz. - Осока шершавошиповатая. Нечасто, на скалах, близ ручьев, по низинам. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

639. *S. sylvatica* Huds. - Осока лесная. Реликт. Часто, в широколиственных и темнохвойных лесах. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

640. *S. szovitsii* V.Krecz. - Осока Шовица. На болотистых местах и по берегам ручьев субальпийского пояса. Редко, верховье р.Цице, долина р. Холодная. До верхн. (гигр.) (4,11).

641. *S. tomentosa* L. - Осока шерстистая. Редко, на сенокосных полях лесного пояса. На субальпийских лугах. Очень редко. Пастбище Лагонаки. До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

642. *C.transsilvanica* Schur (*C.euxina* (Woronow et Marc.) V.Kercz.) - Осока трансильванская. Эндем. Очень редко, в лесу. Нижн. (м.) (8). Кавк.-кавк.

643. *C.tristis* Bieb. - Осока печальная. На альпийских лугах, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

644. *Eleocharis pauciflora* (Lightf.) Link = *E. quinqueflora* (F.X. Hartm.) - Болотница малоцветковая. На высокогорных болотах. Очень редко, истоки р. Рощкоа. Верхн. (гигр.) (м.) (7).

645. *Eriophorum polystachyon* L. (*E. angustifolium* Honck.) - Пушица многоколосковая. На болотах альпийского пояса. Нередко, на болотистых лугах, в хвойных лесах. Верхн. (гидр.) (м.) (1-9). Бор.-голар.

646. *E.vaginatatum* L. - Пушица влагалищная. Нередко, на болотах, в истоках и по берегам рек и ручьев, на заболоченных лугах лесного пояса. На влажных местах и болотах альпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.

647. *Kobresia bellardii* (All.) Degl. = *K. myosuroides* (Vill.) Fiori - Кобрезия Белларди. На альпийских лугах. Очень редко. Каменное море (плато Лагонаки) Верхн. (м.) (11).

648. *K. capilliformis* Ivanova (*K. capillifolia* auct.) - Кобрезия волосистая. На альпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, эдификатор альпийских лугов. Верхн. (м.) (1-9,11)

649. *K. humilis* (C.A.Mey. ex Trautv.) Serg. - Кобрезия низкая. Эндем. На альпийских лугах. Редко, хр.Магишо, г.Агиге, истоки р.Блыб. Массив Фишт - Оштен. Эдификатор альпийских лугов. Верхн. (м.) (6,11).

650. *K. persica* Kuk. et Bornm. - Кобрезия персидская. На субальпийских и альпийских лугах. В верховье р. Белая. Верхн. (м.) (11).

651. *K. schoenoides* (C.A.Mey.) Steud. - Кобрезия шенусовидная. На альпийских лугах, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

652. *Scirpus sylvaticus* L. - Камыш лесной. Изредка, на заболоченных местах. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.