

Сем. Datisceae Lindl. - Датисковые

653. *Datisca cannabina* L. - Датиска коноплевидная. Реликт. В прибрежных зарослях, по оврагам. Лекарственный вид. Тисо-самшитовая роща. Нередко, в широколиственных и самшитовых лесах, по влажным осыпям и галечникам. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Др.л.-средиз.др.

Сем. Dioscoreaceae R.Br. - Диоскорейные

654. *Dioscorea caucasica* Lipsky - Диоскорея кавказская.

Эндем. Реликт. В лесах по р. Ачипсе. Лекарственный вид. До средн. (м.) (8,9). Древн.л.-колх.др. О.

655. *Tamus communis* L. - Тамус обыкновенный. Реликт. Изредка в лесах. Тисо-самшитовая роща, в широколиственных лесах. Лекарственный вид. До средн. (м.) (1-10). Древн.-л.-м.аз.-средиз.др.

Сем. *Dipsacaceae* Juss. - Ворсянковые

656. *Cephalaria calcarea* Albov (*C.brevipalea* (Somm. et Levier) Litv.) - Головчатка известняковая. Эндем. Нередко на полянах и в светлых лесах, на известняках в субальпийских лугах, в т.ч. на массиве Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

657. *C.caucasica* Litv. - Головчатка кавказская. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

658. *C.gigantea* (Ledeb.) Vobr. - Головчатка гигантская. Эндем. Повсеместно, по полянам и опушкам. Среди субальпийского высокотравья, ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, обычно, среди высокотравья. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

659. *C.procera* Fisch.et Ave-Lall. - Головчатка высокая. Среди высокотравья. Редко, г. Б.Бамбак. Верхн. (м.) (2).

660. *Dipsacus laciniatus* L. - Ворсянка разрезная. Нередко, на сырых местах, у дорог. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

661. *D.pilosus* L. - Ворсянка волосистая. Нередко, в широколиственных лесах, по опушкам, на галечниках, по берегам рек. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

662. *Knautia heterotricha* C.Koch. - Короставник разноволосистый. На субальпийских и альпийских лугах, ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

663. *K.involucrata* Somm. et Levier - Короставник крупнообертковый. Эндем. На субальпийских и альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

664. *K.montana* (Vieb.) DC. - Короставник горный. Изредка, в лесах, по полянам, от среднегорного до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-п.аз.

665. *Scabiosa bipinnata* C.Koch. - Скабиоза дважды-перистая. Нередко в дубняках, по берегам рек, на галечниках и субальпийских лугах. Средн., верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

666. *S.caucasica* Vieb. - Скабиоза кавказская. Редко, в полосе верхнего предела леса, чаще на субальпийских лугах. Ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, характерна для щебнистых субальпийских лугов. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

667. *S.imeretica* (Somm.et Levier) Sulak. - Скабиоза имере-

тинская. Эндем. На известняках в альпийском поясе. Верхн. (м.) (11).

668. *S. ochroleuca* L. - Скабиоза бледножелтая. Часто, по лесным полянам, опушкам, на сухих склонах, на субальпийских лугах. До верхн. (кв.-м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

669. *S. olgae* Albov - Скабиоза Ольги. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко, г.Трю, Аибга, встречается преимущественно в лесном поясе. До верхн. (м.) (3,6). О.

670. *Succisa pratensis* Moench - Сивец луговой. Очень редко, собран на террасе р. М.Лаба у опушки березняка. До средн. (м.) (2). Бор.-палеар.

Сем. *Dryopteridaceae* Ching (*Aspidiaceae* Mett. ex Frank) -
Щитовниковые

671. *Dryopteris austriaca* (Jacq.) Woynar = *D. dilatata* (Hoffm.) A. Grau - Щитовник австрийский. Нередко, под пологом леса. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-голар.

672. *D. carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs (*D. spinulosa* (O.F.Muell.) O.Kuntze) - Щитовник картузианский. Изредка, в лесах. Средн. и верхн. (м.) (1-10). Бор.-голар.

673. *D. filix-mas* (L.) Schott - Щитовник мужской. Обычно, в тенистых лесах, по берегам рек. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-голар.

674. *D. oreades* Fomin - Щитовник подальпийский. Эндем. Часто, в долинах рек, на камнях, осыпях, на сланцевых россыпях в лесах. На лугах, осыпях и каменистых местах альпийского и субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

675. *D. oreopteris* (Ehrh.) Maxon = *Oreopteris limbosperma* (сем. *Thelypteridaceae*) - Щитовник горный. Реликт. Редко, преимущественно в лесах. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

676. *D. submontana* (Fraser-Jenkins et Jermy) Fraser-Jenkins (*D. rigida* auct.) - Щитовник твердый. На осыпях и скалах субальпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

677. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. (*Dryopteris linneana* C.Chr.) - Голоплодник щитовник. Реликт. Нередко в лесах преимущественно буково-пихтовых и еловых. До верхн.(м.) (1-9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

678. *G. robertianum* (Hoffm.) Newm. (*Dryopteris robertiana* (Hoffm.) C.Chr.) - Голоплодник Роберта. Изредка, на известняковых и сланцевых обнажениях в лесах. До верхн. (петр.) (1,6,9). Бор.-голар.

679. *Polystichum aculeatum* (L.) Roth (*P. lobatum* Huds.) - Многорядник мелкошиповатый. Реликт. Нередко, в широко-

лиственных и темнохвойных лесах, по долинам рек, ручьев. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

680. *P. angulare* (Kit. ex Willd.) C. Presl = *P. setiferum* (Fossk.) Moore ex Woynar - Многорядник угловатый. Тисо-самшитовая роща, в тенистых лесах. Нижн. (м.) (10).

681. *P. braunii* (Spenn.) Fee - Многорядник Брауна. Реликт. Нередко в лесах, по берегам рек. До средн. (м.) (1-10). Бор.-голар.

682. *P. lonchitis* (L.) Roth - Многорядник копьевидный. Реликт. Изредка, на скалах, в лесах. Верхн. (петр.) (1-9). Бор.-голар.