

Сем. Empetraceae S.F.Gray - Ерниковые.

683. *Empetrum caucasicum* Juz. - Шикша кавказская. На альпийских лугах, среди зарослей рододендрона. Редко образует фрагменты самостоятельных зарослей. Верхн. (м.) (1-9). Ксер.-п.аз.горн.

Сем. Equisetaceae Rich. ex DC. - Хвощевые

684. *Equisetum arvense* L. - Хвощ полевой. Нередко, преимущественно на заболоченных местах, по берегам рек и ручьев, на галечниковых отмелях. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (гигр.-м.) (1-10). Бор.-голар.

685. *E. hyemale* L. - Хвощ зимующий. Часто, по берегам рек и ручьев, на галечниках. Нижн. (гигр.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

686. *E. majus* Gars. = *E. telmateia* Ehrh. - Хвощ большой. Тисо-самшитовая роща. Пересохшее русло ручья (Васильева, 1935). Нижн. (гигр.-м.) (10).

687. *E. palustre* L. - Хвощ болотный. На болотах субальпийского пояса, редко. Массив Фишт - Оштен, собран А.И.Лесковым на перевале Белореченский. Верхн. (гидр.) (1-9,11).

688. *E. pratense* L. - Хвощ луговой. Редко. Собран в районе поляны Сенная на галечниковой отмели и у берега р.Киша. До средн. (гигр.-м.) (2). Бор.-голар.

689. *E. ramosissimum* Desf. - Хвощ ветвистый. Редко. Собран на галечнике р.Белая, ниже пос. Гузерипль. Нижн. (гигр.-м.) (5). Бор.-голар.

690. *E. trachyodon* A.Br. - Хвощ шершавозубый. Очень редко, собран на галечнике р.Уруштен. Нижн. (гигр.-м.) (5). Бор.-евр.

691. *E. variegatum* Schleich. ex Web. et Mohr - Хвощ пестрый. На болотах субальпийского пояса. Редко. Верховье р.Белая, г.Абадзеш, истоки р.Мастык. Верхн. (гигр.) (6,11).

Сем. Ericaceae Juss. (Vacciniaceae S.F.Gray.) - Вересковые

692. *Arctostaphylos caucasica* Lipsch. - Толокнянка кавказская. На щербнистых местах альпийского пояса. Очень редко. Указывается Н.М.Альбовым (1895) для г.Фишт. Верхн. (м.) (11). Бор.-голар.

693. *Rhododendron caucasicum* Pall. - Рододендрон кавказский. Реликт. Преимущественно по северным склонам, на южном макросклоне также по южным. Образует заросли на верхнем пределе леса и до 2600м н.ур.м., в березовом криволестье. Иногда как подлесок в верхнегорных пихтарниках. Поднимается в субальпийский и альпийский пояса. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-колх.др.

694. *R.luteum* Sweet - Рододендрон желтый. Реликт. Повсеместно, в подлеске дубовых, сосновых, каштановых, изредка пихтовых лесов в составе полосы верхнего предела леса. Тисо-самшитовая роща. Редко, в буковых лесах. Изредка, в субальпийском поясе образует самостоятельные заросли. Массив Фишт - Оштен. Обильно на верхнем пределе леса. До верхн. (м.) (1-11). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

695. *R.ponticum* L. - Рододендрон понтийский. Реликт. Образует подлесок в буковых и пихтовых лесах. У границы леса местами контактирует с рододендром кавказским, образуя гибридные формы. Изредка в субальпийском поясе. Массив Фишт - Оштен, обильно, на верхнем пределе леса. До верхн. (м.) (2,3,4,8,9,11). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

696. *Vaccinium arctostaphylos* L. - Черника кавказская. Реликт. Образует подлесок в смешанно-широколиственных, каштановых, буковых и пихтовых лесах и в полосе верхнего предела леса. Массив Фишт - Оштен, обычно на верхнем пределе леса. Изредка, в субальпийском поясе. До верхн. (м.) (2,3,4,6,7,8,9,11). Древн.л.-м.аз.др.

697. *V.myrtillus* L. - Черника обыкновенная. Повсеместно, в полосе верхнего предела леса, в субальпийском поясе тяготеет к зарослям рододендрона и можжевельника. В альпийском и субальпийском поясах, ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, на верхнем пределе леса и в субальпийском поясе. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.

698. *V.vitis-idaea* L. - Брусника обыкновенная. В криволестье во мху, около камней. Обычно. В субальпийском и альпийском поясах, ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, в альпийском поясе, по вершинам. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.

Сем. Euphorbiaceae Juss. - Молочайные.

699. *Euphorbia amygdaloides* L. - Молочай миндалевидный. Тисо-самшитовая роща, на открытых местах. Нижн. (м.) (10). Ксер.-атл.-средиз.

700. *E. glaberrima* C.Koch - Молочай оголенный. Эндем. Изредка, в составе лесного высокотравья. Редко, на субальпийских лугах, г.Оштен, пастбище Лагонаки. Средн., верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

701. *E. iberica* Boiss. - Молочай грузинский. Изредка, по лесным опушкам, на лугах, в кустарниках. На субальпийских лугах, хр. Ачишхо, пастбище Лагонаки, редко. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Кавк.-кавк.

702. *E. macroceras* Fisch. et C.A. Mey. - Молочай длиннорогий. Эндем. Реликт. Повсеместно в составе высокотравья лесного пояса и на субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, часто среди высокотравья. Тисо-самшитовая роща. От нижнего до верхн. (м.) (1-11). Кавк.-кавк.

703. *E. oblongifolia* (C.Koch) C.Koch - Молочай продолговатолистный. На субальпийских лугах. Массив Фишт, на лугах, изредка. Верхн. (м.) (1-9,11). Понто-гирканск.

704. *E. oschtenica* Galushko - Молочай оштенский. Эндем. На альпийских лугах. Очень редко. Верхн. (м.) (11).

705. *E. petrophila* C.A.Mey. - Молочай скалолюбивый. Эндем. На скалах и осыпях альпийского пояса. Очень редко, гг. Ачешбок, Оштен. Верхн. (петр.) (1,11). Не установлен.

706. *E. scripta* Somm. et Levier - Молочай испанский. Эндем. На высокотравных лугах. Очень редко, г.Б.Бамбак. Верхн. (м.) (2). Кавк.-колх.

707. *E. squamosa* Willd. - Молочай чешуйчатый. Реликт. Нередко, в лесах, на лугах, по берегам рек. До верхн. (м.) (1-10). Кавк.-кавк.

708. *E. stricta* L. - Молочай прямой. Изредка, в широколиственных лесах, на пойменных лугах, вырубках, галечниках, по берегам рек. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-евр.

709. *Leptopus colchicus* (Fisch. et C.A.Mey.ex Boiss) Pojark. (*Arachne colchica* (Fisch. et C.A. Mey.) Pojark.) - Лептопус колхидский. Эндем. Тисо-самшитовая роща, изредка. Нижн. (м.) (10). Кавк.-колх. О.