

Сем. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) - Бобовые
710. *Anthyllis boisseri* (Sagor.) Grossh. = *A. irenae* Juz.
и *A. lachnophora* Juz. - Язвенник Буасье. На субальпийских лу-
гах. Верхн. (м.) (1-9). Ксер.-п.аз.

711. *A. macrocephala* Wend. (*A. polyphylla* Kit. ex Loud.) - Язвенник крупноголовчатый. Эндем. Нередко, на каменистых склонах, полянах, щебнистых лужайках, галечниках. На каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. До верхн. (петр.) (1-9). Тип ареала не установлен.

712. *A. variegata* Boiss. ex Grossh. (*A. caucasica* (Grossh.) Juz.) - Язвенник пестрый. На альпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.-к.) (1-9). Ксер.-балкано-м.аз.-горн.

713. *Argyrolobium biebersteinii* P.W. Ball (*A. calycinum* (Bieb.) Jaub. et Spach) - Аргиролобиум Биберштейна. Реликт. Изредка, на сухих каменистых местах. До средн. (петр.) (1,2,3,5,6,8,9). Древн.л.-колх.-гирк.др.

714. *Astragalus alpinus* L. - Астрагал альпийский. На альпийских лугах. Ст. Джуга. Челепсинский хребет. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

715. *A. brachytrypis* (Stev.) C.A. Mey. - Астрагал коротколистный. Эндем. На лугах и каменистых местах альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-евкавк.

716. *A. cicer* L. - Астрагал тутовый. Редко, на полянах среди разнотравья. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

717. *A. fragrans* Willd. = *A. resupinatus* Bieb. - Астрагал пахучий. На скалах, каменистых местах и альпийских лугах. Массив Оштен, на каменистых местах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9,11). Ксер.-м.аз.

718. *A. freynii* Albov - Астрагал Фрейна. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-сев.-колх.горн.

719. *A. frickii* Bunge - Астрагал Фрика. Эндем. На скалистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт, на каменистых местах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-колх.-горн.

720. *A. galegiformis* L. - Астрагал галеговидный. Редко, известен с галечников р. М.Лаба. До средн. (гигр.-м.) (6). Кавк.-кавк.

721. *A. glycyphylloides* DC. - Астрагал ложно-солодколистный. Реликт. Известен в светлых лесах, на галечниках и остепненных лугах. До средн. (к.-м.) (5,6). Ксер.-средиз.

722. *A. glycyphyllos* L. - Астрагал солодколистный. Изредка, на влажных местах. До средн. (гигр.) (2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

723. *A. levieri* Freyn ex Somm. et Levier - Астрагал Левье. Эндем. На скалах, каменистых местах и лугах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

724. *Coronilla coronata* L. - Вязель увенчанный. Редко,

по каменистым местам лесного пояса. Очень редко, г.Сле-сарка. До средн. (петр.) (2,3,5,6). Бор.-евр.

725. *C.sarpadocica* Willd. = *Securigera balansae* L. - Вязель капподокийский. Массив Оштен, изредка на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (11).

726. *C.orientalis* Mill. = *Securigera orientalis* (Mill.) Lassen - Вязель восточный. Редко, на остепненных склонах на субальпийских лугах. До средн. (к.-м.). (1,5,6). Ксер.-п.аз.

727. *C.varia* L. = *Securigera varia* (L.) Lassen - Вязель пестрый. Часто, на лугах и полянах, по опушкам, на скалах, в светлых лесах. Изредка, на скалах субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

728. *Cytisus hirsutissimus* C.Koch = *Chamaecytisus hirsutissimus* (C.Koch.) Czer. - Ракитник густоволосистый. Эндем. На открытых каменистых склонах, изредка, в лесном поясе. На скалах альпийского и субальпийского поясов. До верхн. (к.) (1,2,3,5,6). Кавк.-колх.

729. *Dorycnium graecum* (L.) Ser. - Дорикниум греческий. Изредка, в широколиственных и буково-пихтовых лесах. До средн. (м.) (1,8,9,10) Кавк.-кавк.

730. *Galega officinalis* L. - Козлятник лекарственный. Тисо-самшитовая роща, в светлых лесах. Нижн. (м.) (10). Бор.-евр.

731. *G.orientalis* Lam. - Козлятник восточный. Повсеместно на полянах, по опушкам. Входит в состав субальпийского высокотравья ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

732. *Genista angustifolia* Schischk. - Дрок узколистный. На известняках. Известен из бассейна р. М.Лаба (Косенко, 1970). В заповеднике нахождение вероятно, но не известно. Средн. (петр.) Кавк.-кавк.

733. *G.compacta* Schischk. - Дрок плотный. Эндем. На скалах и каменистых склонах. Собран П.К.Васильевой на г.Оштен. Известен также с верховьев р.М.Лаба (Косенко, 1970). На каменистых склонах субальпийского пояса. Очень редко, г.Житная, пастбище Лагонаки. До верхн. (петр.) (1,3,7,11). Кавк.-кавк.

734. *G.suanica* Schischk. (*G.adzharica* M.Pop., *G.glaberrima* Новорокр.) - Дрок сванский. Эндем. На скалах. Известен с верховьев р. Мзымта (Косенко, 1970). Верхн. (петр.) (8). Кавк.-колх. О.

735. *Hedysarum caucasicum* Vieb. - Копеечник кавказский. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, часто на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

736. *Lathyrus aphaca* L. - Чина безлисточковая. Очень редко, на сорных местах. До средн. (м.) (3). Бор.-палеар.
737. *L. aureus* (Stev.) Brandza (*Orob. aureus* Stev.) - Чина золотистая. Повсеместно, под пологом лесов, на полянах и опушках. Массив Фишт - Оштен, на лугах, редко. До верхн. (м.) (1-9,11). Ксер.-п.аз.
738. *L. cyaneus* (Stev.) S.Koch (*Orob. cyaneus* (Stev.) S.Koch) - Чина синяя. Эндем. На сухих субальпийских лугах. Гг.Челепсы, Бамбак, массив Фишт - Оштен, ст. Джуга. Верхн. (к.-м.) (6,11). Кавк.-м.аз.
739. *L. hirsutus* L. - Чина волосистая. Тисо-самшитовая роща, по опушкам, в широколиственных лесах. Нижн. (м.) (10). Ксер.-средиз.
740. *L. laxiflorus* (Desf.) O.Kuntze - Чина редкоцветковая. Реликт. Изредка, на полянах в светлых лесах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Ксер.-п.аз.
741. *L. miniatus* Bieb. ex Stev. - Чина киноварная. Эндем. Изредка, на полянах, в высокотравье и кустарниках. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Кавк.-кавк.
742. *L. pratensis* L. - Чина луговая. Повсеместно, на луговых полянах, в светлых лесах и высокотравье. На субальпийских и альпийских лугах. Массив Оштен, изредка на субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.
743. *L. roseus* Stev. - Чина розовая. Нередко, на лесных полянах, в светлых лесах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Кавк.-колх.
744. *L. sylvestris* L. - Чина лесная. Редко, в лесах и кустарниках. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.
745. *L. vernus* (L.) Bernh. - Чина весенняя. Изредка, в лесах. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.
746. *Lotus caucasicus* Kuprian. ex Juz. - Лядвенец кавказский. Эндем. Редко, на полянах, галечниках лесного пояса. На скалах, осыпях и лугах альпийского и субальпийского пояса. Ст. Джуга. Массив Фишт - Оштен, часто на каменистых субальпийских и альпийских лугах. До верхн. (к.-м.) (1,2,3,5,6,8,9,10,11). Кавк.-кавк.
747. *Medicago falcata* L. - Люцерна серповидная. Нередко, на сухих каменистых и остепненных склонах лесного пояса. До средн. (к.) (1,2,3,5,6). Бор.-евр.
748. *M. glutinosa* Bieb. (*M. sativa* L.) - Люцерна железистая. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Хр.Бамбак, Сергиев Гай, долина р.Умпырь. На верхней границе леса. Верхн. (м.) (6). Кавк.-кавк.

749. *M. lupulina* L. - Люцерна хмелевидная. Очень редко, в кустарниках, на лугах и галечниках. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

750. *M. minima* (L.) Bartalini - Люцерна малая. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (6,10). Ксер.-средиз.-п.аз.

751. *Melilotus hirsutus* Lipsky - Донник волосистый. Эндем. Редко, отмечен на галечниках р. Белая в пос. Гузерипль. Нижн. (петр.) (2). Ксер.-средиз.

752. *M. officinalis* (L.) Pall. - Донник лекарственный. На субальпийских лугах, очень редко, г. Гузерипль. Бор.-зап.палеар.

753. *Onobrychis biebersteinii* Sirj. - Эспарцет Биберштейна. Эндем. На щербнистых альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (кс.-м.) (1-9). Колх.-кавк.

754. *O. cyri* Grossh. - Эспарцет куринский. Эндем. На сухих склонах, очень редко. До средн. (кс.) (1-9). Кавк.-кавк.

755. *O. oxytropoides* Bunge - Эспарцет остролодочниковый. Эндем. На щербнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

756. *Ononis arvensis* L. - Стальник полянный. Редко, на полянах, сорных местах, во влажных местообитаниях. До средн. (гигр.-м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

757. *Oxytropis cyanea* Vieb. - Остролодочник синий. На щербнистых местах, осыпях и лугах альпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, изредка на щербнистых лужайках и осыпях в альпийском поясе. Верхн. (кс.-м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

758. *O. kubanensis* Leskov - Остролодочник кубанский. Эндем. На лугах и каменистых местах альпийского и субальпийского пояса, ст. Джуга. Верхн. (кс.-м.) (1-9). Кавк.-зап.кавк.

759. *O. lazica* Boiss. - Остролодочник лазистанский. На щербнистых и каменистых местах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Ксер.-м.аз.-горн.

760. *O. owerinii* Bunge - Остролодочник Оверина. Эндем. На кобрезиевых лугах. Массив Фишт - Оштен (Альпер, 1960) Верхн. (м.) (11). Кавк.-кавк.

761. *Psoralea acaulis* Stev. - Псоралея бесстебельная. Редко, в широколиственных лесах, изредка, в субальпийском поясе. До средн. (м.) (8,9). Кавк.-колх.

762. *P. bituminosa* L. - Псоралея смолистая. Тисо-самшитовая роща, на полянах. Нижн. (м.) (10). Ксер.-средиз.

763. *Trifolium alpestre* L. - Клевер альпийский. Нередко, на полянах и в светлых лесах. Изредка, на субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

764. *T.ambiguum* Bieb. = *Amoria ambigua* (Bieb.) Sojak. - Клевер сходный. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

765. *T.arvense* L. - Клевер пашенный. Нередко, на лужайках, галечниках и в светлых лесах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

766. *T.aureum* Poll. = *Chrysaspis aurea* (Poll.) Greene - Клевер золотистый. Изредка, в смешанных лесах, на сорных местах, галечниках, в кустарниках. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

767. *T.campestris* Schreb. = *Chrysaspis campestris* (Schreb.) Desv. - Клевер полевой. Довольно часто на лугах, открытых сорных местах, галечниках, по берегам рек, в светлых лесах и на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

768. *T.canescens* Willd. - Клевер седоватый. Изредка, на каменистых участках, полянах, галечниках, на альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга, массив Фишт - Оштен, обычно на субальпийских лугах. До верхн. (к.-м.) (1-9,11). Ксер.-п.аз.

769. *T.caucasicum* Tausch. - Клевер кавказский. Известен из района пос.Гузерибль. Нижн. (м.) (2). Кавк.-п.аз.

770. *T.hybridum* L. = *Amoria hybrida* (L.) C.Presl - Клевер гибридный. Изредка, на субальпийских лугах. Массив Оштен, на лугах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Бор.-евр.

771. *T.medium* L. - Клевер средний. Редко, в широколиственных лесах и в кустарниках. До субальпийского пояса. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

772. *T.montanum* L. = *Amoria montana* (L.) Sojak. - Клевер горный. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

773. *T.polyphyllum* C.A.Mey. = *Lupinaster polyphyllus* (C.A.Mey.) Latsch. - Клевер многолистный. Эндем. На лугах, щебнистых местах и скалах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, часто, на скалах и каменистых местах в альпийском поясе. Верхн. (к.-м.) (1-9,11). Кавк.-колх.горн.

774. *T.pratense* L. - Клевер луговой. Нередко, в лесах, на полянах и в кустарниках, на субальпийских лугах. Тисо-самшитовая роща, по опушкам. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

775. *T.repens* L. = *Amoria repens* (L.) C.Presl - Клевер ползучий. Часто, на щебнистых местах и пойменных лугах. На субальпийских лугах. Массив Оштен, сорное на лугах. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-палеар.

776. *T.rytidosemium* Boiss. et Hohen. = *Chrysaspis rytidosemia*

(Boiss. et Hohen.) Greene - Клевер морщинистый. На лугах, влажных заболоченных местах альпийского и субальпийского поясов. Ст. Джуга. Верхн. (гигр.-м.) (1-9). Кавк.-колх.горн.

777. *T.spadiceum* L. = *Chrysaspis spadicea* (L.) Greene - Клевер темнокаштановый. На лугах и болотах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (гигр.-м.) (1-9). Бор.-зап.палеар.

778. *T.trichosephalum* Vieb. - Клевер волосистоголовый. На альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. Массив Оштен, изредка на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

779. *Vicia abbreviata* Fisch. ex Spreng. - Горошек укороченный. Эндем. Нередко, в лесах, по каменистым склонам, опушкам, на луговых полянах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.

780. *V.alpestris* Stev. - Горошек горный. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). М.аз-кавк.

781. *V.balansae* Boiss. - Горошек Балансы. Нередко, по полянам и в высокотравье. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.

782. *V.cassubica* L. - Горошек кашубский. Очень редко, под пологом леса (район кордона Умпырь). До средн. (м.) (6). Бор.-евр.

783. *V.caucasica* Ekv. (V.semiglabra Rupr. ex Boiss.) - Горошек кавказский. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

784. *V.crasca* L. - Горошек мышинный. На субальпийских лугах. Ст. Джуга. Массив Оштен, изредка, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

785. *V.crocea* (Desf.) Fritsch - Горошек оранжевый. Реликт. Редко, в тенистых лесах. От нижн. до верхн. пояса. (м.) (1-9). Древн. л.-колх.др.

786. *V.grossheimii* Ekv. - Горошек Гроссгейма. Эндем. На лугах, от верхнего до альпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

787. *V.hirsuta* (L.) S.F.Gray - Горошек волосистый. Изредка по берегам рек и полянам как сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

788. *V.serpium* L. - Горошек заборный. Нередко, по полянам и в кустарниках. Изредка, на субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

789. *V.tenuifolia* Roth - Горошек узколистный. Редко, по полянам и опушкам. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

790. *V.tetrasperma* (L.) Schreb. - Горошек четырехсемянный. Редко, на галечниках, по берегам рек, чаще как сорное. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

791. *V.truncatula* Fisch. ex Vieb. - Горошек обрубленный. Редко, в лесах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

792. *V.variegata* Willd.= *V. nissoliana* L. - Горошек пестрый. Редко, на галечниках, по берегам рек. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Ксер.-п.аз.

Сем. *Fagaceae* Dumort. - Буковые.

793. *Castanea sativa* Mill. - Каштан посевной. Реликт. Спорадически, единично и группами в широколиственных лесах и чистыми древостоями, преимущественно в бассейнах рек Сочи, Шахе, Чвежиепсе, Ачипсе, Лаура, хр. Иегош, Ачишхо, Псехоко, Ассара. По р.Шахе в смеси с самшитом на известняках, единично доходят до 1500-1700м н.ур.м. Известен экземпляр кустовидной формы в верховье р.Чессу (2000м н.ур.м.) в буково-березовом криволесье. По правому берегу р.Белая от устья р.Чессу до устья р.Киша отмеченно 16 участков с участием каштана в районе устьев р.Светлый и Мутный.Тяпляки. Тисо-самшитовая роща, редко. До верхн. (м.) (3,8,9,10). Древн.л.-м.аз.

794. *Fagus orientalis* Lipsky - Бук восточный. Реликт. Основная лесообразующая порода по северному макросклону. Господствует в чистых древостоях в пределах 600-1200м н.ур.м. Выше в смеси с пихтой кавказской, при этом в районах Главного Кавказского хребта, выше 1800м н.ур.м. в виде букового криволесья. По южному макросклону: до 1300м н.ур.м. (р.Лаура) - 1800м н.ур.м. (р.Шахе, Сочи, Чвежипсе) - чистые буковые леса. Выше в смеси с пихтой. У границы леса - буковое криволесье. До верхн. (м.) (1-11). Древн.л.-м.аз.-средиз. др.

795. *Quercus calcarea* Troitz.= *Q. dalechampii* Ten. - Дуб известняковый. Тисо-самшитовая роща, на скалах. Нижн. (к.) (10).

796. *Q.hartwissiana* Stev. - Дуб Гартвиса. Реликт. Нередко, в составе дубовых древостоев, и с другими широколиственными породами. До средн. (м.) (1,2,5,8,9,10). Древн.л.-колх.-др.

797. *Q.iberica* Stev. (*Q.hypochrysa* Stev., *Q.macrocarpa* Grossh.) - Дуб грузинский. Реликт. Эндем. В чистых и смешанных с другими видами древостоях. До средн. (м.) (1,2,5,9,10). Кавк.-кавк.

798. *Q. imeretina* Stev. ex Woronow - Дуб имеретинский. Эндем. Обычен в долинах рек, нижних частях склонов, чистыми древостоями и в смеси с другими видами. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр. О.

799. *Q. macranthera* Fisch. et С.А. Mey. ex Hohen.- Дуб восточный. Реликт. Небольшие группы и одиночные деревья встречаются в субальпийском поясе верховий р. Мзымта. (Туниев, 1999). Верхн. (кв.) (8).

800. *Q. petraea* L. ex Liebl. - Дуб скальный. Реликт. Образует чистые древостои и входит в состав смешанных лесов по сухим склонам, часто на известняках. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6), средн.(8,9), Бор.-палеар.

801. *Q. robur* L. - Дуб черешчатый. Обычен в долинах рек, нижних частях склонов, чистыми древостоями и в смеси с другими видами. До средн.(м.)(1,2,3,5,6,8,9) Бор.-евр.

Сем. Fumariaceae DC - Дымянковые

802. *Corydalis alpestris* С.А.Мей. - Хохлатка альпийская. На осыпях и каменистых местах альпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, характерные растения движущихся осыпей. Отличаются белыми цветками с голубым отгибом. Ст. Джуга. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

803. *C. caucasica* DC. - Хохлатка кавказская. Реликт. Нередко, в лесах, кустарниках, на лугах, полянах, по щебнистым осыпям, у снежных пятен. Редко, на каменистых местах субальпийского пояса. Тисо-самшитовая роща, в самшитнике на террасе и изредка в широколиственных лесах. До верхн. (м.) (1-10). Древн.л.-колх.др.

804. *C. conorrhiza* Ledeb. - Хохлатка коническикорневая. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

805. *C. emanuelii* С.А.Мей. - Хохлатка Эмануэля. Эндем. На альпийских лугах. Редко, г.Б.Бамбак, хр.Маркопидж. Верхн. (м.) (6). Кавк.-кавк.

806. *C. kusnetzovii* А. Khokhr. - Хохлатка Кузнецова. Эндем. На альпийских лугах. Редко. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

807. *C. marschalliana* (Pall. ex Willd.) (*C. bulbosa* (L.) DC.) - Хохлатка Маршалла. Редко, в лесах, кустарниках. Изредка на субальпийских лугах. Редко, г.Оштен. До средн. (м.) (1,2,3,11). Кавк.-кавк.

808. *C. vittae* Kolak. - Хохлатка Витты. Эндем. На субальпийских лугах. Ст. Джуга, склон Бурьянистого хребта к р. Аспидная, на границе леса (Семагина, 1986). Верхн. (м.) (6). Кавк. - сев.-колх.горн.

809. *Fumaria schleicheri* Soy.-Willem - Дымянка Шлейхера. Очень редко, собран на г. Аpsyсры, в сосняке. До средн. (м.) (2,3). Бор.-палеар