

Сем. *Gentianaceae* Juss. - Горечавковые

810. *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. - Блекстония пронзеннолистная. Тисо-самшитовая роща, очень редко, в ущелье р.Хоста, на скалах. Нижн. (петр.) (10). Средиз.-европ.-атл.

811. *Centaureum erythraea* Rafn (*C.umbellatum* Gilib.) - Золототысячник красный. Редко, на лугах. До средн. (кс.-м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

812. *Gentiana aquatica* L. - Горечавка водяная. Изредка, на альпийских и субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, на альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Ксер. - центр.-азиат.-горн.

813. *G.biebersteinii* Bunge = *Gentianella biebersteinii* (Bunge) Holub - Горечавка Биберштейна. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Ст.Джуга, около метеостанции. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.-горн.

814. *G.blepharophora* Bordz. = *Gentianopsis blepharophora* (Bordz.) Galushko - Горечавка ресниченосная. На щебнистых местах альпийского и субальпийского пояса. Очень редко, г. Ятыргварта, массив Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (6,11). Кавк.-м.аз.

815. *G.caucasica* Vieb. = *Gentianella caucasea*. (Lodd. ex Sims) Holub. - Горечавка кавказская. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Редко. Массив Фишт - Оштен, на альпийских лугах. Верхн. (м.). (1-9,11) Кавк.-кавк.

816. *G.cruciata* L. - Горечавка крестообразная. Изредка, на полянах среди леса. До верхн. (м.) (5,6,7). Бор.-палеар.

817. *G.dechyana* Somm. et Levier = *Comastoma dechy anum* (Somm. et Levier) Holub - Горечавка Деши. Эндем. На щебнистых местах субнивального пояса. Очень редко, г.Магишо. Собрана Л.Н.Васильевой на г.Оштен, под соснами. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

818. *G.dshimilensis* S.Koch - Горечавка джимильская. На альпийских лугах, часто. Верхн. (м.) (1-9)

819. *G.kolakovskyi* Doluch. - Горечавка Колаковского. Эндем. На щебнистых склонах. От верхнего лесного до альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

820. *G.nivalis* L. (*Calathiana nivalis* (L.) Delarb.) - Горечавка снежная. На влажных и заболоченных местах альпийского пояса. Очень редко, г.Б.Бамбак. Верхн. (м.) (6). Бор.-аркт.-голар.

821. *G. oschtenica* (Kusn.) Woronow - Горечавка оштенская. Эндем. Повсюду, на субальпийских и альпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

822. *G. paradoxa* Albov - Горечавка особенная. Эндем. Реликт. Преимущественно на известняках, берег р.М.Лаба, кордон Черноречье, близ пос.Верикот на границе заповедника (Сиротюк, 1996). Средн. (петр.) (5). Кавк.-колх.

823. *G. schistocalyx* (C.Koch) C.Koch (*G. asclepiadea* L.) - Горечавка раздельночашечная. Эндем. Повсеместно, под пологом леса и на опушках, по осыпям и высокотравным полянам, до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

824. *G. septemfida* Pall. - Горечавка семираздельная. Часто, на альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

825. *Gentianella umbellata* (Bieb.) Holub (*Gentiana umbellata* Bieb.) - Горечавка зонтичная. Эндем. На лугах субальпийского и альпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9).

826. *Swertia iberica* Fisch. ex C.A. Mey. - Сверция грузинская. Эндем. На влажных местах субальпийского пояса. Верхн. (гигр.-м.) (1-9,11). Кавк.-колх.

#### Сем. Geraniaceae Juss. - Гераниевые

827. *Geranium collinum* Steph. - Герань холмовая. Изредка, по берегам рек, на опушках. На субальпийских лугах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Ксер.-ц.аз.

828. *G. columbinum* L. - Герань голубиная. На сорных местах и в кустарниках. Изредка. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

829. *G. depilatum* (Somm. et Levier) Grossh. - Герань безволосая. На лужайках, опушках в светлых лесах. От среднего до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-п.аз.

830. *G. gracile* Ledeb. - Герань стройная. Реликт. Часто, в тенистых лесах. Преимущественно в бассейне р.М.Лаба. До верхн. (м.) (5,6,7). Древн.л.-колх.др.

831. *G. gymnocaulon* DC. - Герань голостебельная. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-зап.кавк.

832. *G. lucidum* L. - Герань блестящая. На влажных местах, по галечникам, берегам рек. Очень редко. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

833. *G. palustre* L. - Герань болотная. На болотистых местах близ ручьев. Изредка, от нижнего до субальпийского пояса. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-евр.

834. *G.pratense* L. - Герань луговая. На субальпийских лугах. Изредка. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

835. *G.psilostemon* Ledeb. - Герань мелкотычинковая. На лугах, в субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9).

836. *G.renardii* Trautv. - Герань Ренарда. Эндем. На лугах в альпийском поясе. Верховье р. М.Лаба. Верхн. (м.) (7).

837. *G.robertianum* L. - Герань Роберта. Реликт. Часто, в тенистых лесах, повсеместно. Массив Фишт, часто, на затененных склонах в лесном поясе, по опушкам. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-палеар.

838. *G.rotundifolium* L. - Герань округлолистная. На сорных местах. Нередко. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

839. *G.ruprechtii* (Woronow) Grossh. - Герань Рупрехта. Эндем. На субальпийских лугах. Редко. Ст. Джуга, под Туровой крепостью. Верхн. (м.) (1-9).

840. *G.sanguineum* L. - Герань кровавокрасная. В светлых лесах, по опушкам и полянам, часто. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8). Бор.-евр.

841. *G.sibiricum* L. - Герань сибирская. Редко, на полянах. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-ц.аз.

842. *G.sylvaticum* L. (*G.pseudosibiricum* J.Mayer) - Герань лесная. Часто, на лугах, по опушкам, в светлых лесах. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

#### Сем. Globulariaceae DC. - Глобуляриевые

843. *Globularia trichosantha* Fisch. et Mey. - Шаровница волосоцветковая. Реликт. Южный склон г.Оштен (Зиненко, Введенский, 1931). Г.Оштен, ю.-в. склон, на скалах (Альпер, 1945). Армянский перевал, на щебнистой осыпи (Семагина, 1983) г. Фишт, близ Белореченского перевала, на щебнистой почве. (Акатова, 1993). Верхн. (к.-мез.) (11). О.

#### Сем. Grossulariaceae DC. - Крыжовниковые

844. *Grossularia reclinata* (L.) Mill. - Крыжовник отклоненный. Нередко, преимущественно по зарастающим каменистым осыпям. До верхн. (петр.) (1-9) Бор.-евр.

845. *Ribes alpinum* L. - Смородина альпийская. Нередко, на скалистых участках, под пологом широколиственных лесов, а также на зарастающих каменистых осыпях и скалах. До верхн. (петр.) (1-9). Бор.-евр.

846. *R.biebesteinii* Berl. ex DC. - Смородина Биберштейна. Эндем. Повсеместно под пологом леса, на зарастающих осы-

лях единично и группами. Массив Фишт, на верхнем пределе леса. До верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

847. *R. nigrum* L. - Смородина черная. Очень редко. Известно одно местонахождение в верховье р.Челепсинка (бассейн р.Уруштен, близ русла).