

Сем. Hydrangeaceae Dumort. - Гидранговые

848. *Philadelphus caucasicus* Koehne - Чубушник кавказский. Реликт. Преимущественно на каменистых местах, по берегам ручьев, на обрывах, иногда сплошными зарослями. До верхн. (м.) (1-9). Др.л.-м.аз.-сред.др.

Сем. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые.

849. *Vallisneria spiralis* L. - Валлиснерия скрученная. Единичные местонахождения, бассейн р.Б.Лаба, истоки р.Закан, Луганский перевал. Высота 2400м н.ур.м., зарастающее озеро. До верхн. (м.) (7).

Сем. Hypericaceae Juss. (Guttiferae auct.) - Зверобойные

850. *Hypericum androsaemum* L. - Зверобой красильный. Тисо-самшитовая роща, по опушкам. Нижн. (м.) (10). Древн. л. - средиз.др.

851. *H. bithynicum* Boiss. (*H. caucasicum* (Woronow) Gorschsk., *H. montbretii* auct) - Зверобой кавказский. На лугах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт, на субальпийских лугах Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.-колх.

852. *H. hirsutum* L. - Зверобой жестковолосистый. Редко, в лесах и на лесных полянах. На лугах и скалах субальпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, на субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9, 11). Бор.-евр.

853. *H. montanum* L. - Зверобой горный. В лесах и на лугах в верхнем лесном и субальпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9).

854. *H. nummularioides* Trautv. - Зверобой округлолистный. Эндем. Реликт. На каменистых и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. На известняковых скалах и галечниках лесного пояса. Массив Фишт, изредка, на щебнистых местах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

855. *H. orientale* L. (*H. buschianum* Woronow, *H. ptarmicifolium* Spach) - Зверобой восточный. Редко, на скалистых местах. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

856. *H. perforatum* L. - Зверобой продырявленный. Неред-

ко, на пойменных лугах, полянах, галечниках, по берегам рек лесного пояса. На субальпийских лугах. Тисо-самшитовая роща, редко по берегам р.Хоста. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

857. *H. polygonifolium* Rupr. = *H. linarioides* Bosse - Зверобой горцелистный. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). П.аз.-кавказ.-горн.

Сем. Hypolepidaceae Pichi Sermolli - Гиполепидиевые

858. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn - Орляк обыкновенный. Нередко, по берегам рек, на обочинах дорог и троп, на лесосеках, на сухих местообитаниях. До верхн. (к.-м.) (1-9). Бор.-голар.

859. *P. tauricum* V.Krecz. - Орляк крымский. Тисо-самшитовая роща. Редко, в тенистых лесах. Нижн. (м.) (10).