

Сем. Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.) - Губоцветные

886. *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy - Душечка полевая. Редко, на сухих склонах. Нижн. (кс.-м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

887. *Ajuga genevensis* L. - Живучка женевская. Часто, на полянах, берегах рек лесного пояса. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

888. *A. orientalis* L. - Живучка восточная. На лугах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Ст. Джуга. Тисо-самшитовая роща, по опушкам. До верхн. (кс.) (1-10). Ксер.-средиз.

889. *A. reptans* L. - Живучка ползучая. По лесным опушкам, вдоль троп, среди кустарников в широколиственных лесах, преимущественно на влажных местах. Нижн. (м.) (10). Бор.-палеар.

890. *Ballota nigra* L. (*B. foetida* (Lam.) - Белокудренник черный. Очень редко, на сорных местах, галечниках, близ жилья. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

891. *Betonica macrantha* C.Koch = *Stachys macrantha* (C.Koch) Jalas, (*B. graudiflora* Willd.) - Буквица крупноцветковая. Часто, в составе разнотравья на лесных полянах, на субальпийских лугах. Ст. Джуга. От средн. до верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

892. *B. nivea* Stev. = *Stachys discolor* Benth. - Буквица белоснежная. Эндем. На скалах в альпийском поясе. Редко. Гг. Фишт, Оштен, Ачешбок, Тхач, Слесарня, Бамбак, Агиге, Нагой-Чук, Трю, Ст. Джуга, на скалах Туровой крепости (Семагина, 1986). Верхн. (м.) (1,6,11). Кавк.-кавк.

893. *B. officinalis* L. = *Stachys officinalis* (L.) Trevis. - Буквица лекарственная. Нередко, на полянах, пойменных лугах, под

пологом леса, среди кустарников. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

894. *Calamintha grandiflora* (L.) Moench - Душевик крупноцветковый. Реликт. Часто, в пихтовых, дубовых, пихтово-буковых лесах, на пойменных лугах, у ручьев на галечниках, по берегам рек. До верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

895. *C. sylvatica* Bromf. (*C. menthifolia* Host) - Душевик лесной. Редко, в кустарниках, на галечниках. Нижн. (Кс.-м.) (1,2,3,5,6,8,9). Ксер.-средиз.

896. *Clinopodium umbrosum* (Vieb.) C. Koch - Пахучка теневая. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (10). Ксер.-гирк.

897. *C. vulgare* L. - Пахучка обыкновенная. Нередко, в светлых лесах, по опушкам и полянам, на скалах, щебнистых лугах. До средн. (Кс.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

898. *Dracoscephalum austriacum* L. - Змееголовник австрийский. На субальпийских лугах. Очень редко, г.Закан. Верхн. (м.) (7). Бор.-евр.

899. *D. ruyschiana* L. - Змееголовник Руйша. На лугах и каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (кс.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

900. *Galeobdolon luteum* Huds. - Зеленчук желтый. Нередко, под пологом дубняков и смешанно-широколиственных лесов. Тисо-самшитовая роща, нередко, преимущественно в широколиственных лесах, на сорных местах. До средн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

901. *Galeopsis tetrahit* L. (*G. bifida* Voenn., part.) - Пикульник обыкновенный. Изредка в широколиственных лесах, на опушках, полянах, вырубках. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

902. *Glechoma hederaceae* L. - Будра плющевидная. Изредка, в полосе широколиственных лесов, на полянах, по берегам рек. Тисо-самшитовая роща. Изредка, в широколиственных, реже в самшитовых лесах. Часто как сорное. До средн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

903. *Lamium album* L. - Яснотка белая, глухая крапива. Нередко, по опушкам, на луговинах, по берегам рек. На субальпийских лугах, среди высокотравья. Ст. Джуга. От средн. до верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

904. *L. maculatum* (L.) L. - Яснотка пятнистая. Редко, на заросенных местах, по крупно каменистым осыпям, берегам рек, вырубкам. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

905. *L. tomentosum* Willd. - Яснотка войлочная. На осыпях альпийского пояса. Изредка, на массиве Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.-горн.

906. *Leonurus glaucescens* Bunge. (*L. cardiaca* L.) - Пустырник обыкновенный. Редко, на сорных местах. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

907. *Lycopus eugoraëus* L. - Зюзник европейский. Редко, на сорных увлажненных местах. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

908. *Melissa officinalis* L. (*M. bicornis* Klok.) - Мелисса лекарственная. Тисо-самшитовая роща, по опушкам. До нижн. (м.) (10). Ксер.-средиз.

909. *Mentha longifolia* (L.) Huds. (*M. spicata* L.) - Мята длиннолистная. Нередко, в светлых лесах, на вырубках, пойменных лугах. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

910. *Nepeta betonicifolia* С.А.Меу. - Котовник буквицевидный. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Хр.-Магишо. Верхн. (м.) (6). Ксер.-сев.иранск.

911. *N. pannonica* L. (*N. nuda* L.) - Котовник венгерский. Редко, на сорных местах, в светлых лесах. Нижн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

912. *N. somkhetica* Kapell. - Котовник сомхетский. Эндем. По опушкам, на лугах. В верховье р. М.Лаба. До альпийского пояса. Верхн. (м.) (7).

913. *N. supina* Stev. - Котовник лежачий. Эндем. На щебнистых местах альпийского пояса. Очень редко, г. Джуга. На западном Кавказе приводится впервые М.Д.Алтуховым (1984). (петр.) (1-7). Кавк.-кавк.

914. *Origanum vulgare* L. - Душица обыкновенная. Часто, в светлых лесах, на лужайках, по опушкам, галечникам и берегам рек. На каменистых склонах субальпийского пояса, в т.ч. на г.Оштен. До средн. (м.) (1-11). Бор.-палеар.

915. *Prunella vulgaris* L. - Черноголовка обыкновенная. Часто, в широколиственных и темнохвойных лесах. На полянах, остепненных склонах, сорных местах. На субальпийских лугах, г.Фишт. До верхн. (кс.-м.) (1-11). Бор.-голар.

916. *Salvia glutinosa* L. - Шалфей железистый. Реликт. Часто и повсеместно в широколиственных и смешанных лесах, на лесных полянах, в кустарниках, в тенистых сырых местах, на галечниках по берегам рек. До средн. (гигр.-м.) (1-10). Бор.-евр.

917. *S. verticillata* L. - Шалфей мутовчатый. Нередко, по сухим склонам, осыпям, на обнажениях горных пород в лесном поясе. На сухих и каменистых местах субальпийского пояса. Массив Оштен, изредка на каменистых местах. До верхн. (петр.) (1-9,11). Степн.-евпонт.

918. *Scutellaria altissima* L. - Шлемник высочайший. Реликт. Изредка, в широколиственных лесах, на луговых склонах. Ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-10). Степн.-евпонт.

919. *S. oreophila* Grossh. - Шлемник горный. Эндем. На каменистых местах. В субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (петр.) (1-9).

920. *S. orientalis* L. - Шлемник восточный. Эндем. Собран А.И.Лесковым на г.Оштен, осыпь. Верхн. (петр.) (11). Кавк. - иберийск.

921. *Stachys atherocalyx* C.Koch. (*S. recta* L., *S. acanthodonta* Klok., *S. patula* auct. p.p.) - Чистец остисточашечковый. Обычно, по сухим склонам и полянам, в кустарниках. На сухих склонах субальпийского пояса, редко. До верхн. (к.) (1-9). Кавк.-кавк.

922. *S. oschtenica* Juz. - Чистец оштенский. На травянистых склонах и осыпях г.Оштен. Верхн. (петр.) (11).

923. *S. balansaе* Boiss. et Kotschy (*S. germanica* L., *S. terekensis* Knorr.) - Чистец Балансы. Часто на вырубках и полянах лесного пояса, среди высокотравья. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Ксер.-п.аз.

924. *S. germanica* L. (*S. cordata* Klok., *S. heterodonta* Zefir., *S. lanata* Crantz) - Чистец германский. Изредка, по лесным опушкам и лугам, в кустарниках, на засоренных местах. На субальпийских лугах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

925. *S. iberica* Bieb. - Чистец грузинский. Нередко, на травянистых склонах, в зарослях кустарников. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-п.аз.

926. *S. recta* L. (*S. czernjaevii* Shost.) - Чистец прямой. Редко, на сухих склонах, лугах и скалах лесного пояса. Изредка, на субальпийских лугах, в т.ч. на г.Оштен. До верхн. (к.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Степн.-евпонт.

927. *S. sylvatica* L. - Чистец лесной. Довольно часто, преимущественно в широколиственных лесах, изредка в пихтарниках, по каменистым местам и в кустарниках. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

928. *Teucrium chamaedrys* L. - Дубровник обыкновенный. Повсеместно, в светлых лесах по сухим освещенным склонам, каменистым лужайкам, берегам рек, осыпям. Изредка на скалах и осыпях субальпийского пояса. До верхн. (к.) (1-9,11). Бор.-палеар.

929. *Thymus caucasicus* Willd. ex Ronn. - Чабрец кавказский. Эндем. На каменистых местах в альпийском поясе. Верхн. (к.) (8). Кавк.-кавк.

930. *T. humillimus* Celak. - Чабрец приземистый. На скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, на скалистых местах в субальпийском поясе. Верхн. (к.) (1-9,11).

931. *T. majkopensis* Klok. et Shost. - Чабрец майкопский. Эндем. На скалах и сухих каменистых склонах альпийского и субальпийского поясов. Описан по экземплярам, собранным на г.Оштен. Верхн. (к.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

932. *T. marschallianus* Willd. (*T. latifolius* (Bess.) Andrz. - Чабрец Маршалла. Нередко, на сухих склонах, галечниковых отменях, в дубняках. До средн. (к.) (1,2,3,5,6,8,9). Степн.-евпонт.

933. *T. nummularius* Bieb. (*T. buschianus* Klok. et Shost.) - Чабрец монетный. Эндем. Нередко, куртинами на каменистых местах, скалах лесного, субальпийского и альпийского поясов. До верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

934. *T. pseudonummularius* Klok. et Shost. - Чабрец ложно-монетный. Эндем. На каменистых местах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9).

935. *T. pseudopulegioides* Klok. et Shost. - Чабрец ложно-блшинный. Эндем. На лугах. В субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9).

936. *Ziziphora puschkinii* Adams - Зизифора Пушкина. Эндем. На щебнистых местах и осыпях в субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9).

937. *Z. wogonovii* Maleev - Зизифора Воронова. Эндем. Впервые указывается для Северного Кавказа. Найден на осыпи в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (11). Кавк.-кавк.

Сем. Lemnaceae S.F.Gray - Рясковые

938. *Lemna minor* L. - Ряска маленькая. Редко, в стоячих водоемах лесного и в непроточных водоемах субальпийского пояса. До верхн. (гидр.) (1-9).

Сем. Lentibulariaceae Rich. - Пузырчатковые

939. *Pinguicula vulgaris* L. - Жирянка обыкновенная. На болотах и болотистых лугах альпийского и субальпийского поясов. Пер. Луганский, г. Дамхурц, истоки р. Уруштен. Верхн. (гигр.) (1-9).

Сем. Liliaceae Juss. - Лилейные

940. *Colchicum speciosum* Stev. (сем. Melanthiaceae Batsch) - Безвременник великолепный. На лесных полянах и в

кустарниках. На субальпийских лугах. Тисо-самшитовая роща, один экземпляр на границе тисняка лавровишневого. До верхн. (м.) (8,9,10). Ксер.-п.аз. О

941. *C.umbrosum* Stev. - Безвременник теневой. Реликт. Изредка, по лесным полянам и опушкам. На субальпийских лугах, г.Пшекиш. До верхн. (м.) (1-7,10). Ксер.-п.аз. О.

942. *Convallaria transcaucasica* Utkin ex Grossh. (сем.Convallariaceae Horan.) - Ландыш закавказский. Эндем. Редко, в широколиственных, темнохвойных и хвойных лесах. До средн. (м.) (1,2,5). Кавк.-кавк.

943. *Erythronium caucasicum* Woronow - Кандык кавказский. Эндем. Довольно часто, у снежников, по редицам среди березняков. Тисо-самшитовая роща, в широколиственных лесах. На альпийских и субальпийских лугах, часто, ст.Джуга, массив Фишт - Оштен. Нижн., верхн. (м.) (1-11). Кавк.-кавк. О.

944. *Fritillaria caucasica* Adams - Рябчик кавказский. Эндем. На альпийских лугах. Очень редко, г.Пшекиш. Верхн. (м.) (2).

945. *F.latifolia* Willd. - Рябчик широколиственный. Эндем. На альпийских лугах, часто, ст. Джуга, массив Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

946. *F.lutea* Mill - Рябчик желтый. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

947. *F.orientalis* Adams - Рябчик восточный. На альпийских лугах. Очень редко, г.Пшекиш. Верхн. (м.) (2).

948. *Gagea anisanthos* C.Koch - Гусиный лук неравноцвetoкoвый. На лугах и приснежных местах субальпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

949. *Gagea glacialis* C.Koch - Гусиный лук ледниковый. На альпийских лугах. Очень редко. Пастбище Лагонаки. Верхн. (м.) (11).

950. *G.lutea* (L.) Ker-Gawl. - Гусиный лук желтый. Часто, в лесах и кустарниках. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

951. *G.minima* (L.) Ker-Gawl. - Гусиный лук малый. Редко, в лесах и кустарниках. Нижн. (м.) (1,2,5). Бор.-палеар.

952. *G.sulfurea* Miscz. - Гусиный лук серно-желтый. Эндем. На альпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

953. *Lilium kesselringianum* Miscz. - Лилия Кессельринга. Эндем. На субальпийских лугах и верхней границе леса южного макросклона заповедника. Редко, г.Коготь. Верхн. (м.) (8). Др.л.-колх.др. О.

954. *L.monadelphum* Bieb. (*L.georicum* Manden.) - Лилия односторонняя. Эндем. На субальпийских лугах. Часто, в составе субальпийского высокотравья, по полянам и в кус-

тарниках. Ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

955. *L. caucasicum* (Miscz. ex Grossh.) Grossh. - Лилия кавказская. Эндем. Тисо-самшитовая роща, в дубовых лесах. Нижн. (м.) (10). Кавк.-кавк. О.

956. *L. szovitsianum* Fisch. et Ave-Lall. - Лилия Шовица. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Редко. Верхн. (м.) (1-9).

957. *Lloydia serotina* (L.) Reichenb. - Ллойдия поздняя. На альпийских лугах, часто ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

958. *Muscari coeruleum* Losinsk. = *Pseudomuscari coeruleum* (Losinsk.) Garbari (сем. Hyacinthaceae Batsch) — Гадючий лук синий (Ложный гадючий лук синий). Эндем. На альпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9). О.

959. *M. dolichanthum* Woronow et Tron (*M. steupii* Woronow et Tron) - Гадючий лук длинноцветковый. Эндем. На альпийских лугах, очень редко, г. Аибга. Верхн. (м.) (3). О.

960. *M. pallens* (Bieb.) Fisch. = *Pseudomuscari pallens* (Bieb.) Garbari - Гадючий лук бледный. Эндем. На альпийских лугах. Очень редко. Хр. Дзювя, гг. Б.Бамбак, Чугуш (Семагина, 1997). Верхн. (м.) (6,8).

961. *M. racemosum* Mill. = *Muscari muscarimi* (L.) Medik. - Гадючий лук кистевидный. На альпийских и субальпийских лугах. Редко. Верхн. (м.) (1-9).

962. *M. szovitsianum* Baker (*M. neglectum* sensu Losinsk.) - Гадючий лук Шовица. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Изредка. Верхн. (м.) (1-9).

963. *Ornithogalum arcuatum* Stev. - Птицемлечник дугообразный. Эндем. Очень редко. Отмечен на г. Гузерипль. нижн. (м.) (2). Кавк.-кавк. О.

964. *O. balansae* Boiss. (*O. oligophyllum* auct. p.p.) - Птицемлечник Балансы. На альпийских и субальпийских лугах. В т.ч. на массиве Фишт - Оштен, на альпийских лугах после таяния снега. До верхн. (м.) (1-11).

965. *O. ponticum* Zahar. (*O. pyrenaicum* auct.) - Птицемлечник понтийский. Редко, на остепненных склонах. Отмечен в окрестностях пос. Гузерипль и Киша. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (1,2,10). Бор.-палеар.

966. *O. woronowii* Krasch. - Птицемлечник Воронова. Эндем. Тисо-самшитовая роща, в широколиственных, преимущественно в дубовых лесах. Нижн. (м.) (10). Крымск.-кавк.

967. *Paris incompleta* Bieb. (сем. Trilliaceae Lindl.) - Вороний глаз неполный. Реликт. Нередко в буково-пихтовых и широколиственных субтропических лесах. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (м.) (1-10). Древн.л.-колх.др.

968. *Polygonatum glaberrimum* C.Koch (сем. Convallariaceae Horan.) - Купена гладкая. Эндем. Г.Фишт, на верхнем пределе леса. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (м.) (10,11).

969. *P.multiflorum* (L.) All. - Купена многоцветковая. Обычно, в буково-пихтовых лесах по кустарникам. Средн.-верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

970. *P.ovatum* Misch. ex Knorr. - Купена овальная. Эндем. Изредка, в лесах. Нижн.-средн. (м.) (8,9). Кавк.-кавк.

971. *P.polyanthemum* (Bieb.) A.Dietr.= *P.orientale* Desf. - Купена восточная. Обычно, в лесах, кустарниках. До верхн. (м.) (1-10). Ксер.-п.аз.

972. *P.verticillatum* (L.) All. - Купена мутовчатая. Реликт. Нередко, в лесах и в составе высокотравья. В субальпийском поясе по опушкам. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

973. *Scilla bifolia* L. (*S.nivalis* Boiss.) (сем. Hyacinthaceae Batsch.) - Пролеска двулистная. Нередко по опушкам и полянам верхнего лесного пояса, а также в субтропических, преимущественно дубовых лесах. В тисо-самшитовой роще. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

974. *S.siberica* Haw. (*S.mordakiae* Speta) - Пролеска сибирская. По лесным опушкам и полянам. На субальпийских лугах, нередко, у снежников. Ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-9). Степн.-европ.

975. *Tulipa lipskyi* Grossh. (*T.caucasica* Lipsky) - Тюльпан Липского. Эндем. На лугах и щебнистых местах альпийского пояса. Очень редко, г.Ятыргварта, хр.Сергеев Гай (Алтухов, 1971). Верхн. (м.) (6). О.

976. *Veratrum lobelianum* Bernh. (сем. Melanthiaceae Batsch) - Чемерица Лобеля. В субальпийском поясе, на лугах, по опушкам и полянам. Повсеместно, сорняк летних пастбищ. Ст. Джуга. Ядовито. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

Сем. Linaceae DC. ex S.F.Gray. - Льновые

977. *Linum catharticum* L. - Лен слабительный. Редко, на лугах и полянах. Известен с пос. Гузерибль. Нижн. (м.) (2). Бор.-евр.

978. *L.hypericifolium* Salisb. - Лен зверобоелистный. Часто, на лугах, каменистых местах, на скалах, по опушкам, на верхнем пределе леса. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-10) Ксер.-п.аз.

Сем. Loranthaceae Juss. (Viscaceae Batsch.) - Ремнецветные

979. *Viscum album* L. - Омела белая. Паразитирует на ди-

ких плодовых, иногда на темнохвойных породах. Ядовито. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

Сем. *Lycopodiaceae* Beauv. ex Mirb. - Плауновые

980. *Lycopodium alpinum* L. = *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub - Плаун альпийский. На влажных лугах альпийского пояса. Изредка. Верхн. (гидр.-м.) (1-9).

981. *L. annotinum* L. - Плаун годовалый. На альпийских и субальпийских лугах. Редко, на верхнем пределе леса. Верхн. (м.) (5,6). Бор.-палеар.

982. *L. clavatum* L. - Плаун булавовидный. На влажных лугах альпийского и субальпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9).

983. *L. selago* L. = *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. (сем. *Huperziaceae*) - Плаун баранец. В темнохвойных лесах, нередко. На альпийских и субальпийских лугах, изредка. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

Сем. *Lythraceae* J. St. - Hil. - Дербенниковые

984. *Lythrum salicaria* L. = *L. intermedium* Ledeb., part - Дербенник иволистный. Смешанные субтропические леса (Тисо-самшитовая роща). Нижн. (м.) (10). Бор.-палеар.