

Сем. Malvaceae Juss. - Мальвовые

985. *Alcea rugosa* Alef. - Шток-роза морщинистая. Нередко, в светлых лесах, у дорог, жилищ, в кустарниках. Нижн. (к.-м.) (1,2,3,5,6,8,9). Степн.-сарм.

986. *Lavatera thuringiaca* L. - Хатма тюрингская, собачья роза. Нередко, на сорных местах, лугах, у дорог и жилищ. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Степн.-понт.

987. *Malva neglecta* Wallr. - Просвирник пренебреженный. Редко, на сорных местах в лесном поясе. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

988. *M. nicaeensis* All. - Просвирник ниццкий. Субтропические леса (Тисо-самшитовая роща). Нижн.(м.)(10).

Сем. Menyanthaceae Dumort. - Вахтовые

989. *Menyanthes trifoliata* L. - Вахта трехлистная. На влажных лугах и болотах субальпийского пояса. Очень редко, гг. Б.Бамбак (указан Н.Д.Алтуховым (1992), в настоящее время не найден), г.Хацавитая, верховья р.Мзымта, истоки р.Рожкоа, встречен на болоте в верховье р.Уруштен. На г.Дзиатаку (Акатов, 1986).

Сем. Monotropaceae Nutt. - Вертлянцевые

990. *Hypopitys monotropa* Crantz - Подъельник обыкновенный. Редко, под пологом широколиственных и хвойных лесов. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

Сем. Moraceae Link - Тутовые

991. *Ficus carica* L. (*F. colchica* Grossh., *F. hyrcana* Grossh) - Инжир колхидский. Реликт. Тисо - самшитовая роща. Изредка, в самшитовых лесах. Нижн. (м.) (10). О.

992. *Morus alba* L. - Шелковица белая. Изредка, в субтропических лесах (Тисо-самшитовая роща). Нижн.(м.)(10).

Сем. Oleaceae Hoffm. et Link - Масличные

993. *Fraxinus excelsior* L. - Ясень обыкновенный. Реликт. Повсеместно, в составе смешанно - широколиственных лесов, единично в I и II ярусах. Редко чистыми древостоями. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

994. *Ligustrum vulgare* L. - Бирючина обыкновенная. Реликт. Широко по скалистым участкам, открытым склонам. До средн. (к.- м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-евр.

Сем. Onagraceae Juss. - Кипрейные

995. *Chamaerion angustifolium* (L.) Holub (*Chamaemerion angustifolium* (L.) Scop.) - Иван-чай узколистный, копорский чай. Часто, в лесах и на лугах, на вырубках, в долинах рек, на скалистых обнажениях, большими группами, повсеместно. На субальпийских лугах. Ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

996. *Ch. colchicum* (Albov) Steinb. - Иван-чай колхидский. Нередко, на галечниках, в долинах рек лесного пояса. На субальпийских и альпийских лугах, в т.ч. на массиве Фишт - Оштен. До верхн. (м.) (1-9,11). Колх.-горн.

997. *Circaea alpina* L. - Двулепестник альпийский. Нередко, в буковых, пихтово-буковых лесах, на влажных тенистых местах. В верхнем лесном и субальпийском поясах. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.

998. *C. intermedia* Ehrh. - Двулепестник средний. Редко, в тенистых лесах, по берегам рек, на галечниках группами, до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

999. *C. lutetiana* L. - Двулепестник парижский. Реликт. Часто, под пологом леса на богатых почвах, группами. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-голар.

1000. *Epilobium algidum* Vieb. - Кипрей холодный. На влаж-

ных местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (гигр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1001. *E.alpestre* (Jacq.) Krock. - Кипрей альпийский. Изредка, на крупнотравных полянах, по влажным местам субальпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-евр.

1002. *E.anagallidifolium* Lam. = *E.alpinum* L. - Кипрей анагалисолистный. На влажных местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар-аркто.-альп.

1003. *E.gemmascens* C.A.Meу. - Кипрей почконосный. На влажных местах в альпийском поясе.

1004. *E.hirsutum* L. - Кипрей мохнатый. Очень редко, на вырубках и сорных местах, по окраинам болот. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1005. *E.montanum* L. - Кипрей горный. Реликт. Часто, по берегам рек и ручьев, под пологом лесов и на высокогорных лугах. До верхн. (гигр.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1006. *E.nervosum* Boiss. et Buhse - Кипрей жилковатый. На влажных местах в верхнем лесном и субальпийском поясах. Верхн. (гигр.) (1-9).

1007. *E.palustre* L. - Кипрей болотный. На болотах субальпийского пояса. Очень редко, г.Б.Бамбак. Верхн. (гигр.) (6). Бор.-голаркт.-аркто.-альп.

1008. *E.parviflorum* Schreb. - Кипрей бледноцветковый. Изредка, на вырубках, по болотам и берегам рек. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

1009. *E.prionophyllum* Hausskn. - Кипрей городчатolistный. На влажных местах в альпийском и субальпийском поясах. Верхн. (гигр.) (1-9,11). Кавк. -.колх.-горн.

1010. *E.trigonum* Schrank. - Кипрей трехсторонний. Массив Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (11). Бор.-ср.евр.-горн.

1011. *Oenothera biennis* L. (*Onagra biennis* (L.) Scop.) - Ослиник двулетний. Изредка, по лесным полянам, галечникам, по берегам рек, по песчаным местам. До средн. (м.)(1,2,3,5,6,8,9). Адв.(Сев.Амер.)

Сем. Onocleaceae Pichi Sermolli - Оноклейные

1012. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro (*Struthiopteris filicastrum* All.) - Страусопер, черный папоротник. Реликт. Часто, в горных тенистых лесах. До средн. (гигр.-м.) (1-9). Бор.-голар.

Сем. Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh - Ужовниковые

1013. *Botrychium lunaria* (L.) Sw. (сем. Botrychiaceae Horan.) - Гроздовник полулунный. Изредка, в светлохвойных лесах, в основном на известняковых породах, по осыпям. На альпийских и субальпийских лугах. Редко, гг. Мырзакау, Б.Тхач, Б.Бамбак, Фишт - Оштен, Ятыргварта, Джуга, Челепсинский хребет. Верхн. (петр.) (1,6,9,11). Бор.-голар.

1014. *Ophioglossum vulgatum* L. - Ужовник обыкновенный. Очень редко, собран с поляны Гузерипль и близ кордона Черноречье. Тисо-самшитовая роща, редко, по опушкам, в смешанных лесах. Нижн. (м.) (3,5,10). Бор.-палеар.

Сем. Orchidaceae Juss. - Орхидные

1015. *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. - Анакамитис пирамидальный. Очень редко, по опушкам, на полянах и скалистых местах. Тисо-самшитовая роща, очень редко, в дубово-грабовых лесах. До средн. (м.) (2,5,10). Бор.-палеар. О.

1016. *Sephalanthera damasonium* (Mill.) Druce (*S.lonchophyllum* (L. fil.) Mansf.) - Пыльцеголовник дамасонский. Редко, в лесах. Тисо-самшитовая роща, очень редко, преимущественно в дубовых, реже в самшитовых лесах. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар. О.

1017. *S.longifolia* (L.) Fritsch - Пыльцеголовник длиннолистный. Очень редко, в широколиственных лесах, преимущественно в дубняках, тисо-самшитовая роща. Встречается на основной территории заповедника (бассейн рек Ачипсе и Шахе). Нижн. (м.) (8,9,10). О.

1018. *S.gubra* (L.) Rich. - Пыльцеголовник красный. Изредка, преимущественно в светлых лесах. До средн. (м.) (1-10). Бор.-палеар. О.

1019. *Coeloglossum viride* (L.) C.Hartm. - Пололепесник зеленый. Изредка, по полянам в лесах, на альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга, Челепсинский хребет. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.

1020. *Corallorhiza trifida* Chatel. - Ладьян трехнадрезанный. Нередко, в сырых лесах. До верхн. (гигр.-м.) (1-9). Бор.-голар.

1021. *Dactylorhiza euxina* (Nevski) Czer. (*Dactylorchis caucasica* (Klinge) Soo, *Orchis caucasica* (Klinge) Soo) - Пальчатокоренник кавказский. На субальпийских лугах, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

1022. *D.flavescens* (C.Koch) Holub (*Orchis flavescens* C.Koch.) - Пальчатокоренник желтоватый. Изредка в листовен-

ных и хвойных лесах. Средн.-верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1023. *D. incarnata* (L.) Soo (*Orchis incarnata* L.) - Пальчатокоренник безрогой. На болотах и зарастающих озерах (гг. Ачишхо, Б. Чура, Кудо.). Верхн. (гигр.) (8,9).

1024. *D. majalis* (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes (*Orchis majalis* Reichenb., *O. latifolia* L.) - Пальчатокоренник майский. На влажных лугах субальпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9).

1025. *D. triphylla* (C. Koch.) Czer. = *D. amblyoloba* (Nevski) Aver, (*Orchis triphylla* C. Koch.) - Пальчатокоренник трехлистный. Изредка. на лесных полянах. Тисо-самшитовая роща, очень редко, в широколиственных лесах. На субальпийских лугах, изредка. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар. О.

1026. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz (*Serapias helleborine* L., *Epipactis latifolia* (L.) All.) - Дремлик морозниковый. Редко, в лиственных и темнохвойных лесах. До верхн. (м.) (2,3). Бор.-палеар.

1027. *Epipogium aphyllum* Sw. - Надбородник безлистный. Изредка, в лиственных и хвойных лесах. Средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар. О.

1028. *Goodyera repens* (L.) R.Br. - Гудайера ползучая. Изредка, в хвойных лесах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1029. *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. - Кокушник комарниковый. Часто, на лесных полянах, в кустарниках. На альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1030. *Limodorum abortivum* (L.) Sw. - Лимодорум недоразвитый. Тисо-самшитовая роща, в дубовых и дубово-грабовых лесах. Нижн. (м.) (10). О.

1031. *Listera cordata* (L.) R.Br. - Тайник сердцевидный. Изредка, в хвойных лесах и зарослях рододендрона. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1032. *L. ovata* (L.) R.Br. - Тайник овальный. Реликт. Изредка, в смешанных лесах. Тисо-самшитовая роща, в широколиственных лесах. До верхн. (м.) (7,10). Бор.-палеар.

1033. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. - Гнездовка настоящая. Часто, в тенистых лесах. Тисо-самшитовая роща, преимущественно в самшитовых лесах. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

1034. *Ophrys apifera* Huds. - Оффрис пчелоносная. Тисо-самшитовая роща, очень редко, в широколиственных лесах. Нижн. (м.) (10). О.

1035. *O. oestrifera* Bieb. (*O. cornuta* Stev.) - Оффрис оводоносная. Тисо-самшитовая роща. Очень редко, в широколи-

ственных, реже в самшитовых лесах. Нижн. (м.) (10). О.

1036. *Orchis coriophora* L. - Ятрышник клопоносный. На субальпийских лугах, редко, массив Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (11). О.

1037. *O. mascula* (L.) L. - Ятрышник мужской. Изредка под пологом леса. Тисо-самшитовая роща, в смешанных лесах. На осыпях субальпийского пояса, г. Гузерипль. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар. О.

1038. *O. militaris* L. - Ятрышник шлемоносный. Изредка, по лесным полянам и опушкам. Средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар. О.

1039. *O. provincialis* Valb. ex DC. - Ятрышник деревенский. Тисо-самшитовая роща, в дубово-грабовых лесах. Нижн. (м.) (10). Древн.-средиз.л. О.

1040. *O. purpurea* Huds. - Ятрышник пурпурный. Тисо-самшитовая роща, изредка, в дубово-грабовых лесах. Нижн. (м.) (10). Евр.л. О.

1041. *O. tridentata* Scop. - Ятрышник трехзубчатый. Тисо-самшитовая роща. Обнаружено 19 особей в дубняке грабни-ковом (А.А.Лебедева, 1994). Нижн. (м.) (10) О.

1042. *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb. - Любка зеленоцветная. Часто, по берегам рек, на влажных полянах и под пологом леса. До верхн. (гигр. -м.) (1-10). Бор.-палеар.

1043. *Serapias vomeracea* (Burm. fil.) Briq. - Серапиас сошниковый. Очень редко. Тисо-самшитовая роща. Единственный экземпляр этого растения обнаружен в грабо-букняке (Лебедева, 1994). Нижн. (м.) (10). О.

1044. *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. - Скрученник спиральный. Тисо-самшитовая роща. Очень редко, в самшитовом лесу. Нижн. (м.) (10). О.

1045. *Steveniella satyrioides* (Stev.) Schlechter - Стевениелла сатириовидная. Тисо-самшитовая роща, единично в широколиственных лесах. Нижн. (м.) (10). О.

1046. *Traunsteinera globosa* (L.) Reichenb. - Траунштейнера шаровидная. Очень редко. На влажных субальпийских и альпийских лугах, г. Б. Чура. Верхн. (м.) (3, 9) О

1047. *T. sphaerica* (Bieb.) Schlechter - Траунштейнера сферическая. Довольно часто. На влажных субальпийских и альпийских лугах, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1 - 9).

Сем. *Orobanchaceae* Vent - Заразиховые

1048. *Orobanche alba* Steph. - Заразиха белая. На каменистых и остепненных склонах, в кустарниках, при дорогах. Изредка на субальпийских лугах, хр. Аишха. Паразитирует на

губоцветных. Средн., верхн. (к.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

1049. *O.crenata* Forssk. - Заразиха городчатая. Изредка, в кустарниках и светлых лесах, на полянах. На субальпийских лугах, редко, г.Чугуш. Паразитирует на бобовых. Средн., верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1050. *O.gamosepala* Reut. - Заразиха сrostночашечная. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Оштен, на лугах близ Черкесского перевала. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (м.) (10,11).

1051. *O.grossheimii* Novopokr. - Заразиха Гроссгейма. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

1052. *O.lutea* Baumg. - Заразиха современная. На субальпийских лугах. Редко. Верхн. (м.) (1-9).

1053. *O.major* L. = *O. elatior* Sutt - Заразиха большая. На субальпийских лугах. Редко. Верхн. (м.) (1-9).

1054. *O.minor* Smith. - Заразиха малая. На субальпийских лугах. Редко, г.Оштен близ Черкесского перевала. Верхн. (м.) (11).

1055. *O.owerinii* (G.Beck) G.Beck = *O.crenata* Forssk - Заразиха Оверина. Эндем. На скалах альпийского пояса. Редко, г.Тыбга. Верхн. (м.) (2).

1056. *O.raddeana* G.Beck - Заразиха Радде. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

1057. *Phelypaea coccinea* (Bieb.) Poir = *Diphelypaea coccinea* (Bieb.) Nicolson - Флипея красная. На субальпийских лугах. Редко, г.Закан. Верхн. (м.) (7).

Сем. Oxalidaceae R.Br. - Кисличные

1058. *Oxalis acetosella* L. - Кислица обыкновенная. Повсеместно в пихтовых, буково-пихтовых лесах, доминант мелко-котравных лесных синузий, в том числе в пихтовых лесах, г. Фишт. В субальпийском поясе в зарослях кавказского рододендрона. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-голар.

1059. *O.corniculata* L. = *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small - Кислица рожковая. На сорных местах. Известна из района пос.Красная Поляна, берег р.Мзымта. Тисо-самшитовая роща. До средн. (К.-м.) (8,10). Ксер.-пуст.-тур.