

Сем. *Paeonaceae* Rudolphi - Пионовые

1060. *Paeonia caucasica* (Schipcz.) Schipcz. (*P. kavachensis* aust.) - Пион кавказский. Эндем. Изредка, по полянам, опушкам, кустарникам. До средн. (м.) (1,2,3,5,10). Древн.л.-колх.-др. О.

1061. *P. daurica* Andr. (*P. taurica* auct.) - Пион крымский. Эндем. Редко, в светлых лесах. Нижн. (м.) (8,9). Кавк.-кавк.

1062. *P. tenuifolia* L. (*P. biebersteiniana* Rupr.) - Пион узколиственный. На остепненных полянах в светлых лесах. До средн. (Кс.-м.) (8,9). Кавк.-кавк. О.

1063. *P. wittmanniana* Hartwiss ex Lindl. (*P. abchasica* Miscz.) - Пион Виттманна. Эндем. Очень редко, в широколиственном лесу, на склоне хр. Углогового, в нижнем течении р. Длинной. Зафиксировано 22 цветущих особи (Лебедева, 1994). Средн. (м.) (8). Др.л.-колх. Др.О.

Сем. Papaveraceae Juss. - Маковые

1064. *Chelidonium majus* L. - Чистотел большой. Очень редко, у жилья, при дорогах. Тисо-самшитовая роща, по опушкам. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

1065. *Papaver lasiothrix* Fedde - Мак мохнатый. Эндем. Редко, на освещенных лесных полянах и каменистых склонах (пол. Веселая, бассейн р. Умпырка). До средн. (кс.-м.) (5). Ксер.-п. аз.

1066. *P. oreophilum* Rupr. - Мак горный. Эндем. На щебнистых и каменистых местах альпийского пояса, г. Тыбга, очень редко. Верхн. (м.) (2).

1067. *P. orientale* L. - Мак восточный. Эндем. Среди высокоотравья. Очень редко, г. Закан. Верхн. (м.) (7). О.

Сем. Parnassiaceae S.F.Gray - Белозоровые

1068. *Parnassia palustris* L. - Белозор болотный. На влажных лугах и болотах субальпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, изредка, на альпийских лугах в кобрезниках. Верхн. (гигр.) (1-9,11).

Сем. Phytolaccaceae R.Br. - Лаконосовые

1069. *Phytolacca americana* L. - Лаконос американский. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (10). Адв.-адв. Занесен из Америки.

Сем. Pinaceae Lindl. - Сосновые

1070. *Abies nordmanniana* (Stev.) Spach. - Пихта Нордманна. Реликт. Повсеместно до 2300 м н.ур.м. Основная лесообразующая порода. Средн., верхн. (м.) (1-9,11). Древн.л.-колх.др.

1071. *Picea orientalis* (L.) Link - Ель восточная. Реликт. Лесообразующая порода, образует чистые древостои и в смеси с пихтой, в составе II и III ярусов. Западная граница ареала

троходит на уровне хр. Пшекиш - верховий рек Безымянная и Чессу. До верхн. (м.) (5,6,7). Древн.л.-колх.др.

1072. *Pinus sosnowskyi* Nakai = *P. kochiana* Klotzsch ex C. Koch - Сосна Сосновского. По скалистым участкам, южным склонам, в полосе верхнего предела леса, образует как коренные, так и вторичные древостои на вырубках, пожарищах, в канавах стока лавин. Редко, отдельными экземплярами в субальпийском поясе. До верхн. (к.-м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

Сем. Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые

1073. *Plantago atrata* Hoppe - Подорожник чернеющий. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн.(м.) (1-9).

1074. *P. lanceolata* L. - Подорожник ланцетолистный. Нередко, у дорог, на сорных местах, на послелесных остепненных лугах, во вторичных светлых лесах. Изредка, на субальпийских лугах. До верхн. (к.) (1-10). Бор.-палеар.

1075. *P. major* L. - Подорожник большой. Часто, у дорог, жилищ, в широколиственных лесах, на полянах. В субальпийском поясе. Изредка, г. Оштен. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10,11). Бор.-палеар.

1076. *P. media* L. - Подорожник средний. Изредка, на сухих полянах, лугах, травянистых склонах, залежах. До средн. (к.) (1-9). Бор.-палеар.

1077. *P. saxatilis* Bieb. (*P. caucasica* Parava) - Подорожник скальный. Обычно, на щебнистых субальпийских и альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

Сем. Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) - Мятликовые

1078. *Agropyron caninum* (L.) P. B. = *Elymus caninus* (L.) L. - Пырей собачий. На осыпях субальпийского пояса. Редко, г. Фишт. Верхн. (петр.) (11).

1079. *A. repens* (L.) Beauv. = *Elytrigia repens* (L.) Nevski - Пырей ползучий. Редко, на послелесных полянах, галечниках, по берегам рек. На субальпийских лугах. Очень редко. Плато Лагонаки, у дорог; уроч. Псенадах. До средн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1080. *Agrostis alba* L. = *A. gigantea* Roth. - Полевица белая. Часто, на лугах, лесных полянах, по берегам рек, ручьев. На субальпийских лугах. До верхн. (гигр.-м.) (1-9,11). Бор.-голар.

1081. *A. planifolia* C. Koch. - Полевица плосколистная. На субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

1082. *A. teberdensis* Litv. = *A. clavata* Trin. - Полевица тебердинская. Эндем. Редко, в широколиственных лесах, на сырых

- местах, по берегам рек. До средн. (гигр.-м.) (1-9). Кавк.-кавк.
1083. *A. tenuifolia* Bieb. = *A. vinealis* Schreb. - Полевица тонколистная. Эндем. На сухих и каменистых местах субальпийского пояса. Массив Оштен, на лугах. Верхн. (к.) (1-9 11).
1084. *A. tenuis* Sibth. (*A. capillaris* auct.) - Полевица тонкая. Изредка, в светлых широколиственных лесах, по опушкам. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.
1085. *Alopecurus aequalis* Sobol. - Лисохвост ровный. Редко. На сырых местообитаниях, мочажинах, вырубках. По сырым местам субальпийского пояса. Очень редко, г. Ятыргварта. До верхн. (гигр.) (1,6,9). Бор.-палеар.
1086. *A. dasyanthus* Trautv. - Лисохвост пушистоцветковый. Эндем. Массив Оштен, редко на осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (11). Ксер.-п.аз.
1087. *A. glacialis* C.Koch (*A. brevifolius* Grossh., *A. vaginatus* (Willd.)) - Лисохвост ледниковый. На щебнистых альпийских лугах. Верхн. (петр.) (1-9).
1088. *A. pratensis* L. - Лисохвост луговой. На полянах и лугах, по влажным местам лесного пояса. На влажных субальпийских лугах. До верхн. (гигр. - м.) (1-9,11). Бор.-палеар.
1089. *A. sericeus* Albov = *A. ponticus* C.Koch - Лисохвост шелковистый. Эндем. На осыпях, каменистых и щебнистых местах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-колх.
1090. *A. tiflisiensis* (Westb.) Grossh. (*A. textilis* Boiss.) - Лисохвост тбилисский. Эндем. Указывается А.Н.Альпер (1960) для массива Оштен, на осыпях, по сборам И.М.Введенского. Верхн. (петр.) (11).
1091. *A. vaginatus* (Willd.) Pall. ex Kunth - Лисохвост влажлищный. На каменистых и щебнистых местах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).
1092. *Anthoxanthum alpinum* A. et D.Love - Колосок альпийский. Часто, на альпийских и субальпийских лугах, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9).
1093. *A. odoratum* L. - Душистый колосок. Часто, по лесным полянам, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.
1094. *Arrhenatherum elatius* (L.) J. et C.Presl - Райграсс высокий. Обычно, в составе высокотравья. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.
1095. *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. - Коротконожка перистая. Обычно, на полянах, опушках, в светлых лесах. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.
1096. *B. rupestre* (Host.) Roem. et Schult. - Коротконожка

скальная. Часто, на сухих склонах, в сосняках. До верхн. (Кс.-м.) (1-7). Бор.-палеар.

1097. *V. sylvaticum* (Huds.) Beauv. - Коротконожка лесная. Реликт. Нередко, в темнохвойных лесах, на полянах и опушках. До средн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1098. *Briza australis* Prokud. - Трясунка южная. На лугах от предгорий до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9).

1099. *Briza elatior* Sibth. et Smith. - Трясунка высокая. На субальпийских лугах. Изредка. Верхн. (м.) (1-9).

1100. *V. marcowiczii* Woronow - Трясунка Марковича. Эндем. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

1101. *V. media* L. - Трясунка средняя. Обычно, на остепненных луговых полянах и опушках. До средн. (кс.) (1,5). Бор.-евр.

1102. *Bromopsis benekenii* (Lange) Holub (*Bromus benekenii* (Lange) Trimen, *Zerna benekenii* (Lange) Lindm.) - Костерок (костер) Бенекина. Реликт. Нередко, на лесных полянах, лужайках, в составе субальпийского высокотравья. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1103. *V. inermis* (Leyss.) Holub (*Bromus inermis* Leyss., *Zerna inermis* (Leyss.) Lindm.) - Костер безостый. Очень редко, отмечен на полянах урочища Умпырь. До средн. (м.) (5). Бор.-палеар.

1104. *V. riparia* (Rehm.) Holub (*Bromus riparius* Rehm., *Zerna riparia* (Rehm.) Nevski) - Костер береговой. Редко, в широколиственных лесах, по каменистым склонам, на остепненных лугах. Массив Фишт - Оштен, часто, на субальпийских лугах. До верхн. (Кс.-м.) (1-9,11). Бор.-евр.

1105. *V. variegata* (Bieb.) Holub (*Bromus variegatus* Bieb., *Zerna variegata* (Bieb.) Nevski) - Костер пестрый. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах, ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

1106. *Bromus commutatus* Schrad. - Костерок переменчивый. Изредка, на полянах, галечниках, по берегам рек, обочинам дорог в лесном поясе. На субальпийских лугах, как сорное. Г.Оштен. До средн. (м.) (1-9,11). Бор.-евр.

1107. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth - Вейник тростниковидный. Доминирующий вид субальпийских лугов. Иногда в темнохвойных лесах, на альпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1108. *C. balansae* Boiss. = *Agrostis balansae* (Boiss.) Tzvel. - Вейник Балансы. На осыпях и лугах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9).

1109. *C. epigeios* (L.) Roth - Вейник наземный. Изредка, на

полянах, галечниках, по берегам рек. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1110. *C.olympica* Boiss. = *Agrostis olympica* (Boiss.) Bor - Вейник олимпийский. На болотах альпийского пояса. Очень редко. Истоки р.Бамбачка. Верхн. (гигр.) (6).

1111. *C.pseudophragmites* (Hall. fil) Koel. (*C.glauca* (Bieb.) Trin. - Вейник ложнотростниковидный. Редко, на галечниках, по берегам рек. Долина р.Холодная. Нижн. (гигр.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

1112. *C.teberdensis* Litv. - Вейник тебердинский. Эндем. По берегам рек в субальпийском поясе. Очень редко. Район оз. Кардывач. Изредка по берегам рек в лесном поясе. Верхн. (м.) (7,8). Кавк.-кавк.

1113. *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. - Поручейница водяная. На болотах и по берегам рек в субальпийском поясе. Редко, г.Гузерибль, хр.Герпегем. Верхн. (гигр.) (2).

1114. *Cinna latifolia* (Trev.) Griseb. - Цинна широколистная. Изредка, по балкам и берегам рек. До верхн. (м.) (2,3,5,6). Бор.-голар.

1115. *Colpodium colchicum* (Albov) Woronow = *Paracolpodium colchicum* (Albov) Tzvel. - Колподиум колхидский. Эндем. На осыпях альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-колх.

1116. *C.ponticum* (Bal.) Woronow = *Hyalopoa pontica* (Bal.) Tzvel. - Колподиум понтийский. На щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, нередко, на щебнистых лугах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9,11). Евр.-колх.

1117. *C.variegatum* (Boiss.) Griseb. = *Catabrosella variegata* (Boiss.) Tzvel. - Колподиум пестрый. На щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов. Изредка. Верхн. (петр.) (1-9).

1118. *C.versicolor* (Stev.) Schmalh. (*C.schelkownikowii* Grossh.) - Колподиум разноцветный. Эндем. На осыпях и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Изредка. Верхн. (петр.) (1-9).

1119. *Cuviera europaea* (L.) Koel. = *Hordelymus europaeus* (L.) Harz. - Кувьера европейская. Реликт. Нередко, по полянам и опушкам, в тенистых лесах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

1120. *Dactylis glomerata* L. - Ежа сборная. По лесным полянам, опушкам, в составе субальпийского высокотравья и лесного крупнотравья. На субальпийских лугах. Ст.Джуга. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-палеар.

1121. *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. - Луговик дернис-

тый. На сырых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Оштен, изредка, на влажных лугах. До верхн. (гигр.-м.) (1-9,11). Бор.-голар.

1122. *Digitaria pectiniformis* (Henrard) Tzvel. - Росичка гребенчатая. Редко, на галечниковых отмелях, при дорогах. Нижн. (м.) (8,9). Бор.-голар.

1123. *D.sanguinalis* (L.) Scop. - Росичка кровавая. Изредка, по галечникам, берегам рек, огородам. Нижн. (м.) (1,2,3,8,9). Бор.-голар.

1124. *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. (*E.colonum* auct.) - Ежовник, куриное просо. Редко, по влажным и сорным местам в лесном поясе. Тисо-самшитовая роща, по опушкам и полянам. Нижн. (гигр.-м.) (1,2,3,9,10). Бор.-палеар.

1125. *Festuca altissima* All. (*F.sylvatica* (Poll.) Vill.) - Овсяница высочайшая. Реликт. Изредка, в тенистых лесах. До верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-колх.др.

1126. *F.arundinaceae* Schreb. - Овсяница тростниковидная. На влажных субальпийских лугах. Редко, г.Оштен, район оз. Кардывач. Верхн. (гигр.-м.) (8,11).

1127. *F.caucasica* (Boiss.) Hack. ex Trautv. - Овсяница кавказская. Эндем. На щербнистых местах в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-даг.

1128. *F.djirmilensis* Boiss. et Bal. - Овсяница джимильская. На субальпийских лугах, редко. Массив Фишт - Оштен, эдификатор субальпийских лугов. Верхн. (м.) (1-9,11).

1129. *F.drymeja* Mert. et Koch (*F.montana* Bieb.) - Овсяница горная. Реликт. Господствующий вид в субэдификаторных синузиях леса от субтропиков до верхнего предела леса. До верхн. (м.) (1-11). Древн.л.-колх.др.

1130. *F.gigantea* (L.) Vill. - Овсяница гигантская (исполинская). Реликт. Нередко. По лесным полянам, тенистым местам. Массив Оштен, в лесном поясе. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-палеар.

1131. *F.ovina* L. - Овсяница овечья. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, на альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.

1132. *F.pratensis* Huds. - Овсяница луговая. На субальпийских лугах. Редко. Верхн. (м.) (1-9).

1133. *F.rubra* L. - Овсяница красная. Редко, в светлых лесах. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (3). Бор.-голар.

1134. *F.rupicola* Neuff. - Овсяница скальная. Нередко, на лесных остепненных полянах. Верхний предел. леса. До верхн. (кс.) (1-9). Степн.-сарм.

1135. *F.ruprechtii* (Boiss.) V.Krecz. et Bobr. - Овсяница Рупрехта. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах, на скалах, изредка. Массив Фишт - Оштен, эдификатор альпийских лугов. Верхн. (м.) (1-9,11).

1136. *F.sulcata* (Hack.) Nym. = *F.valesiaca* Gaudin - Овсяница бороздчатая. На сухих склонах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1137. *F.sommieri* Litardiere (*F.longearistata* (Hack.) Somm. et Levier) - Овсяница Сомье. Эндем. На скалах альпийского и субальпийского пояса, редко. Массив Фишт - Оштен, часто на скалах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). О.

1138. *F.supina* Schur. = *F.airoides* Lam. - Овсяница приземистая. На лугах, скалах и осыпях альпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, часто, на альпийских лугах и скалах. Ст.Джуга, склоны к р.Аспидная. Верхн. (м.) (1-9,11).

1139. *F.versicolor* Tausch. (*F.varia* Haenke) - Овсяница пестрая. На лугах, скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Часто, ст. Джуга, на южных склонах. Верхн. (к.) (1-9,11). Бор.-евр.

1140. *Glyceria lithuanica* (Gorski) Gorski (*G.aquatica* (L.) Wahlenb.) - Манник литовский. Реликт. Нередко, на заболоченных местах. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

1141. *G.plicata* (Fries) Fries = *G.notata* Chevall. - Манник складчатый. Изредка, по заболоченным местам. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

1142. *Helictotrichon adzhagicum* (Albov) Grossh. (*Avenastrum adzhagicum* (Albov) Roshev.) - Овсец аджарский. Часто, на альпийских и субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

1143. *H.pubesceus* (Huds.) Pilg. (*Avenastrum pubescens* (Huds.) Opiz) - Овсец пушистый. На субальпийских лугах, ст.Джуга, под Туровой крепостью. Верхн. (м.) (1-9,11).

1144. *Holcus lanatus* L. - Бухарник шерстистый. Нередко, по сухим склонам, остепненным лесным полянам. Нижн. (к.) (1,2,3). Бор.-евр.

1145. *Koeleria albovii* Domin (*K.buschiana* (Domin) Gontsch., *K.caucasica* (Domin) V.Fedtsch., *K.fominii* (Domin) Gontsch.) - Тонконог Альбова. Эндем. На альпийских лугах. Редко. Ст.Джуга, Челепсинский хребет. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-м.аз.

1146. *K.gracilis* Pers. = *K.cristata* (L.) Pers. - Тонконог стройный. На каменистых и скалистых местах альпийского и субальпийского поясов. Редко. Пастбище Лагонаки, г.Ятыргварта, Азишский перевал. Верхн. (петр.) (1-9,11).

1147. *K. luerssenii* (Domin) Domin (*K. monantha* Domin) - Тонконог Люерсена. Эндем. Изредка, на степных полянах, галечниках альпийского пояса, г. Ачешбок, Оштен, пастбище Лагонаки. До верхн. (к.с.) (1-9).

1148. *K. nitidula* Velen. = *K. grossheimiana* (Tzvel.) Galushko - Тонконог лоснящийся. Нередко, в сосняках и дубовых редколесьях, на скалах, обнажениях горных пород, на луговых каменистых полянах. До верхн. (к.с.) (1,2,5,6). Ксер.-средиз.

1149. *Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur (*Deschampsia flexuosa* (L.) Nees.) = *Avenella flexuosa* L. Drej. - Луговик извилистый. Часто, в светлых лесах и на полянах. На альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. пределе леса. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.

1150. *Lolium perenne* L. (*L. marschallii* Stev.) - Плевел многолетний. В субальпийском поясе. Редко. Верхн. (м.) (1-9).

1151. *Melica nutans* L. - Перловник поникающий. Редко, в лесах, по берегам рек, каменикам. Верхняя граница леса. Верхн. пр.л. (м.) (1-7). Бор.-палеар.

1152. *M. picta* C. Koch - Перловник пестрый. Отмечен на обочине тропы на г. Айбга в грабовом лесу. До средн. (м.) (8). Степн.-понт.

1153. *M. transilvanica* Schur (*M. ciliata* L.) - Перловник трансильванский. Часто, на каменистых склонах, остепненных полянах, галечниках. Средн. (к.с.-м.) (1-5). Ксер.-средиз.

1154. *M. uniflora* Retz. - Перловник одноцветковый. Редко. В широколиственных лесах и по опушкам. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

1155. *Milium effusum* L. - Бор развесистый. Нередко, по берегам рек, в тенистых лесах. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1156. *M. schmidtianum* C. Koch - Бор Шмидта. Эндем. Реликт. По опушкам, в составе субальпийского высокоотравья, на субальпийских лугах. Ст. Джуга. До верхн. (м.) (1-9). Древн.-л.-колх.др.

1157. *Moelinia coerulea* (L.) Moench - Молиния голубая. Изредка, в дубняках, осинниках, на полянах. По увлажненным местам субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1158. *Nardus stricta* L. (*N. glabriculumis* Sakalo) - Белоус торчащий. Нередко, на полянах и опушках, на альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1159. *Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Beauv. - Острянка курчаволистная. Тисо-самшитовая роща, в самшитовых лесах, на опушках. До нижн. (м.) (10).

1160. *Paspalum paspaloides* (Michx.) Scribn. (*P. digitaria* Poir.) - Паспалум пальчатый. Тисо-самшитовая роща, сорняк, на опушках. Родина тропики. Нижн. (м.) (10). Адв.-адв.

1161. *Phleum alpinum* L. - Тимофеевка альпийская. Обычно, в составе луговых ассоциаций. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1162. *Ph. montanum* C.Koch - Тимофеевка горная. Нередко, на камнях, сухих склонах. На субальпийских лугах, изредка. До верхн. (Кс.-м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1163. *Ph. phleoides* (L.) Karst. - Тимофеевка степная. Часто, на луговых полянах. На сухих и каменистых местах субальпийского пояса. Ст. Джуга. Массив Оштен, на олуговевшей осыпи. До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1164. *Ph. pratense* L. - Тимофеевка луговая. Изредка, по луговому послелесным полянам. Редко, на субальпийских лугах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1165. *Phragmites communis* Trin. = *Ph. australis* (Cav.) Trin. ex Steud. - Тростник обыкновенный. Очень редко, отмечен на поляне в пос. Гузерипль, на зарастающем ручье. Нижн. (гигр.) (2). Бор.-голар.

1166. *Poa alpina* L. - Мятлик альпийский. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, обычно, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

1167. *P. angustifolia* L. - Мятлик узколистный. Изредка, на опушках, по луговым остепненным склонам. Средн. (кс.-м.) (1,2,5,6). Бор.- горн. - голар.

1168. *P. annua* L. - Мятлик однолетний. Изредка, как сорное у дорог и троп, на галечниках. Массив Фишт - Оштен, вблизи стоянок скота. Ст. Джуга. Средн. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.

1169. *P. caucasica* Trin. - Мятлик кавказский. Эндем. В альпийском поясе. Встречен на скалах лесного пояса, г. Фишт (Альпер, 1960). Верхн. (петр.) (11). Кавк.-кавк.

1170. *P. iberica* Fisch. et C.A. Mey. - Мятлик грузинский. Эндем. Часто на субальпийских лугах, а также в составе травянистого покрова березняков и луговых ассоциаций полян и субальпийского высокотравья. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1171. *P. longifolia* Trin. - Мятлик длиннолистный. Эндем. Часто, на альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга, доминирующий вид на склонах к р. Аспидная. Массив Фишт - Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

1172. *P. meyeri* Trin. ex Roshev. - Мятлик Мейера. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

1173. *P. nemoralis* L. - Мятлик боровой. Нередко, в дубовых и сосновых лесах, по опушкам. Изредка, на луговых полянах и

субальпийских лугах. Массив Оштен, на субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-голар.

1174. *P. palustris* L. - Мятлик болотный. Очень редко. По сырым лугам, опушкам лесов, по речным долинам, болотам. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.

1175. *P. pratensis* L. - Мятлик луговой. На субальпийских лугах. Массив Оштен, изредка, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

1176. *P. remota* Forsell. - Мятлик расставленный. Изредка, по сырым местам, в ольховых лесах. На влажных субальпийских лугах. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

1177. *P. supina* Schrad. - Мятлик низкий. На лугах альпийского и субальпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

1178. *P. tanfiljewii* Roshev. (*P. nemoralis* L.) - Мятлик Танфильева. Эндем. Собран в долине р.Пслух (3.08.1895, В.Липский). Средн. (м.) (8). Кавк.-кавк.

1179. *P. trivialis* L. - Мятлик обыкновенный. Изредка, по сырым луговым полянам, берегам рек. Нижн. (гигр.) (1,2,3,5,10). Бор.-палеар.

1180. *Secale kuprijanovii* Grossh. - Рожь Куприянова. Эндем. Реликт. В составе лесного и субальпийского высокогорья. Долина р.Мзымта (Энгельмановы поляны, уроч.Азмич). Бурынистая поляна. Средн., верхн. (м.) (6,8). Кавк.-кавк. О.

1181. *Sesleria anatolica* Deyl (*S. autumnalis* (Scop.) F.Schultz) = *S. alba* Smith - Сеслерия анатолийская. На каменистых склонах субальпийского пояса, редко. Тисо-самшитовая роща, на каменистых местах. До верхн. (петр.) (1-10).

1182. *Setaria glauca* (L.) Beauv. = *S. pumila* (Poir.) Schult.-Щетинник сизый. Нередко, как сорное по огородам, близ дорог. Нижн. (м.) (1,2,5,10). Адв.-адв.

1183. *S. viridis* (L.) Beauv. - Щетинник зеленый, нередко, как сорное у дорог, на галечниках. До средн. (м.) (1,2,3,5). Бор.-палеар.

1184. *Stipa pennata* L. (*S. joannis* Celak.) - Ковыль перистый. Редко, на сухих остепненных склонах преимущественно продольных речных долин (р.Умпырка, Закан). До средн. (кв.) (5). Степн.-сарм.

1185. *Trisetum flavescens* (L.) Beauv. - Трищетинник желтеющий. Изредка, по опушкам, в дубовых лесах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

1186. *T. pratense* Pers. - Трищетинник луговой. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

1187. *T. rigidum* (Bieb.) Roem. et Schult. - Трищетинник жес-

ткий. Изредка, на каменистых местах лесного пояса. На щебнистых субальпийских лугах. Редко, гг.Оштен, Закан. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1188. *T.spicatum* (L.) K.Richt. - Трищети́нник колосистый. На осыпях и скалах альпийского пояса. Редко, гг.Фишт, Оштен, ст.Джуга. Верхн. (петр.) (1-9,11).

1189. *T.transcaucasicum* Seredin (*T.distichophyllum* auct.). - Трищети́нник закавказский. На осыпях и скалистых местах альпийского пояса. Очень редко, г.Фишт. Верхн.(петр.)(11). Кавк.-кавк.

Сем. Polemoneaceae Juss. - Синюховые

1190. *Polemonium caucasicum* N.Busch. - Синюха кавказская. Эндем. Повсеместно в составе высокотравных полей, на субальпийских лугах. Ст.Джуга, около метеостанции, у границы леса. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

Сем. Polygalaceae R.Br. - Истодовые

1191. *Polygala alpicola* Rupr. - Истод альпийский. Нередко, на лесных полянах, по щебнистым склонам верхнего предела леса. На альпийских и субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1192. *P.amoenissima* Tamamsch. - Истод прелестнейший. Эндем. Массив Фишт - Оштен, изредка на субальпийских лугах. Ниже домика на поляне Бурьянистая. В лесном поясе, на щебнистой выгравной поляне выше тропы (Семагина, 1989). Верхн. (кс.-м.) (6,11). Ксер. - вост.- средиз.

1193. *P.anatolica* Boiss. et Heldr. - Истод анатолийский. Часто, в светлых лесах, по опушкам и полянам. На субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, часто на альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Ксер.-п.аз.

1194. *P.caucasica* Rupr. - Истод кавказский. В верхнем лесном и субальпийском поясе, на лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1195. *P.comosa* Schkuhr - Истод хохлатый. Редко, на полянах и в кустарниках. Известен из окрестностей пос.Красная Поляна. На субальпийских лугах. Редко, гг.Чугуш, Пшекиш. Средн., верхн. (м.) (8). Бор.-палеар.

Сем. Polygonaceae Juss. Гречишные

1196. *Fagopyrum esculentum* Moench. (*F.sagittatum* Gilib.) - Гречи́ха съедобная. Очень редко, в лесном поясе (пос.Гузери́пль). Нижн. (м.) (2).

1197. *Oxyria elatior* R.Br. ex Meissn. = *O. digyna* (L.) Hill - Кисличник высокий. Обычно, на галечниках, моренах, в руслах рек, на осыпях альпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, в альпийском поясе, на осыпях. До верхн. (гигр.-м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1198. *Polygonum alpinum* All. = *Aconogonon alpinum* (All.) Schur. - Горец альпийский. Часто, по опушкам, на лугах, скалах и каменистых местах верхнего предела леса, а также на скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1199. *P. aviculare* L. (*P. heterophyllum* (Lindm.) Aschers.) - Горец птичий. Изредка, на вырубках, по берегам рек. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1200. *P. carneum* C.Koch (*Bistorta carnea* (C.Koch) Kom.) - Горец мясокрасный. Часто, на открытых местах, по опушкам, на осыпях верхнего предела леса. На альпийских и субальпийских лугах, повсеместно. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1201. *P. convolvulus* L. = *Fallopia convolvulus* (L.) A.Love - Горец вьющийся. Изредка, на скалистых отложениях, по берегам рек, на осыпях. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1202. *P. dumetorum* L. = *Fallopia dumetorum* (L.) Holub - Горец кустарниковый. Очень редко, в лесном поясе (долина р. Желобная). Нижн. (м.) (2). Бор.-палеар.

1203. *P. hydropiper* L. = *Persicaria hydropiper* (L.) Spach. - Горец перечный. Изредка, по берегам рек, полянам и вырубкам. Нижн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1204. *P. lapathifolium* L. = *Persicaria lapathifolia* (L.) S.F.Gray - Горец щавелелистный. Редко, в лесах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1205. *P. minus* Huds. = *Persicaria minor* (Huds.) Opiz. - Горец малый. Редко, в лесу, по террасам рек. Нижн. (м.) (8,9). Бор.-палеар.

1206. *P. persicaria* L. = *Persicaria maculata* (Rafin.) A. et D.Love - Горец почечуйный. Редко, на полянах, вырубках, по заболоченным берегам рек. До средн. (гигр.-м.) (1-10). Бор.-палеар.

1207. *P. viviparum* L. = *Bistorta vivipara* (L.) S.F.Gray - Горец живородящий. Часто, на опушках, обнажениях горных пород, осыпях, под пологом леса. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.

1208. *Rumex acetosa* L. - Щавель кислый. Нередко, на поселенных полянах и в полосе верхнего предела леса. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1209. *R. acetosella* L. - Щавель воробьиный. На щебнистых местах субальпийского пояса, редко, в т.ч. на г.Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

1210. *R. acetoselloides* Bal. (*R. arifolius* All.) - Щавель щавельковидный. На субальпийских лугах, изредка. Верхн. (м.) (1-9).

1211. *R. alpestris* Jacq. (*Acetosa alpestris* (Jacq.) A.Love - Щавель приальпийский. На лугах и луговых полянах лесного пояса. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1212. *R. alpinus* L. - Щавель альпийский. Нередко, на влажных лугах альпийского и субальпийского поясов. Образует заросли близ стоянок скота. Верхн. (м.) (1-9,11).

1213. *R. conglomeratus* Murr. - Щавель клубковатый. Редко, на сырых местах (долина р.Желобная). Нижн. (гигр.-м.) (2,10). Бор.-голар.

1214. *R. crispus* L. - Щавель курчавый. Очень редко, отмечен в пос.Гузерибль. Нижн. (м.) (2). Бор.-палеар.

1215. *R. obtusifolius* L. - Щавель туполистный. Изредка, на пойменных лугах, по луговым склонам. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1216. *R. scutatus* L. - Щавель щитковидный. На осыпях альпийского пояса. Верхн. (петр.)(1-9).

Сем. Polypodiaceae Bercht. et J.Presl -

Настоящие папоротники

1217. *Polypodium australe* Fee (*P. serratum* (Willd.) Saut.) - Многоножка южная. Тисо-самшитовая роща, повсеместно. Часто, как эпифит на деревьях. Нижн. (м.) (10).

1218. *P. vulgare* L. - Многоножка обыкновенная. В лесах, по берегам рек, на затененных скалах, камнях. До верхн. (петр.) (1-9). Бор.-голар.

Сем. Potamogetonaceae Dumort. - Рдестовые.

1219. *Potamogeton alpinus* Valb. - Рдест альпийский. В стоячих водоемах субальпийского пояса. Очень редко г.Гузерибль, на дне озера, 1800-1900м н.ур.м. (Васильева, 1935). До верхн. (петр.) (1-9). Бор.-голар.

1220. *P. berchtoldii* Fieb. (*P. pusillus* L.) - Рдест Берхтолди. Очень редко. Зарастающие водоемы. На сев.-зап. склоне г. Гузерибль (Лесков, Руссолев, 1929). На дне озера близ Гузерибльского перевала (Акатов, 1983). Верхн. (гигр.) (2).

1221. *P. praelongus* Wulf. - Рдест длиннейший. Г.Алоус на высоте 2000м н.ур.м. Очень редко, на дне озера. (Акатов, 1983) Верхн. (гигр.) (6).

1222. *P.pectinatus* L. - Рдест гребенчатый. Плато Лагонаки. Очень редко. Зарастающие водоемы (Акатов, 1983). Западный склон г.Гузерибль, на дне водоема (Акатов, 1983).Верхн. (гигр.)(2,11).

Сем. Primulaceae Vent. - Первоцветные.

1223. *Androsace albana* Stev. - Проломник кавказский. Эндем. На лугах, осыпях и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.-горн.

1224. *A.barbulata* Ovcz.= *A. kozo-poljanskii* Ovcz. (*A.villosa* aust. р.р.) - Проломник бородчатый. На скалах, осыпях и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9). Бор.-голар.-горн.

1225. *Cyclamen vernum* Sweet (*C.caucasicum* Willd. ex Stev., *C.soum* Mill.) - Цикламен весенний. Эндем. Реликт. Редко, в лесном поясе. Массив Оштен, среди остатков сосняков в травянистом покрове. Тисо-самшитовая роща, преимущественно в самшитовых лесах. До верхн. (м.) (6,8,10,11). Кавк.-кавк. О.

1226. *Primula algida* Adams - Первоцвет холодный. На лугах, осыпях и скалах альпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, на альпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

1227. *P.amoena* Vieb. - Первоцвет прелестный. На лугах, осыпях, скалах и каменистых местах субнивального, альпийского и субальпийского поясов. Ст.Джуга. Массив Фишт - Оштен, широко распространен на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1228. *P.auriculata* Lam. - Первоцвет ушковатый. По берегам рек и ручьев, болотистым местам, у тающих снегов в альпийском поясе. Ст.Джуга. Верхн. (гигр.) (1-9). Ксер.- п.аз.-горн.

1229. *P.cordifolia* Rupr. - Первоцвет сердцелистный. Эндем. Тисо-самшитовая роща, редко. Нижн. (м.) (10). Кавк.-кавк.

1230. *P.komarovii* Losinsk. - Первоцвет Комарова. Тисо-самшитовая роща, в широколиственных лесах. Нижн. (м.) (10). Ксер. - таврич.

1231. *P.kuznetzovii* Fed. - Первоцвет Кузнецова. На лужайках, осыпях и скалах, в альпийском поясе. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1232. *P.macrocalyx* Bunge - Первоцвет крупночашечный. На субальпийских лугах, изредка. Верхн. (м.) (1-9). Ксер.- ц.аз.

1233. *P.meyeri* Rupr. - Первоцвет Мейера. Эндем. На осыпях, скалистых местах у снега. В альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9).

1234. *P.ruprechtii* Kusn. - Первоцвет Рупрехта. Эндем. На лугах и каменистых местах альпийского пояса. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1235. *P.sibthorpii* Hoffmsgg. - Первоцвет Сибторпа. Тисо-самшитовая роща, в смешанных лесах. Нижн. (м.) (10). Средиз.др.

1236. *P.vulgaris* Huds. = *P.acaulis* (L.) L. - Первоцвет обыкновенный. Реликт. Нередко, в лесах, по опушкам. До верхн. (м.) (1-10). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

1237. *P.woronowii* Losinsk. - Первоцвет Воронова. Эндем. Тисо-самшитовая роща, изредка под пологом широколиственных лесов. Нижн. (м.) (10). Кавк-Иберийск.

1238. *Sredinskya grandis* (Trautv.) Fed. - Срединская большая. Эндем. На влажных лугах и по берегам потоков альпийского пояса. Очень редко. Хр.Ачишхо, г.Аибга. Верхн.(гигр.) (3,8).Колх.-горн.О.

Сем. *Pyrolaceae* Dumort. - Грушанковые.

1239. *Moneses uniflora* (L.) A.Gray - Одноцветка крупноцветковая. Нередко, в хвойных лесах. Средн. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1240. *Pyrola chlorantha* Sw. - Грушанка зеленоватая. Изредка, в хвойных лесах. На осыпях субальпийского пояса. Очень редко, г.Ачешбок. Верхн. (петр.) (1). Бор.-евр.

1241. *P. media* Sw. - Грушанка средняя. Нередко, под пологом леса, по полянам, опушкам. Ст.Джуга. На субальпийских лугах, редко. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1242. *P.minor* L - Грушанка малая. Часто, под пологом леса, по осыпям и скалам. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1243. *P.rotundifolia* L. - Грушанка круглолистная. Изредка, в лесах, по опушкам и полянам. На субальпийских лугах, редко. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1244. *P.secunda* L. = *Orthilia obtusata* (Turcz.) Nara - Грушанка однообразная. Нередко, преимущественно в хвойных лесах, кустарниках, трещинах скал. Средн., верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.