

Сем. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые.

1245. *Aconitum anthora* L. = *A. confertiflorum* (DC.) Gayer -
Борец противоядный. На сухих субальпийских лугах массива
Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (11). Бор.-зап.палеар.

1246. *A. cymbulatum* (Schmalh.) Lipsky (*A. nasutum* Fisch. ex
Reichenb.) - Борец ладьевидный. Эндем. Очень редко, на лу-

гах и полянах лесного пояса. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (2,5). Кавк.-кавк.

1247. *A.nasutum* Fisch. ex Reichenb. - Борец носатый. Обychен под пологом леса и на открытых местах. На субальпийских лугах, часто. Ст.Джуга. Массив Фишт- Оштен, часто на высокоотравных субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1248. *A.orientale* Mill. - Борец восточный. Повсеместно, на лесных полянах в высокоотравье. На субальпийских лугах среди высокоотравья. Ст.Джуга. Средн., верхн. (м.) (1-9,11). Ксер.-п.аз.

1249. *A.pubiceps* (Rupr.) Trautv. = *A.nasutum* Fisch. ex Reichenb. - Аконит опушенный. Эндем. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1250. *Actaea spicata* L. - Воронец колосовидный. Реликт. Нередко, преимущественно в хвойных лесах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

1251. *Adonis aestivalis* L. - Адонис летний. Редко, при дорогах, у населенных пунктов. Нижн. (м.) (1). Ксер.-средиз.

1252. *Anemone caucasica* Willd. ex Rupr. = *Anemonoides caucasica* (Rupr.) Holub - Ветреница кавказская. Реликт. Часто по полянам и опушкам в лесном поясе. Обычно, на субальпийских лугах, в т.ч. на г.Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

1253. *A.fasciculata* L. = *Anemonastrum fasciculatum* (L.) Holub - Ветреница пучковатая. Часто, в составе луговых ассоциаций верхнего предела леса. На субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1254. *A.ranunculoides* L. = *Anemonoides ranunculoides* (L.) Holub - Ветреница лютичная. Изредка, на лесных полянах. Нижн., средн. (м.) (1-2). Бор.-евр.

1255. *A.speciosa* Adams ex G.Pritz. = *Anemonastrum speciosum* (Adams ex G.Pritz.) - Ветреница видная. Эндем. На альпийских лугах. верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1256. *Aquilegia olympica* Boiss. - Водосбор олимпийский. Часто в высокоотравье на полянах в лесном поясе. На субальпийских лугах, преимущественно на южном склоне Кавказского хребта. Верхн. (м.) (8,9,11). Кавк.-кавк.

1257. *Caltha polypetala* Hochst. - Калужница многолепестная. Часто, по берегам ручьев и рек, сырым ложбинам лесного пояса. В субальпийском и альпийском поясе по берегам ручьев. Верхн. (гигр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1258. *Clematis vitalba* L. - Ломонос виноградолистный. Не-

редко, в лесном поясе, по берегам рек, ручьев. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,10). Ксер.-средиз.

1259. *Delphinium caucasicum* С.А.Меу. - Живокость кавказская. Эндем. На осыпях и каменистых местах альпийского пояса. Очень редко, г.Мраморная, хр.Луганский. Верхн. (петр.) (7). Кавк.-кавк.

1260. *D.dasycarpum* Stev. ex DC. - Живокость опушенноподная. Эндем. Часто, на лугах и полянах, в составе крупнотравья лесного пояса. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1261. *D.fissum* Waldst. et Kit. = *D.pallasii* Nevski- Живокость расщепленная. Очень редко, в верховье р.Мзымта, по пойме среди высокотравья, на прирусловой террасе в значительном количестве. Верхн. (м.) (8). Кавк.-крым. О.

1262. *D.flexuosum* Vieb. - Живокость извилистая. Эндем. В субальпийском поясе. Очень редко. Древние морены Большого Уруштенского ледника. Верхн. (м.) (4). Кавк.-кавк.

1263. *D.linearilobum* (Trautv.) N.Busch - Живокость линейнолопастная. Эндем. Указан А.И.Лесковым (1932). Встречается очень редко на осыпях южных склонов хр.Ачешбок, г.Люб. Верхн. (петр.) (8). Ксер.-м.аз.

1264. *D.pyramidatum* Albov - Живокость пирамидальная. Эндем. На субальпийских лугах, очень редко. Район оз.Кардывач, Инпси, хр.Трю - Ятыргварта, ст.Джуга. Верхн. (м.) (6,8). Кавк.-колх.

1265. *D.schmalhauseni* Albov - Живокость Шмальгаузена. Эндем. Изредка, по полянам и опушкам в составе крупнотравья лесного пояса. На субальпийских лугах, редко. До верхн. (м.) (1-9). Древн.л.-колх.др.

1266. *D.speciosum* Vieb. - Живокость красивая. Эндем. На субальпийских лугах, на скалах, редко. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1267. *Ficaria calthifolia* Reichenb. (*F.ledebourii* Grossh. et Schischk.) - Чистяк калужницелистный. Часто, под пологом лиственных лесов, в кустарниках, по сырым местам. Нижн. (гигр.) (1-9) Бор.-евр.

1268. *F.verna* Huds. - Чистяк весенний. Тисо-самшитовая роща, изредка, на сырых местах, в грабовых и самшитовых лесах, преимущественно в нарушенных фитоценозах. На основной территории заповедника в бассейнах рек Ачипсе и Шахе. Верхн. (м.) (8,9,11). Бор.-евр.

1269. *Helleborus caucasicus* A.Br. - Зимовник кавказский. Реликт. Часто, на открытых местах и под пологом смешанных

и лиственных лесов. До средн. (м.) (1-10). Древн.л.-колх.др.

1270. *Pulsatilla albana* (Stev.) Bercht. et J.Presi - Прострел албанский. Эндем. На каменистых и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов, редко, г.Тхач, Оштен (приводится Н.А.Бушем, 1900) Верхн. (м.) (1,11). Кавк.-кавк.

1271. *P.aurea* (Somm. et Levier) Juz. - Прострел золотистый. Эндем. На лугах альпийского и субальпийского поясов, в зарослях кавказского рододендрона. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-горн.

1272. *P.violacea* Rupr. - Прострел фиолетовый. Эндем. На лугах и щебнистых местах альпийского и субальпийского поясов, ст.Джуга, Бурьянистый хребет. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

1273. *Ranunculus abchasicus* Freyn - Лютик абхазский. Эндем. На осыпях альпийского пояса. Очень редко, г.Б.Бамбак. Верхн. (петр.) (6). Кавк.-зап.кавк.

1274. *R.acutilobus* Ledeb. - Лютик остролопастный. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах, изредка. Массив Оштен, на границе верхнего предела леса и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1275. *R.ampelophyllus* Somm. et Levier = *R.cappadocicus* Willd. - Лютик виноградолистный. Эндем. Реликт. Обычно под пологом лиственных и темнохвойных лесов. До верхн. (м.) (1-10). Древн.л.-колх.др.

1276. *R.baidarae* Rupr. - Лютик байдарский. Эндем. На влажных лугах и болотах альпийского и субальпийского поясов, в зарослях кавказского рододендрона. Ст.Джуга. Массив Оштен, в субальпийском поясе, на влажных склонах. Верхн. (гигр.-м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1277. *R.balkharicus* N.Busch - Лютик балкарский. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко, пастбище Абаго. Верхн. (м.) (3). Кавк.-ц.закавк.

1278. *R.brachylobus* Boiss et Hohen. - Лютик коротколопастный. На альпийских лугах. Изредка в лесном крупнотравье, по опушкам. Верхн. (м.) (1-7). Ксер.-п.аз.

1279. *R.buhsei* Boiss. - Лютик Бузе. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Пастбище Абаго. Верхн. (м.) (3). Ксер.-п.аз.-горн.

1280. *R.caucasicus* Vieb. - Лютик кавказский. Реликт. Часто, на полянах, луговинах, заболоченных лугах лесного пояса. На субальпийских лугах. До верхн. (гигр.-м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1281. *R.crassifolius* (Rupr.) Grossh. - Лютик толстолистный. Эндем. На лугах и осыпях альпийского пояса. Очень редко,

- гг.Оштен, Мурзакау, пастбище Лагонаки. Собран А.И.Лесковым на г.Оштен. Верхн. (м.) (11). Кавк.-кавк.
1282. *R.grossheimii* Kolak. = *R.suukensis* N.Busch - Лютик Гроссгейма. Эндем. На скалистых местах альпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-9).
1283. *R.helenae* Albov - Лютик Елены. Эндем. Реликт. Часто, на щебнистых альпийских лужайках, близ тающего снега. Массив Фишт - Оштен, г. Гузерипль, хр.Аибга. Верхн. (гигр.-м.) (2,11). Кавк.-сев.колх.-горн.
1284. *R.lojkae* Somm. et Levier - Лютик Лойка. Эндем. В альпийском поясе, на каменистых местах. В верховьях р.Б. Лаба. Верхн. (кс.) (6).
1285. *R.oreophilus* Bieb. - Лютик горный. Изредка, на скалах верхнего предела леса. На альпийских и субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-7,11). Кавк.-кавк.
1286. *R.raddeanus* Regel - Лютик Радде. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-зап.кавк.
1287. *R.reptans* L. - Лютик ползучий. Обычен, на влажных местах, вдоль канав, ручьев, по сырым местам лесного пояса. Нижн. (гигр.) (1,2,3,5,6,10). Бор.-голар.
1288. *R.sommieri* Albov - Лютик Соммье. Эндем. Редко, по берегам рек в лесном поясе. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (3,11). Кавк.-колх.
1289. *R.trisectilis* Ovcz. - Лютик трехрассеченный. Эндем. На лугах в альпийском поясе. Верхн. (м.) (1-9).
1290. *Thalictrum alpinum* L. - Василистник альпийский. На каменистых местах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Бор.-голаркт.-альп.
1291. *Th.foetidum* L. - Василистник вонючий. Нередко, на известняковых обнажениях, скалах, скалистых берегах рек и каменистых склонах лесного и субальпийского поясов. Изредка на массиве Фишт - Оштен. Средн., верхн. (петр.) (1-9,11). Бор.-голар.
1292. *Th.minus* L. - Василистник малый. Обычен на луговых полянах, по опушкам и в кустарниках. Изредка на субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, на верхнем пределе леса. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Бор.-голар.
1293. *Th.triternatum* Rupr. - Василистник триждытройчатый. Эндем. Реликт. Нередко, по опушкам, открытым склонам, на скалах лесного пояса. На скалах и осыпях альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.
1294. *Trollius ranunculinus* (Smith) Stearn (*T.patulus* Salisb.)

- Купальница полуоткрытая. Нередко, на лугах верхнего предела леса. На влажных альпийских и субальпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн.(м.)(1-9,11). Кавк.-кавк.

Сем. Rhamnaceae Juss. - Крушиновые

1295. *Frangula alnus* Mill. - Крушина ольховидная. Повсеместно, в подлеске широколиственных лесов, по опушкам, в зарослях кустарников, у ручьев, единично. До верхн. (гигр.-м.) (1-10). Бор.-палеар.

1296. *Paliurus spina-christi* Mill. - Держи-дерево. Тисо-самшитовая роща, изредка по опушкам смешанных лесов. Нижн. (м.) (10).

1297. *Rhamnus cathartica* L. - Жостер слабительный. На каменистых и сухих склонах, среди кустарников, по опушкам. Найден в бассейне р.Цеце. До средн. (м.) (11). Бор.-палеар.

1298. *Rh.microcarpa* Boiss. - Жостер мелкоплодный. В трещинах скал лесного, альпийского и субальпийского поясов, спорадически. До верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-колх.

1299. *Rh.pallasii* Fisch. et С.А. Меу. - Жостер Палласа. По сухим и каменистым склонам, на вырубках. Собран на южном склоне хр.Герпегем. В заповеднике не известен, но вероятен. До средн.(кс.).Ксер.-п.аз.

Сем. Rosaceae Juss. - Розанные.

1300. *Agrimonia eupatoria* L. - Репейничек аптечный. Обычно, на лесных опушках, полянах, в светлых лесах. До средн. (м.) (1-10). Ксер.-м.аз.

1301. *A.pilosa* Ledeb. - Репейничек волосистый. Нередко, по опушкам, в кустарниках, по оврагам и полянам. Средн., верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1302. *Alchemilla abchasica* Bus. - Манжетка абхазская. Эндем. На щебнистых местах до альпийского пояса. В верховьях р.Мзымта. Средн., верхн. (петр.) (8). Кавк.-кавк.

1303. *A.acutiloba* Opiz - Манжетка остролопастная. Массив Фишт - Оштен, часто, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (11). Ксер.-м.аз.-кавк.

1304. *A.caucasica* Bus. - Манжетка кавказская. На альпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1305. *A.circassica* Juz. - Манжетка черкесская. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Пос.Аибга, пастбище Лагонаки. Верхн. (м.) (2,11). Кавк.-крым.

1306. *A.diversipes* Juz. - Манжетка разночашечковая. Эн-

дем. На высокогорных болотах. Очень редко, г.Б.Бамбак, ст. Джуга. Верхн. (гигр.) (6). Кавк.-м.аз.

1307. *A.dura* Bus. - Манжетка твердая. Эндем. Обычно, в местах хорошего увлажнения. На лугах и скалах альпийского пояса. Верхн. (гигр.) (1-9). Кавк.-колх.

1308. *A.elisabethae* Juz. - Манжетка Елизаветы. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Пастбище Абаго. Верхн. (м.) (3). Кавк.-евкавк.

1309. *A.epipsila* Juz. - Манжетка сверхголая. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Г.Б.Бамбак. Верхн. (м.) (6). Сев.-атропатанский..

1310. *A.erythropoda* Juz. - Манжетка крупночашечковая. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко, г.Б.Бамбак. Верхн. (м.) (6). Ксер.-м.аз.

1311. *A.insignis* Juz. - Манжетка замечательная. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко. Пастбище Абаго. Верхн. (м.) (3). Ксер.-м.аз.

1312. *A.oxysepala* Juz. = *A.persica* Rothm. - Манжетка острочашелистиковая. На скалах и каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-9,11). Ксер.-м.аз.-кавк.

1313. *A.pseudomollis* Juz. = *A.epidasys* Rothm. - Манжетка лжемягкая. Эндем. На субальпийских лугах. Очень редко, гг. Аибга, Тыбга. Верхн. (м.) (2,8).

1314. *A.retinervis* Bus. - Манжетка сетчатожилковая. На скалах и каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-9,11). Ксер.-м.аз.-кавк.

1315. *A.rigida* Bus. - Манжетка жесткая. На скалах и каменистых местах альпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-9). Кавк.-кавк.

1316. *A.sericata* Reichenb. ex Bus. - Манжетка шелковистая. Эндем. На каменистых местах в альпийском поясе. Верхн. (кс.) (1-9). Кавк.-м.аз.

1317. *A.sericea* Willd. - Манжетка шелковая. На скалах и щебнистых местах альпийского пояса. Верхн. (кс.) (1-9,11). Ксер.-м.аз.-кавк.

1318. *A.speciosa* Bus. - Манжетка видная. Эндем. На субальпийских лугах и по берегам ручьев. Очень редко. Г.Б. Бамбак (Н.П.Введенский, 1939). Верхн. (гигр.-м.) (6). Кавк.-кавк.

1319. *A.taurica* Juz. - Манжетка крымская. На альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

1320. *A.tredecimloba* Bus. - Манжетка тринадцатилостная. Эндем. По берегам речек, на лугах в субальпийском поясе. Верхн. (гигр.) (1-9).

1321. *A.valdehirsuta* Bus. - Манжетка жестковолосистая. Субальпийский луг. Очень редко, г.Б.Бамбак. Верхн. (м.) (6). Ксер.-м.аз.-кавк.

1322. *Amelanchier ovalis* Medik. - Ирга овальная. Реликт. Нередко, преимущественно на скалистых местообитаниях. Средн., верхн. (петр.) (1-9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

1323. *A.rotundifolia* (Lam.) Dum.-Cours. - Ирга круглолистная. На осыпях субальпийского пояса, г.Фишт, очень редко. Верхн. (петр.) (11). Ксер.-средиз.

1324. *Cerasus avium* (L.) Moench - Вишня птичья, черешня. Реликт. Повсеместно, в смешанно-широколиственных лесах, по шлейфам, берегам рек, в яворниках, единично и группами. Тисо-самшитовая роща. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

1325. *Comarum palustre* L. - Сабельник болотный. Очень редко. На низовых болотах и зарастающих озерах, гг.Ачишхо, Большая Чура, Кудо, Осоково-моховое болото на Луганском перевале (истоки р.Закан, бассейн р.Б.Лаба, Акатов, 1989). До верхн. (гигр.) (7,9). Бор.-голар.

1326. *Cotoneaster integerrimus* Medik. - Кизильник цельнокрайний. Повсеместно, преимущественно на каменистых участках лесного пояса. На скалах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9,11). Бор.-европ.

1327. *C.melanocarpus* Fisch. ex Blytt - Кизильник черноягодный. Спорадически на каменистых участках. Верхн. (петр.) (1-9). Бор.-палеар.

1328. *Crataegus curvisepala* Lindm. (*C.kyrtostyla* auct.) - Боярышник согнуточашелистикový. Редко, в дубовых лесах, по опушкам, берегам рек. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

1329. *C.microphylla* C.Koch - Боярышник мелколистный. В дубовых, смешанных лесах, по опушкам, редко. До средн. (м.) (1-10). Древн.л.-колх.др.

1330. *C.monogyna* Jacq. - Боярышник однопестичный. Часто, в дубовых лесах, по опушкам и полянам. До средн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

1331. *C.pentagyna* Waldst. et Kit. (*C.colchica* Grossh.) - Боярышник пятистолбиковый. Изредка, преимущественно в широколиственных лесах, в долинах рек. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Ксер.-п.аз.-средиз.

1332. *Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb. = *Pentaphylloides fruticosa* (L.) O.Schwarz - Курильский чай кустарниковый. Редко, на скалистых местах, в полосе верхнего предела леса, субальпийском поясе. В заповеднике впервые найден в 1956г. в верховье р.Трю. Верхн. (м.) (6). Бор.-голар.

1333. *Dryas caucasica* Juz. - Дриада кавказская. Эндем. На скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, часто на скалах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-евкавк.

1334. *Duchesnea indica*(Andr.) Focke. - Дюшесния индийская. Тисо-самшитовая роща. Занесено из Юго-Восточной Азии, чаще в нарушенных фитоценозах. Нижн. (м.) (10). Адв.-адв.

1335. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. - Лабазник вязолистный. Изредка, на пойменных лугах, по заболоченным местам, в высокоотравье. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

1336. *F.vulgaris* Moench (*F.hexapetala* Gilib.) - Лабазник обыкновенный. Часто на высокоотравных лугах и полянах лесного пояса. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1337. *Fragaria vesca* L. - Земляника лесная. Повсеместно, на открытых местах, на вырубках и полянах, под пологом светлых лесов, в т.ч. на г.Оштен в субальпийском пихтарнике. До верхн. (м.) (1-11). Бор.-голар.

1338. *F.viridis* (Duch.) Weston = *F.campestris* Stev. - Земляника зеленая. Редко, на освещенных местах. До средн. (м.) (1,2,5,10). Бор.-палеар.

1339. *Geum latilobum* Somm. et Levier - Гравилат широколопастный. Эндем. На субальпийских лугах, очень редко, г. Оштен. Н.М.Альбов (1895) указывает для истоков р.Мзымта. Верхн. (м.) (8,11). Кавк. - колх.

1340. *G.rivale* L. - Гравилат речной. Нередко, по опушкам, увлажненным местам, на болотах и у озер в лесном поясе. На влажных местах субальпийского пояса. На массиве Фишт - Оштен, на влажных местах в полосе верхнего предела леса. Средн., верхн. (гигр.) (1-9,11). Бор.-голар.

1341. *G.speciosum* Albov - Гравилат красивый. Эндем. Реликт. На лугах и известняковых скалах альпийского пояса, очень редко. Верхн. (м.) (1-9).Кавк.- сев.колх.-горн.

1342. *G.urbanum* L. - Гравилат городской. Часто, на лугах, лесных полянах, по опушкам, берегам рек. На субальпийских лугах, изредка. Тисо-самшитовая роща. Массив Оштен, на лесных опушках. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,10,11). Бор.-палеар.

1343. *Laurocerasus officinalis* M.Roem. - Лавровишня лекарственная. Реликт. В подлеске как чистые заросли, так и в смеси с другими кустарниками. Изредка в субальпийском поясе. Массив Фишт Оштен, обильна на верхнем пределе лесов. Тисо-самшитовая роща, часто. До верхн. (м.) (2,3,7,8,9,10,11). Древн.л.-колх.др.

1344. *Malus orientalis* Uglitzk. - Яблоня восточная. В широ-

колиственных лесах, единично и группами, образует древостой с грушей при зарастании полян. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1345. *Mespilus germanica* L. - Мушмула германская. Реликт. Нередко, в составе подлеска дубняков, по опушкам, в буковых лесах, единично. Нижн., средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Ксер.-п.аз.-средиз.др.

1346. *Padus avium* Mill. (*P.racemosa* (Lam.) Gilib.) - Черемуха обыкновенная. Нередко, по берегам рек, ручьев, по шлейфам в местах хорошего увлажнения. До верхн. (м.) (1-7). Бор.-палеар.

1347. *Potentilla adenophylla* Boiss. et Hohen. - Лапчатка железистолистная. Очень редко. Берег р.Уруштен, близ устья. Нижн. (м.) (6). Ксер.-п.аз.

1348. *P.agrimonioides* Vieb. - Лапчатка репейниковидная. Эндем. На лугах в субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9).

1349. *P.brachypetala* Fisch. et C.A.Mey. ex Lehm. - Лапчатка коротколепестная. Эндем. На скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Ст.Джуга. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк. - зап.кавк.-горн.

1350. *P.caucasica* Juz. - Лапчатка кавказская. На субальпийских лугах, изредка. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1351. *P.crantzii* (Crantz) G.Beck ex Fritsch - Лапчатка Кранца. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Оштен, часто на альпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-голар.

1352. *P.divina* Albov - Лапчатка чудесная. Эндем. На скалах альпийского пояса, г.Фишт. Верхн. (петр.) (11). Кавк. - колх.-горн.

1353. *P.elatior* Willd. ex Schlecht. - Лапчатка высокая. Реликт. Часто, на полянах, открытых склонах, среди высокотравья. До верхн. (м.) (1-9,11). Древн.л.-колх.др.

1354. *P.erecta* (L.) Raeusch. - Лапчатка прямостоящая. На субальпийских лугах. Ст.Джуга. До верхн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Бор.-палеар.

1355. *P.foliosa* Somm. et Levier ex R.Keller - Лапчатка облиственная. На скалистых местах от среднегорного до субальпийского пояса. Средн., верхн.(петр.) (1-9).

1356. *P.fruticosa* L. = *Pentaphylloides fruticosa* (L.) O.Schwarz - Лапчатка кустарниковая. На каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Очень редко. Массив Трю - Ятыргварта. Верхн. (петр.-м.) (1-9). Бор.-голар.

1357. *P.gelida* C. A. Mey. - Лапчатка холодная. На альпийс-

ких лугах, редко, г.Абаго, Ятыргварта, Трю. Верхн. (м.) (3,6). Ксер.-ц.аз.

1358. *P.impolita* Wahlenb. (*P.argentea* L.) - Лапчатка неблестящая. Нередко по опушкам и в светлых лесах, на травянистых склонах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

1359. *P.micrantha* Ramond ex DC. - Лапчатка мелкоцветковая. Реликт. Нередко, на полянах и под пологом широколиственных и хвойных лесов. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

1360. *P.nordmanniana* Ledeb. - Лапчатка Нордманна. Эндем. На лугах. Верховье р. М.Лаба, в альпийском поясе. Верхн. (м.) (6).

1361. *P.recta* L. - Лапчатка прямая. Нередко, в лесах, по полянам и освещенным склонам. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

1362. *P.reptans* L. - Лапчатка ползучая. Редко, на влажных лугах, полянах, у канав и ручьев. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1363. *P.ruprechtii* Boiss. - Лапчатка Рупрехта. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Очень редко. Массив Псеашха. Верхн. (м.) (7). Кавк.-кавк.горн.

1364. *P.svanetica* Siegfr. et R.Keller - Лапчатка сванетская. Эндем. Редко, на освещенных местах, вырубках. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.

1365. *Poterium polygamum* Waldst. et Kit. - Черноголовник многобрачный. Отмечен в пос.Гузерибль. Нижн. (м.) (2). Ксер.-средиз.

1366. *Prunus divaricata* Ledeb. - Слива растопыренная, алыча. Повсеместно, по лесным полянам, опушкам, открытым склонам. До средн. (м.) (1-10). Ксер.-средиз.

1367. *P.spinosa* L. - Слива колючая, терн. По лесным полянам и опушкам, в дубовых лесах, по балкам. До средн. (кс.м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

1368. *Pyracantha coccinea* (L.) M.Roem. - Пираканта красная. В дубовых лесах, южного склона, редко, преимущественно на известняках. До средн. (кс.-м.) (8,9). Ксер.-средиз.

1369. *Pyrus caucasica* Fed. (*P.communis* L., *P.balansae* auct.) - Груша кавказская. Под пологом широколиственных лесов, единично и группами, при зарастании полян. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Кавк.-кавк.

1370. *Rosa boissieri* Crep. - Роза Буасье. Редко, по опушкам и полянам. Отмечена на г.Атамажи. Верхн. (м.) (2). Кавк.-кавк.

1371. *R.caesia* Smith (*R.coriifolia* Fries) - Роза голубоватосерая. Редко, по опушкам и открытым местам. Отмечена у подножия г.Фишт (Альпер, 1960). Верхн. (м.) (3,11). Бор.-евр.

1372. *R. canina* L. - Роза собачья. Повсеместно по опушкам леса, среди кустарников, на открытых местах и под пологом светлых лесов. На скалах субальпийского пояса. Массив Фишт, в верховьях р.Белая, на обломках скал. До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1373. *R. corymbifera* Borkh. - Роза щитконосная. Обычно, по опушкам, полянам, открытым местам, оврагам, балкам, единично и группами. На субальпийских лугах, в т.ч. на массиве Фишт - Оштен, близ Черкесского перевала До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-евр.

1374. *R. dumalis* Bechst. - Роза терновая. Редко. Отмечена на г.Чура и хр.Ахцархва. Указана для Кавказского заповедника И.С.Косенко (1970). По лесным опушкам среди кустарников. До верхн. (м.) (3,6). Бор.-евр.

1375. *R. hirtissima* Lonasz. - Роза щенисто-волосистая. Эндем. Реликт. Редко, на скалистых участках. По сборам из Кавказского заповедника опубликована И.С.Косенко (1970), вид найден на хр.Джуга. Верхн. предел леса (м.) (2). Кавк.-колх.

1376. *R. mollis* Smith - Роза мягкая. Изредка, верхний предел леса. Гг.Фишт, Нагой-Кош, долина р.Алоус (Альпер, 1960). До верхн. (м.) (3,6,11). Бор.-евр.

1377. *R. pomifera* Herrm. = *R. villosa* L. - Роза яблочная. На скалах субальпийского пояса. Изредка. Верхн. (петр.) (1-9). Бор.-ср.евр.

1378. *R. pulverulenta* Bieb. (*R. glutinosa* auct.) - Роза припудренная. Изредка. На скалистых склонах лесного пояса (гг.Хуко, Б.Чура, хр.М.Балканы, у р.Челипсы - Альпер, 1960). На каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (3,6). Ксер.-средиз.

1379. *R. spinosissima* L. (*R. microcarpa* Bess.) = *R. pimpinellifolia* L. - Роза колючейшая. Обычна на скалистых местах (Альпер, 1960). На скалах субальпийского пояса. До верхн. (петр.) (2,3,4,6). Бор.-палеар.

1380. *R. tomentosa* Smith - Роза войлочная. Нередко, по каменистым местам, осыпям (Альпер, 1960). На скалах и осыпях субальпийского пояса. До верхн. (петр.) (3,7,8). Бор.-евр.

1381. *Rubus anatolicus* (Focke) Focke ex Hausskn. (*R. sanguineus* auct.) - Ежевика азиатская. По сухим склонам, в лесах, по опушкам, редко. Нижн. (м.) (1,2,3,5,9). Бор.-палеар.

1382. *R. buschii* Grossh. ex Sinjkova (*R. vulgaris* Arrhen.) - Малина Буша. Эндем. На каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (кс.-м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1383. *R.caesius* L. - Ежевика сизая. По оврагам, кустарникам, вырубкам, берегам рек, обрывам. Нижн. (м.) (1,2,3,5,9). Бор.-палеар.

1384. *R.candicans* Weihe - Ежевика белесоватая. Известна из района пос.Гузерибль. Нижн. (м.) (2). Бор.-евр.

1385. *R.caucasicus* Focke - Ежевика кавказская. Эндем. Повсеместно в лесах на вырубках, по опушкам. До верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-колх.

1386. *R.discernendus* Sudre - Ежевика различимая. Эндем. Редко, известна из района хр.Аибга. До средн. (м.) (8). Кавк.-колх.

1387. *R.hirtus* Waldst. et Kit. - Ежевика щетинистая. Повсеместно как подлесок в лесах, преимущественно темнохвойных и буковых. До средн. (м.) (1,2,3,5,6). Ксер.-средиз.

1388. *R.idaeus* L. - Малина обыкновенная. Повсеместно, по опушкам, полянам, вырубкам, в лесах. До верхн. (Кс.-м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1389. *R.saxatilis* L. - Ежевика каменистая, костяника. Спорадически, в лесах, по берегам рек, по скалам. На лугах в субальпийском и альпийском поясах, плато Лагонаки. До верхн. (м.) (2,7). Бор.-голар.

1390. *Sanguisorba officinalis* L. - Кровохлебка лекарственная. Изредка, по полянам, на влажных местах в лесном и субальпийском поясах. Собрана А.И.Лесковым на г.Фишт, субальпийский луг. До верхн. (гигр.) (1-11). Бор.-голар.

1391. *Sibbaldia parviflora* Willd. - Сиббальдия мелкоцветная. На альпийских лугах, в т.ч. на массиве Фишт - Оштен. Верхн. (психр.) (1-9,11). Ксер.-ц.аз.-горн.

1392. *S.semiglabra* С.А.Меу. - Сиббальдия полуголая. На альпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (петр.). Ксер.-п.аз.

1393. *Sorbus alбовii* Zinserl. - Рябина Альбова. Эндем. Очень редко, по опушкам и у границ леса. Известна из района массива Оштен (Армянский хребет) по сборам А.И.Лескова (Альпер, 1960), а также у пер.Псеашха, на гг.Абаго, Аибга. Верхн. (м.) (2,3,8,11). Кавк.-колх.

1394. *S.aucuparia* L. - Рябина обыкновенная. Повсеместно, в составе древостоев полосы верхнего предела леса, лавинного криволесья, по опушкам. На скалистых и каменистых местах субальпийского пояса, изредка, г.Фишт, на верхнем пределе леса. До верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1395. *S.caucasica* Zinserl. (*S.woronowii* Zinserl.) - Рябина кавказская. Эндем. На скалах субальпийского пояса, редко. Известна из района г.Фишт по сборам А.И.Лескова (Альпер,

1960), им же указан в книге «Флора СССР» т. IX (1939). Верхн. (петр.) (3,8,11). Кавк.-кавк.

1396. *S. colchica* Zinserl. - Рябина колхидская. Эндем. Редко, в лесах. Верховья рек Шахе и Мзымта (Косенко, 1970) Верхн. (м.) (8,9). Кавк.-колх.

1397. *S. graeca* (Spach) Lodd. ex Schauer - Рябина греческая. Нечасто, преимущественно по осыпям, скалам, сухим каменистым склонам лесного пояса, в т.ч. на г.Оштен. Верхн. (петр.) (3,4,11). Ксер.-средиз.

1398. *S. kusnetzovii* Zinserl. - Рябина Кузнецова. Эндем. Редко, на скалистых местах в лесном поясе. На скалах субальпийского пояса, редко. Массив Фишт - Оштен, изредка в виде маленького кустарника на скалах в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (3,6,7,11). Кавк.-кавк.

1399. *S. migarica* Zinserl. - Рябина мигарская. Эндем. Редко, на скалистых местах верхнего предела леса. Массив Фишт - Оштен, изредка в виде маленького кустарника на скалах в субальпийском поясе. Описана со склона г.Фишт, 1900м н.ур.м. Верхн. (м.) (3,11). Кавк.-кавк.

1400. *S. gooriana* Bordz. - Рябина двойственная. Очень редко, в лесах на скалистых участках. Известна в заповеднике с хр.Джуга. До верхн. (петр.) (2.). Кавк.-кавк.

1401. *S. subtomentosa* (Albov) Zinserl. = *S. buschiana* Zinserl. - Рябина полувойлочная. Белореченский перевал, на верхнем пределе леса. Верхн. (м.) (11). Кавк.-кавк.

1402. *S. torminalis* (L.) Crantz - Рябина глоговина, берека. Реликт. Повсеместно, в светлых (дубовых, сосновых) широколиственных лесах и по опушкам, единично или небольшими группами во II и III ярусах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Бор.-евр.

1403. *S. velutina* (Albov) Schneid. = *S. fedorovii* Zaikonn. - Рябина бархатистая. Эндем. Очень редко. Верховья р.Мзымта (Косенко, 1970), гг.Аишха, Аибга, верховья р.Б.Лаба (Зайконникова, 1974). Верхн. (м.) (7,8). Кавк.-колх.

1404. *Spiraea crenata* L. - Таволга городчатая. Эндем. На каменистых склонах, зарастающих осыпях, моренах. Ст.Джуга. До верхн. (петр.) (1-9). Степн.-сарм.

1405. *S. hypericifolia* L. - Таволга зверобоелистная. На скалах и открытых каменистых склонах. До верхн. (петр.) (1-10). Ксер.-ц.аз.

Сем. Rubiaceae Juss. - Мареновые

1406. *Asperula abchasica* V.Krecz. - Ясменник абхазский.

Эндем. На осыпях и скалах альпийского пояса. Очень редко, г.Оштен. Верхн. (петр.) (11).

1407. *A.alpina* Vieb. - Ясменник альпийский. На осыпях и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Редко, г.Гузерибль, Оштен, Фишт, хр.Агиге, ст.Джуга. Верхн. (петр.) (2,11).

1408. *A.bieberstenii* V.Krecz. - Ясменник Биберштейна. Эндем. На скалах, осыпях и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9).

1409. *A.caucasica* Pobed. (*A.taurina* auct. p.p.) - Ясменник кавказский. Часто, по опушкам, полянам, под пологом лиственных лесов. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1410. *A.cristata* (Somm. et Levier) V.Krecz. - Ясменник гребенчатый. Эндем. На скалах и осыпях альпийского пояса. Верхн. (1-9).

1411. *A.intersita* Klok. - Ясменник межеумочный. На скалах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9).

1412. *A.molluginoides* (Vieb.) Reichenb. - Ясменник моллюгообразный. Эндем. Редко, на сухих полянах лесного пояса и на субальпийских лугах. Верхн. (к.-м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1413. *A.prostrata* (Adams) S.Koch - Ясменник стелющийся. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Редко, г.Фишт, Оштен, Ачешбок. Верхн. (петр.) (11).

1414. *Galium anfractum* Somm. et Levier - Подмаренник извилистый. Эндем. На скалах в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9).

1415. *G.aparine* L. - Подмаренник цепкий. Нередко, на сорных местах, близ дорог и огородов. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

1416. *G.articulatum* Lam. = *G.rubioides* L. - Подмаренник членистый. Эндем. Изредка в широколиственных лесах, на опушках, открытых влажных местах. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

1417. *G.aureum* Vis. - Подмаренник золотистый. На лугах и осыпях субальпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (петр.) (1-9,11).

1418. *G.brachyphyllum* Roem. et Schult. - Подмаренник коротколистный. Эндем. На скалах альпийского и субальпийского поясов. Собран Н.П.Введенским на г.Оштен. Верхн. (петр.) (11).

1419. *G.calcareum* (Albov) Pobed. - Подмаренник известняковый. Эндем. На известняковых каменистых россыпях. Очень редко, г.Оштен. Верхн. (петр.) (11).

1420. *G. coronatum* Sibth. et Smith = *Cruciata coronata* (Sibth. et Smith) Ehrend. - Подмаренник венечный. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9).

1421. *G. cruciata* (L.) Scop. = *Cruciata laevipes* Opiz. - Подмаренник крестообразный. Часто, на полянах, южных травянистых склонах, в кустарниках. На скалах, осыпях и лугах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, на субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1422. *G. erectum* sensu Huds. (*G. album* Mill.) - Подмаренник прямостоячий. Собран Н.М.Альбовым на г.Оштен и Б.Гриневецким на г.Фишт. Верхн. (м.) (11).

1423. *G. mollugo* L. - Подмаренник мягкий. Изредка, на лугах, скалах и по осыпям в светлых лесах, вдоль дорог, по опушкам. На скалах и осыпях субальпийского пояса. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-голар.

1424. *G. odoratum* (L.) Scop. (*Asperula odorata* L.) - Подмаренник душистый. Реликт. Повсеместно, в буковых, буково-пихтовых и пихтовых лесах, под пологом леса. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-голар.

1425. *G. pseudorivale* Tzvel. (*Asperula aparine* Bieb. non. *Galium aparine* L.) - Подмаренник ложноприручевый. Редко, по опушкам в долинах рек, на полянах по влажным местам. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1426. *G. scabrum* L. = *G. rotundifolium* L. - Подмаренник шероховатый. Реликт. Довольно часто, преимущественно в пихтовых лесах. Средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1427. *G. spurium* L. - Подмаренник ложный. Редко, на сорных местах, в кустарниках. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

1428. *G. valantioides* Bieb. - Подмаренник валантиевидный. Эндем. На лугах и скалах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (м.) (1-9).

1429. *G. verticillatum* Danth. - Подмаренник мутовчатый. На субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9).

1430. *G. verum* L. - Подмаренник настоящий. Нередко, на остепненных травянистых склонах, по опушкам и полянам лесного пояса. На субальпийских лугах. До средн. (кс.)(1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

Сем. Ruscaceae Hutch. - Иглицевые

1431. *Ruscus colchicus* P.F.Yeo (*R. hypophyllum* auct.) - Иглица колхидская. Реликт. Под пологом пихтарников и букопихтарников. В верховье р.Белая, в тисо-самшитовой роще.

До верхн. (м.) (3,8,9,10). Древн.л.-средизем.др. О.

1432. *R.ponticus* (Woronow ex Grossh) = *R. aculeatus* L.- Иглица понтийская. Реликт. Входит в состав вечнозеленого подлеска колхидских лесов. Нижн. (м.) (10) Древн.л.-средизем.др.

Сем. Rutaceae Juss. - Рутовые.

1433. *Dictamnus caucasicus* (Fisch. et C.A. Mey.) Grossh. - Ясенец кавказский. Тисо-самшитовая роща, в смешанных лесах. Нижн. (м.) (10).