

Сем. Salicaceae Mirb. - Ивовые.

1434. *Populus alba* L. - Тополь белый. Отмечен только на Сенной поляне (1150м н.ур.м.), - по видимому занесен, т.к. естественный ареал на низменности. Тисо-самшитовая роща. Нижн. (м.) (4,10). Бор.-палеар.

1435. *P. nigra* L. = (*P. sosnowskyi* Grossh.) - Тополь черный. Отмечен лишь в районе кордона Черноречье и в устье р.Уруштен. Нижн. (м.) (5). Бор.-палеар.

1436. *P. tremula* L. - Тополь трепещущий, осина. Обычно образует вторичные древостои. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

1437. *Salix alba* L. - Ива белая. Довольно часто по берегам рек, на галечниковых отмелях. Нижн. (гигр.-м.) (1-9). Бор.-палеар.

1438. *S. apoda* Trautv. - Ива безногая. Эндем. На лугах, скалах и осыпях субальпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

1439. *S. arbuscula* L. - Ива древцевидная. На лугах и болотах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, часто, в альпийском поясе. Верхн. (гигр.- м.) (1-9,11).

1440. *S. caprea* L. - Ива козья. Обычно в лиственных, реже темнохвойных лесах, зарослях кустарников, на вырубках, в канавах стока лавин и на шлейфах по всему лесному поясу, единично и группами. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1441. *S. caucasica* Anderss. - Ива кавказская. Эндем. Довольно редко, по берегам рек и ручьев. На влажных лугах в лесном поясе и болотах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (гигр.) (1-9). Кавк.-кавк.

1442. *S. elbursensis* Boiss. (*S. roopi* (Goerz) Grossh.) - Ива эльбурская. Редко, спорадически, в руслах рек, ручьев, на галечниковых отмелях. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

1443. *S. hastata* L. - Ива копьевидная. На сырых лугах и болотах субальпийского пояса, в т.ч. на массиве Фишт- Оштен. Верхн. (гигр.-м.) (1-9,11).

1444. *S.kazbekensis* A.Skvorts. - Ива казбекская. На лугах и болотах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (гигр.) (1-9).

1445. *S.kuznetzowii* Laksch. ex Goerz - Ива Кузнецова. Эндем. Редко, рассеянно, в зарослях кустарников, по скалам, г.Дзювя. Верхн. (м.) (2). Кавк.-кавк.

1446. *S.pantosericca* Goerz - Ива шелковистая. Эндем. На лугах субальпийского пояса и в зарослях кавказского рододендрона. Верхн. (м.) (1-9).

#### Сем. Santalaceae R.Br. - Санталовые

1447. *Thesium alpinum* L. - Ленец альпийский. На лугах и скалах субальпийского пояса. Массив Оштен, встречен на щебнистом субальпийском лугу. Верхн. (петр.) (1-9,11).

1448. *Th.procumbens* C.A.Mey. - Ленец простертый. Эндем. На щебнистых и каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

1449. *Th.ramosum* Hayne = *Th.arvense* Horvatovszky - Ленец ветвистый. На субальпийских лугах, изредка. Массив Фишт - Оштен, на каменистых местах. Верхн. (петр.) (1-9,11).

#### Сем. Saxifragaceae Juss. - Камнеломковые.

1450. *Chrysosplenium alternifolium* L. - Селезеночник обыкновенный. Обычно, под пологом леса, в сырых местах, у ручьев. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.

1451. *Ch.dubium* J.Gay ex Ser. - Селезеночник сомнительный. Реликт. Обычно, в тенистых лесах, на сырых местах. До средн. (гигр.) (1-9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

1452. *Saxifraga adscendens* L. - Камнеломка ходящая. На скалах и осыпях альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9,11). Ксер.-атлант.-средиз.

1453. *S.cartilaginea* Willd. - Камнеломка хрящеватая. Повсеместно, под пологом леса, на скалах, осыпях, обнажениях горных пород. На скалах и каменистых местах альпийского и субальпийского поясов, в т.ч. на массиве Фишт - Оштен. Средн., Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1454. *S.colchica* Albov - Камнеломка колхидская. Эндем. На скалах альпийского пояса. Очень редко, г.Джуга. Район оз. Кардывач. Верхн. (петр.) (6,8). Кавк.-зап.кавк.

1455. *S.coriifolia* (Somm. et Levier) Grossh. = *S.repanda* Willd. ex Sternb. - Камнеломка кожистолистная. На скалах субальпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, на скалах альпийского, субальпийского и лесного поясов. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-колх.

1456. *S. cymbalaria* L. (*S. huetiana* auct.) - Камнеломка кимвальная. Реликт. На влажных скалах лесного и субальпийского поясов. Массив Фишт, на влажных скалах лесного пояса. До верхн. (петр.) (1-11). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

1457. *S. exarata* Vill. - Камнеломка рыхлая. Эндем. На влажных скалах субальпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9).

1458. *S. flagellaris* Willd. ex Sternb. - Камнеломка усатая. На скалах и осыпях альпийского и субнивального поясов. Верхн. (петр.) (1-9). Бор.-вост.палеар., аркт.-альп.

1459. *S. juniperifolia* Adams - Камнеломка можжевельниковая. Эндем. На скалах альпийского пояса. Редко, гг.Бамбак, Ятыргварта, хр.Балканы. Верхн. (петр.) (5,6). Кавк.-кавк.

1460. *S. kolenatiana* Regel - Камнеломка Коленати. На скалах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

1461. *S. moschata* Wulf. - Камнеломка мускусная. На скалах и осыпях альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9,11). Бор.-евр. горн.

1462. *S. pontica* Albov - Камнеломка понтийская. Эндем. В альпийском поясе, на скалах. (1-9,11).

1463. *S. repanda* Willd. ex Sternb. (*S. coriifolia* (Somm. et Levier) Grossh.) - Камнеломка широковыемчатая. Реликт. Повсеместно на влажных местах, в тени. До верхн. (гигр.) (1-9). Древн.-л.-колх.др.

1464. *S. scleropoda* Somm. et Levier - Камнеломка твердоногая. Эндем. Нередко, на скалах верхнего предела леса. На скалах альпийского пояса. На скалах г.Оштен собрана А.Н. Васильевой. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1465. *S. sibirica* L. (*S. mollis* Smith) - Камнеломка сибирская. На каменистых и щебнистых местах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

1466. *S. tridactylites* L. - Камнеломка трехпалая. На каменистых местах субальпийского пояса. Верхн.(петр.)(1-9).

Сем. Scrophulariaceae Juss. - Норичниковые.

1467. *Digitalis ciliata* Trautv. - Наперстянка реснитчатая. Эндем. На скалах. В верхнем лесном и субальпийском поясах. Верхн. (петр.) (1-9).

1468. *D. ferruginea* L. - Наперстянка ржавая. Реликт. Нередко, на открытых местах, полянах лесного пояса. На субальпийских лугах. Средн., верхн. (1-10). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

1469. *D. grandiflora* Mill. - Наперстянка крупноцветковая. Редко, в светлых лесах, по опушкам, вырубкам полянам. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

1470. *Euphrasia alboffii* Chabert - Очанка Альбова. Эндем. На субальпийских и альпийских лугах Верхн. (м.) (1-9).

1471. *E. amblyodonta* Juz. - Очанка тупозубая. Эндем. На каменистых местах альпийского пояса. Очень редко, г. Ачешбок, Ятыргварта. Верхн. (м.) (1,6). Кавк.-кавк.

1472. *E. hirtella* Jord. ex Reut. - Очанка волосистая. На субальпийских лугах, в т.ч. на г. Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11).

1473. *E. macrodonta* Juz. - Очанка крупнозубая. На лугах и каменистых местах субальпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9).

1474. *E. petiolaris* Wettst. - Очанка черешковая. На альпийских и субальпийских щебнистых лугах. Верхн. (петр.) (1-9,11).

1475. *E. tatarica* Fisch. ex Spreng. = *E. pectinata* Ten - Очанка татарская. Редко, на послелесных полянах, в долинах рек лесного пояса. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1476. *Lathraea squamaria* L. - Петров крест чешуйчатый. Часто, в тенистых лесах, в тисо-самшитовой роще, паразитирует на корнях древесных растений. До средн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

1477. *Linaria genistifolia* (L.) Mill. - Льянка дроколистная. На осыпях субальпийского пояса. Редко. Верхн. (петр.) (1-9). Колх.-кавк.

1478. *L. pontica* Kuprian. - Льянка понтийская. Эндем. Редко, по каменистым склонам, берегам рек. До средн. (к.) (1,2,3,5,6,8,9). Степн.-сарм.

1479. *L. vulgaris* L. - Льянка обыкновенная. Изредка, на полянах и вырубках, галечниках и в светлых лесах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1480. *Melampyrum arvense* L. - Марьянник полевой. Обычное, в лиственных лесах, на полянах. Массив Фишт - Оштен, на сухих склонах верхней полосы леса. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10,11). Бор.-евр.

1481. *M. caucasicum* Bunge - Марьянник кавказский. Эндем. Нередко, в лесах и кустарниках, по сухим склонам. На субальпийских лугах, в т.ч. на сухих субальпийских лугах массива Оштен. До верхн. (к.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1482. *Odontites vulgaris* Moench (*O. serotina* (Lam.) Dumort.) - Зубчатка обыкновенная. Редко, как сорное. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1483. *Paederotella pontica* (Rupr. ex Boiss.) Kem.-Nath. (*V. ruprechtii* Lipsky) - Педеротелла понтийская. Эндем. Реликт. Преимущественно альпийское и субальпийское скальное рас-

тение. Собрана А.И.Лесковым на г.Фишт, Н.П.Введенским на г.Оштен. В лесном поясе встречено в ущелье Коробочка, на скальном склоне 30.05.1935, берег р.Киши, скалы около Сенной поляны 3.06.1935. Бассейн р.Алоус, в елово-пихтовом лесу (Буш, 1900) До верхн. (петр.) (2,4,6,11). Древн.л.-колх.др.

1484. *Pedicularis acmodonta* Boiss. - Мытник острозубый. Редко, на лесных лугах, по берегам рек. До средн. (м.) (1-9). Ксер.-п.аз.

1485. *P.atropurpurea* Nordm. - Мытник чернопурпуровый. Нередко в составе высокотравных лугов верхнего предела леса. На субальпийских лугах среди высокотравья. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1486. *P.caucasica* Bieb. - Мытник кавказский. Эндем. На лугах, осыпях и каменистых местах альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-м.аз.

1487. *P.chroorrhyncha* Vved. - Мытник окрашенноклювый. Эндем. На лугах и щебнистых местах альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-горн.

1488. *P.condensata* Bieb. - Мытник сжатый. На альпийских и субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

1489. *P.crassirostris* Bunge - Мытник толстоносый. Эндем. На влажных лугах. В субальпийском и альпийском поясах. Верхн. (м.) (1-9).

1490. *P.nordmanniana* Bunge - Мытник Нордманна. На влажных альпийских лугах. Верхн. (гигр.-м.) (1-9,11). Кавк.-колх.-горн.

1491. *P.panjutinii* E.Busch - Мытник Панютина. Эндем. На лугах альпийского пояса. Редко, г.Агепста, Лугань, хр.Аспидный. Верхн. (м.) (7,8). Кавк.-кавк.

1492. *P.pontica* Boiss. - Мытник понтийский. На лугах и осыпях в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9).

1493. *P.sibthorpii* Boiss. - Мытник Сибторпа. На субальпийских и альпийских лугах. Обычно. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Ксер.- средиз.-горн.

1494. *P.subrostrata* С.А.Мей. - Мытник почтиноносатый. Эндем. На влажных лугах в альпийском поясе. Верхн. (гигр.) (1-9).

1495. *P.tatianaе* Bordz. - Мытник Татьяны. Эндем. На альпийских и субальпийских лугах. Редко, г.Б.Бамбак, массив Трю - Ятыгварта. Верхн. (м.) (6).

1496. *P.wilhelmsiana* Fisch. ex Bieb. - Мытник Вильгельма.

Нередко, у верхнего предела леса. На субальпийских иногда альпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1497. *Rhinanthus aestivalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg. - Погремок летний. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1498. *R.alectorolophus* (Scop.) Poll. (*R.major* L.) - Погремок большой. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1499. *R.colchicus* Vass. - Погремок колхидский. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

1500. *R.minor* L - Погремок малый. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-евр.

1501. *R.serotinus* (Schoenh.) Oborny - Погремок поздний. Нередко, в светлых лесах, на полянах и опушках. Верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1502. *Rhynchocorys elephas* (L.) Griseb. - Хоботник слоновый. На субальпийских лугах, в т.ч. на г.Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Ксер. - средиз.др.

1503. *Rh.orientalis* (L.) Benth. - Хоботник восточный. Эндем. Довольно часто, на лесных лугах, в кустарниках. На влажных местах субальпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1504. *Rh.stricta* (C.Koch) Albov - Хоботник прямостоячий. Эндем. На субальпийских лугах, в т.ч. на г.Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Колх.-гирк.

1505. *Scrophularia alata* Gilib. = *S.umbrosa* Dumort - Норичник крылатый. На субальпийских лугах. Редко, г.Оштен. Верхн. (м.) (1-9,11). Евр.-палеар.

1506. *S.chrysantha* Jaub. et Spach (*S.lunariifolia* Boiss. et Bal.) - Норичник золотистоцветковый. На скалах субальпийского пояса, редко. Массив Оштен, на скалах верхнего предела леса. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк. - арм.

1507. *S.divaricata* Ledeb. - Норичник растопыренный. В зарослях кавказского рододендрона, очень редко, г.Чугуш. Изредка по полянам и опушкам лесного пояса. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1508. *S.nodosa* L. - Норичник узловатый. Изредка по берегам ручьев на лесных полянах. На субальпийских лугах, редко. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1509. *S.orientalis* L. - Норичник восточный. На субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9). Кавк. - арм.-горн.

1510. *S.olympica* Boiss. - Норичник олимпийский. На скалах альпийского и субальпийского поясов. Массив Фишт - Оштен, на осыпях в субальпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

1511. *S.ruprechtii* Boiss. - Норичник Рупрехта. Эндем. На осыпях и скалах субальпийского пояса. Массив Оштен, изредка на осыпях в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-евкавк.

1512. *S.scopolii* Hoppe ex Pers. - Норичник Скополи. Нередко, в широколиственных и хвойных лесах, по опушкам, на вырубках. На субальпийских лугах, среди субальпийского высокоотравья. До верхн. (м.) (1-9). Тип ареала не установлен.

1513. *S.umbrosa* Dumort. - Норичник теневой. Редко, на увлажненных местах, по берегам рек, лесным опушкам. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1514. *S.variegata* Vieb. - Норичник пестрый. Редко, на каменистых местах, по галечникам и скалам лесного пояса. На скалах и каменистых местах субальпийского пояса. До верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

1515. *Verbascum blattaria* L. - Коровяк тараканий. Изредка, на лесных полянах, у дорог и в огородах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1516. *V.orientale* (L.) All. - Коровяк восточный. На щебнистых субальпийских лугах, изредка. Верхн. (петр.) (1-9,11). Степн. - понт.-сарм.

1517. *V.pyramidatum* Vieb. - Коровяк пирамидальный. На субальпийских лугах, изредка. Массив Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

1518. *V.thapsus* L. - Коровяк обыкновенный. Изредка, в лесах, по южным сухим склонам, на галечниках, по берегам рек. Нижн., средн. (кс.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1519. *Veronica anagallis-aquatica* L. - Вероника ключевая. По берегам ручьев субальпийского пояса. Очень редко, хр.Ачишо. Верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.

1520. *V.arvensis* L. - Вероника полевая. Редко, у дорог, на сорных местах. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-евр.

1521. *V.beccabunga* L. - Вероника поточная. Изредка, на вырубках, по берегам рек, у ручьев во влажных лесах. До средн. (гигр.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-голар.

1522. *V.caucasica* Vieb. - Вероника кавказская. Эндем. На скалах и осыпях. От нижнего до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9) Кавк.-кавк.

1523. *V.chamaedrys* L. - Вероника дубравная. Часто, по опушкам, южным освещенным склонам, в светлых лесах. На субальпийских лугах у границы леса, ст.Джуга. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

1524. *V.filiformis* Smith - Вероника нитевидная. Реликт. Ча-

сто, на полянах и увлажненных местах лесного пояса. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Оштен, изредка на высокоотравных лугах. До верхн. (гигр.) (1-9,11). Древн.л.-колх.др.

1525. *V.gentianoides* Vahl - Вероника горечавковидная. Нередко, на высокоотравных лесных полянах. На альпийских и субальпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

1526. *V.magna* M.Fisch (*V.melissifolia* auct.) - Вероника крупная. Реликт. Изредка, в широколиственных светлых лесах, на полянах и вырубках. Средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Древн.л.-колх.др.

1527. *V.minuta* C.A.Mey. (*V.telephiifolia* Vahl) - Вероника мелкая. Эндем. На осыпях альпийского пояса. Верхн. (петр.) (1-9). Кавк.-кавк.

1528. *V.monticola* Trautv. - Вероника высокогорная. Эндем. На скалах, каменистых руслах ручьев альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.- колх.-горн.

1529. *V.officinalis* L. - Вероника лекарственная. Нередко, в светлых лесах. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

1530. *V.peduncularis* Bieb. - Вероника цветоножковая. Нередко, на скалах, осыпях, галечниках, по берегам рек. Изредка, на осыпях субальпийского пояса, редко, г.Оштен. Верхн., средн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1531. *V.propinqua* Boriss. - Вероника близкая. На лугах и осыпях в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9).

1532. *V.schistosa* E.Busch - Вероника щербистая. Эндем. На осыпях в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9).

1533. *V.serpyllifolia* L. - Вероника тимьянолистная. Изредка, на сырых и каменистых местах лесного и субальпийского пояса, редко. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-голар.

1534. *V.umbrosa* Bieb. - Вероника теневая. Эндем. Реликт. Редко, в тенистых лесах, район кордона Лагерный, тисо-самшитовая роща. До средн. (м.) (2,10). Древн.л.-колх.др.

#### Сем. Selaginellaceae Willk. - Плауновые

1535. *Selaginella helvetica* (L.) Spring - Плаунок швейцарский. Очень редко в лесах на замшелых скалах, в сырых ущельях. До средн. (гигр.-м.) (2). Бор.-палеар.

1536. *S.selaginoides* (L.) C. Mart. - Плаунок плауновидный. На лугах и осыпях альпийского пояса. Собран Л.Н.Васильевой на г.Оштен, альпийский луг. Верхн. (петр.) (1-9,11).

Сем. Sinopteridaceae Koidz. (Cheilantaceae V.K.Nayar) -  
Ложнопокровницевые

1537. *Notholaena marantae* (L.) Desv. (*Cheilanthes marantae* (L.) Domin) - Ложнопокровница марантовая. Очень редко, в трещинах скал. До верхн. (петр.) (1-9). Ксер.-средиз.

Сем. Smilacaceae Vent. - Сасапарилевые

1538. *Smilax excelsa* L. - Сасапариль высокий, павой. Реликт. Тисо-самшитовая роща. Оплетает опушки леса, образует непроходимые заросли. Нижн. (м.) (10).

Сем. Solanaceae Juss. - Пасленовые.

1539. *Atropa caucasica* Kreyer - Красавка кавказская. Эндем. Реликт. Изредка, у дорог, на лесосеках, берегах рек. Тисо-самшитовая роща, редко, в широколиственных лесах по ущелью р.Хоста. Нижн. (м.) (2,3,10). Древн.л.-колх.др. О.

1540. *Nyoscyamus niger* L. - Белена черная. Редко, у жилищ, дорог, на огородах как сорное. нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Бор.-палеар.

1541. *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn. - Никандра физалиевидная. Редко, сорное растение. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Адв. Родина Южная Америка.

1542. *Physalis alkekengi* L. - Физалис обыкновенный. Редко, на открытых местах, в светлых лесах, в садах и огородах. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

1543. *Scopolia carniolica* Jacq. - Скополия карниолийская. Эндем. Реликт. Редко, в тенистых лесах. Нижн. (м.) (2,3,10). Степн.-понт.

1544. *Solanum nigrum* L. - Паслен черный. Изредка как сорное по садам, огородам. Нижн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Бор.-палеар.

1545. *S.persicum* Willd. ex Roem. et Schult. - Паслен персидский. Изредка, по берегам рек и галечникам. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9). Ксер.-п.аз.

1546. *S.pseudopersicum* Pojark. - Паслен ложноперсидский. Тисо-самшитовая роща, очень редко, по ущелью р.Хоста на галечниках. До средн. Изредка, по берегам рек и галечникам м.) (1,2,3,5,6,8,9,10). Ксер.-гиркл.

Сем. Staphyleaceae Lindl. - Клекачковые.

1547. *Staphylea colchica* Stev. - Клекачка колхидская. Реликт. Эндем. Тисо-самшитовая роща, в лесах, по опушкам. Нижн. (м.) (10). Древн.л.-колх.др.О.

Сем. Tamaricaceae Link - Гребенщиковые

1548. *Myricaria alopecuroides* Shrenk = *M. bracteata* Royle - Мирикария лисохвостниковая. Повсеместно, по галечниковым отмелям, высохшим руслам ручьев и рек, единично и группами, изредка. До верхн. (м.) (1-9). Ксер.-п.аз.

Сем. Taxaceae S.F.Gray - Тисовые.

1549. *Taxus baccata* L. - Тис ягодный. Реликт. Нередко, в составе I и II ярусов буково-пихтовых и пихтовых лесов единично, группами и участками. Образует тип леса в тисо-самшитовой роще. До верхн. (м.) (2- 7, 10). Древн.л.-колх.др. О.

Сем. Thelypteridaceae Pichi Sermolli - Телиптерисов

1550. *Oreopteris limbosperma* (All.) Holub (*Dryopteris oreopteris* (Ehrh.) Maxon) - Щитовник горный. Реликт. Редко, преимущественно в лесах. Верхн.(м)(1-9) Бор.-палеар.

1551. *Thelypteris phegopteris* (L.) Sloss. = *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt - Телиптерис фегоптерис. Изредка на скалистых местах До верхн. (петр.)(1-9). Бор.-голар.

Сем. Thymelaeaceae Juss. - Волчниковые.

1552. *Daphne albowiana* Woronow ex Pobed. - Волчник Альбова. Эндем. Реликт. Редко, по лесным полянам, опушкам, единично и группами. В субальпийском поясе, очень редко, урочище Угловая Агепста. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.-горн.

1553. *D. circassica* Woronow ex Pobed. - Волчник черкесский. Эндем. Очень редко, найден на известняке в русле р.Белая. На скалах и каменистых местах альпийского пояса, редко. Образует заросли на каменистых местах в субальпийском поясе. Верхн. (м.) (2,11). Древн.л.-колх.др.

1554. *D. glomerata* Lam. - Волчник скученный. На альпийских и субальпийских лугах, часто ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.-горн.

1555. *D. mezereum* L. - Волчник обыкновенный, волчье лыко. Часто, в буково-пихтовых и пихтовых лесах, по опушкам, единично. Выше верхней границы леса. Верхн. (м.) (1-9,11). Бор.-палеар.

1556. *D. pontica* L. - Волчник понтийский. Реликт. Редко, в восточных районах (бассейн р.М.Лаба), нередко в бассейне р.Белая под пологом леса. Массив Фишт, единично на верхнем пределе леса, доходит до субальпийского пояса. До верхн. (м.) (1-9,11). Древн.л.-м.аз.-средиз.

1557. *D. субальпийском и альпийском поясах. pseudosericea Pobed.* - Волчник ложношелковистый. Эндем.

Сем. Tiliaceae Juss. - Липовые

1558. *Tilia begoniifolia Stev. (T. caucasica Rupr.)* - Липа бегониелистная. Эндем. Реликт. В первом ярусе смешанных лесов. Массив Фишт, на верхнем пределе леса. Тисо-самшитовая роща, единично и группами как примесь в составе широколиственных лесов. До верхн. (м.) (1-9,10). Кавк.-кавк.

Сем. Typhaceae Juss. - Рогозовые

1559. *Typha latifolia L.* - Рогоз широколистный. Очень редко, по заросшим протокам рек, на озерах и водоемах образует заросли. Нижн. (гигр.) (1,8,9) Бор.-глар.

Сем. Ulmaceae Mirb. - Ильмовые.

1560. *Ulmus carpinifolia Rupr. ex Suckow. = U. minor Mill., (U. foliosa Gillib. nom. invalid)* - Вяз граболистный. Спорадически в виде примеси в смешанно-широколиственных и дубовых лесах. До средн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

1561. *U. glabra Huds. (U. elliptica C. Koch)* - Вяз голый. Реликт. Обычно, единично и группами в широколиственных лесах, по опушкам, полянам, образует чистые древостои по первым террасам рек, шлейфам, входит в состав лавинного криволеся. Преимущественно на мощных почвах, хорошо увлажненных местах. Массив Фишт - Оштен, единично на верхнем пределе леса. Тисо-самшитовая роща, единично. До верхн. (м.) (1-11). Кавк.-кавк.

Сем. Urticaceae Juss. - Крапивные

1562. *Parietaria chersonensis (Lang et Szov.) Doerfl. = P. serbica Rapc.* - Постенница херсонская. Под навесом скал субальпийского пояса. Очень редко, хр. Б. Бамбак. Верхн. (петр.) (6).

1563. *P. micrantha Ledeb.* - Постенница мелкоцветная. Под навесом скал субальпийского пояса. Очень редко. Массив Бамбак. Верхн. (петр.) (6).

1564. *Urtica dioica L.* - Крапива двудомная. Нередко, в лесу, на полянах, у дорог и троп на засоренных лугах субальпийского пояса. Массив Фишт - Оштен, близ кошей, сорное. До верхн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,11). Бор.-палеар.

Сем. Valerianaceae Batsch. - Валериановые

1565. *Valeriana alliariifolia* Adams - Валериана чесночничколистная. Реликт. Нередко, по лесным лугам, скалам, берегам рек, на опушках и полянах, под пологом леса. На субальпийских лугах. Массив Фишт - Оштен, на каменистых местах у верхнего предела леса и в субальпийском поясе. До верхн. (м.) (1-9,11). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

1566. *V.alpestris* Stev. - Валериана приальпийская. Эндем. На лугах и скальных местах альпийского и субальпийского поясов. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

1567. *V.calcarea* N.Alb. - Валериана известняковая. Эндем. На скалах альпийского пояса. Очень редко, г.Фишт (Н. М. Альбов, 1895). Верхн. (м.) (11).

1568. *V.cardamines* Bieb. - Валериана сердечниковая. Эндем. На скалах и осыпях субальпийского пояса. Редко, г.Фишт. Верхн. (петр.) (11).

1569. *V.colchica* Utkin - Валериана колхидская. Эндем. Часто, по опушкам, на лугах верхнего предела леса и на субальпийских лугах в т.ч. на массиве Фишт - Оштен. Верхн. (м.) (1-9). Кавк.-колх.

1570. *V.jelenevskiyi* P.Smirn. - Валериана Еленевского. Эндем. На скальных местах субальпийского пояса. Очень редко, пастбище Абаго. Верхн. (петр.) (2).

1571. *V.officinalis* L. - Валериана лекарственная. Часто, в лиственных лесах и на лугах, по опушкам и полянам, берегам рек и среди кустарников. На субальпийских лугах. Ст.Джуга. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1572. *V.saxicola* С.А.Меу. - Валериана скальная. Эндем. На скалах альпийского пояса. Верхн. (м.) (1-9,11).

1573. *V.tiliifolia* Troitzk. - Валериана липолистная. Эндем. Нередко, по опушкам на лугах и берегам ручьев в лесном поясе до его верхнего предела. На субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

1574. *Valerianella dentata* (L.) Poll. - Валериана зубчатая. Редко, как сорное на лугах и в кустарниках. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

Сем. Verbenaceae J. St. - Hil. - Вербеновые

1575. *Verbena officinalis* L. - Вербена лекарственная. Тисо-самшитовая роща, в широколиственных лесах, на опушках. Нижн. (м.) (10).

Сем. *Violaceae* Batsch - Фиалковые

1576. *Viola alba* Bess. - Фиалка белая. Редко, под пологом леса, на полянах, в кустарниках. До средн. (м.) (1,2,3,8,9). Степн.-понт.

1577. *V. arvensis* Murr. - Фиалка полевая. Редко, на сорных местах, по берегам рек в лесном поясе. На субальпийских лугах. Г.Оштен, как сорное близ балаганов. До верхн. (м.) (1-9,11).

1578. *V. canina* L. - Фиалка собачья. В среднем и верхнегорном поясах, до субальпийского пояса.

1579. *V. caucasica* Kolenati - Фиалка кавказская. Эндем. На скалах лесного, альпийского и субальпийского поясов. Масив Фишт - Оштен, часто под навесом скал, в альпийском поясе. Верхн. (петр.) (1-9,11). Кавк.-кавк.

1580. *V. montana* L. (*V. canina* L.) - Фиалка горная. Изредка, в составе лесного крупнотравья. На субальпийских лугах и на верхней границе леса. Ст.Джуга. До верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

1581. *V. odorata* L. - Фиалка душистая. Часто, в широколиственных лесах, по кустарникам, лужайкам среднего пояса. Тисо-самшитовая роща, нередко, в широколиственных и самшитовых лесах. До средн. (м.) (1,2,3,5,6,8,9,10).

1582. *V. oreades* Bieb. - Фиалка высокогорная. Эндем. На альпийских лугах. Ст.Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11). Кавк.-м.аз.

1583. *V. sylvestris* Lam. = *V. reichenbachiana* Jord. ex Boreau - Фиалка лесная. Тисо-самшитовая роща, в смешанных лесах. Повсеместно, в широколиственных, пихтовых, пихтово-букowych лесах, на скалистых тенистых берегах. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-евр.

1584. *V. vespertina* Klok. - Фиалка вечерняя. Эндем. Обычно по опушкам и полянам в лесу, на верхнегорных лесных полянах и субальпийских лугах. До верхн. (м.) (1-9). Кавк.-кавк.

Сем. *Vitaceae* Juss. - Виноградные

1585. *Vitis sylvestris* C.C.Gmel. - Виноград лесной. Тисо-самшитовая роща, редко. Нижн. (м.) (10). Геогр. тип не установлен.

Сем. *Woodsiaceae* (Diels) Herter - Вудсиевые

1586. *Woodsia fragilis* (Trev.) Moore - Вудсия ломкая. Эндем. Изредка, в трещинах скал, преимущественно известняковых. До верхн. (петр.) (1,6,9,10). Кавк.-кавк.