

Организация охотничьего промысла в Краснодарском крае

В Краснодарском крае ежегодно заготавливается пушнина на сумму примерно в 200 тыс. руб.¹, причем предгорные и горные районы дают около 60% этой суммы. В целом по краю в ценностном выражении первое место в заготовках занимает куница, на втором и третьем стоят крот, лисица и заяц². В заготовках пушнины по предгорным и горным районам удельный вес различных видов несколько иной. Но и здесь в ценностном выражении первое место принадлежит кунице (около 40% от суммы всех заготовок, без учета привозных видов и продукции клеточного звероводства). Второе и третье места соответственно занимают крот (до 14,9%) и лисица (12%). Водяная крыса и заяц занимают 4-е и 5-е места (10,2 и 8,1%), а белка стоит на 6-м месте (4,8%).

Ниже дан анализ заготовок пушнины по районам; приводимые проценты показывают ценностное значение шкурковой продукции различных видов по отношению ко всей сумме заготовок.

В Абинском районе шкурковая продукция куницы дает 38,2% от всей суммы заготовок, а лисицы и зайца — 19,3 и 15,6%. На долю крота и енотовидной собаки приходится 4,4 и 11,7%. Совсем небольшое значение в заготовках имеют белка (1,5%), норка (3,1%), лесной кот (1,7%) и водяная крыса (1,2%). Другие виды — барсук, волк, выдра, рысь, слепыш, соня-полчек и шакал — добываются единично и промыслового значения не имеют. Следует отметить, что весенне-летние виды пушнины могли бы иметь гораздо больший удельный вес в общем балансе заготовок по району. В настоящее время запасы сони-полчка совершенно не опромышляются, а добычу таких видов, как крот и водяная крыса, можно увеличить в десятки раз. Из зимних видов недостаточно полно опромышляются запасы енотовидной собаки и, особенно, белки.

Первое место в заготовках пушнины в Адлерском районе принадлежит кунице (50,9%). Связано это с большой облесенностью территории. Вторым по значению видом является крот, составляющий в заготовках 18,5%. Значительный удельный вес имеет соня-полчек (14,3%). На четвертом месте стоит белка — 8,2%. Другие виды имеют незначительное значение в промысле. Заготовки шкурок лисицы составляют 2,4%, зайца — 2,1, шакала — 1,1%. В очень небольшом количестве в районе добы-

¹ В эту сумму не входит стоимость шкурок суслика, серебристо-черной лисицы, нутрии и домовой крысы. Вместе с этими видами стоимость заготовленной пушнины составит свыше 800 тыс. рублей.

² В 1955 г. крот занимал второе место, лисица — третье; в 1956 г. лисица — второе, крот — третье; в 1957 г. заяц — второе, лисица — третье, крот — четвертое.

ваются барсук, волк, выдра, енотовидная собака, лесной кот, водяная крыса и норка.

Весенне-летние виды (соня-полчек и крот) в сильной степени недоопромышляются. Основными, ведущими видами в заготовках по району могут быть куница, белка, соня-полчек и в меньшей степени крот. Остальные виды имеют второстепенное промысловое значение ввиду своей малочисленности.

На первом месте в заготовках по Анапскому району стоит заяц (30,9%), второе и третье места занимают куница (28,1) и лисица (20,4%). По сравнению с другими районами несколько больше значение снотовидной собаки (12,3%). Некоторое значение имеют норка (3,3%), лесной кот (4,6%) и крот (1,5%). В очень незначительном количестве в районе добываются барсук, белка, волк, слепыш, соня-полчек, шакал.

К недоопромышляемым видам относятся енотовидная собака, белка и соня-полчек.

В Апшеронском районе ведущий промысловый вид — куница (48,4%), затем крот (26,2%). Значительно меньший удельный вес имеют лисица (7,6%), белка (6,2%) и, тем более, заяц (4,2%), енотовидная собака (4,4%) и лесной кот (1,3%). В незначительном количестве добываются норка, барсук, волк, выдра, водяная крыса, рысь, соня-полчек и шакал; ценное значение каждого из этих видов — менее 0,5% от всей суммы заготовок.

К видам, в значительной степени недоопромышляемым, принадлежат белка, крот, водяная крыса и соня-полчек, причем последний вид практически вообще не добывается, хотя в лесной части района его очень много.

В общей экономике Белореченского района пушной промысел имеет небольшое значение. На первом месте в заготовках стоит куница (33,4%), второе и третье места занимают крот (23,0%) и лисица (17,0%), далее следует заяц (13,7%). Другие промысловые виды имеют значительно меньшее значение: белка — 1,9%, енотовидная собака — 2,9%, норка — 1,2%. Единично добываются такие виды, как барсук, волк, выдра, лесной кот, водяная крыса, слепыш; не добывается соня-полчек.

Несмотря на то, что крот в заготовках занимает первое место, запасы его опромышляются далеко недостаточно. К видам, добычу которых возможно увеличить в несколько раз, следует отнести белку, водяную крысу и лисицу. Промысел сони-полчека не только возможен, но и необходим в интересах сокращения численности этого вредителя.

Более двух третей стоимости заготовленной по Геленджикскому району пушнины составляют шкурки куницы (72,7%). Существенное значение в промысле имеет лисица (9,2%). Другие виды промысловых животных имеют незначительное значение:

заяц — 7,3%, лесной кот — 3,0%, белка — 2,2%, соня-полчек — 1,0%, енотовидная собака — 1,8%. Барсук, волк, выдра, крот, норка, рысь и шакал добываются единично и значения в заготовках не имеют.

В большой степени недоопромышляются запасы белки, крота и сони-полчка.

В Горяче-Ключевском районе наибольшее промысловое значение имеет куница (52,7%), затем крот (14,9%) и лисица (11,9%). Меньшее значение имеют заяц (6,7%) и, тем более, енотовидная собака и белка (3,93 и 2,1%). В небольшом количестве добывается лесной кот (1,3%). Кроме того, на заготовительные пункты единично поступают шкурки барсука, волка, выдры, норки, рыси и шакала.

Добычу на территории района белки и крота можно увеличить в несколько раз. Виды эти в большой степени недоопромышляются. Соня-полчек вообще не добывается. При правильной организации промысла основной удельный вес в заготовках могли бы иметь шкурки весенне-летних видов — крота и сони-полчка.

В Крымском районе наибольшее промысловое значение имеют куница (29,1%), заяц (20,4%), лисица (17,1%) и норка (11,4%). Немаловажно значение енотовидной собаки (16,9%). Следует отметить, что ни в одном из других предгорных и горных районов, исключая только соседний Лиапский, норка и енотовидная собака не играют такой большой роли в пушных заготовках, как здесь. В очень небольшом количестве в Крымском районе добывается крот — 2,9%. Не имеют существенного промыслового значения барсук, белка, волк, лесной кот, рысь, слепыш и шакал.

Заготовки пушнины можно было бы увеличить во много раз за счет большей добычи белки, снотовидной собаки, крота и сони-полчка; последний вид в районе вообще не добывается.

В Лабинском районе как и в предыдущем, в заготовках пушнины имеют первостепенное значение несколько видов. Это будут лисица (17,6%), водяная крыса (17,3%), крот (24,6%) и заяц (9,8%). Соне-полчку принадлежит пятое место (9,4%). Некоторое значение имеют куница (8,9%), белка (4,3%), норка (2,7%) и енотовидная собака (2,2%). Кроме того, в незначительном количестве добываются барсук, волк, выдра, лесной кот, рысь и слепыш.

На территории района можно значительно больше добывать енотовидной собаки, крота, водяной крысы и сони-полчка. Все эти виды недоопромышляются.

В Лазаревском районе существенное значение в промысле имеет только куница, шкурки которой составляют 80,4% от стоимости всей заготовляемой пушкины. Такое положение

вызвано совершенно ненормальной организацией промысла и несвободой заготовительных организаций к этой работе. Другие виды имеют очень незначительный удельный вес в заготовках. Шкурки крота составляют 4,1%, лесного кота — 2,8, выдры — 2,8, шакала — 2,7, белки — 2,3, лисицы — 1,8 и соня-полочка — 0,9%. Еще меньшее значение имеют барсук, енотовидная собака, заяц и порка.

Увеличения выхода пушной продукции можно достигнуть за счет более интенсивного промысла белки, крота, шакала и особенно сони-полочки.

В Отрадненском районе на первом месте по значению в промысле стоит водяная крыса, дающая больше половины стоимости всей заготовляемой пушнины (55,1%). Значителен удельный вес шкурок лисицы (21,5%) и зайца (11,0%). Стоимость шкурок крота составляет 5,8%, куницы — 2,4, норки — 1,2, выдры — 1,2, енотовидной собаки — 0,9%. Единично заготавливаются шкурки барсука, белки, волка, лесного кота, слепыша и сони-полочки.

Добычу водяной крысы на территории района возможно увеличить в несколько раз. Того же возможно достичь и в отношении крота. Белка и соня-полочек практически не добываются. Перспектива организации промысла на эти два последние вида в районе ограничена вследствие незначительной площади, занятой лесными насаждениями. Однако несколько сотен белок и особенно сони-полочки добывать вполне возможно.

Псебайский район — один из основных районов края по промыслу куницы. Несмотря на это, удельный вес куницы в заготовке пушнины (39,0%) ниже, чем в некоторых других районах. Это объясняется более равномерным и полным опромыщлением других видов. На втором месте стоит водяная крыса, дающая 15,9% стоимости всей пушнины. Третье и четвертое места занимают крот (14,6%) и белка (10,9%). Меньшее значение в заготовках пушнины имеют лисица (8,2%), заяц (3,9%), енотовидная собака (2,2%), норка (1,4%), соня-полочек (1,6%). Барсук, волк, выдра, лесной кот и рысь вследствие своей малочисленности имеют наименьшее значение.

Следует отметить, что в Псебайском районе охотники могли бы добывать значительно большее количество белки, крота и сони-полочки.

В Северском районе наибольшее значение в заготовках имеет куница, стоимость шкурок которой составляет 41,7%. Второе и третье места занимают лисица (19,8%) и заяц (13,3%). Меньший удельный вес имеют крот (9,6%), енотовидная собака (6,9%), норка (2,3%), белка (1,3%), лесной кот (1,6%) и выдра (1,0%). Барсук, волк, слепыш и шакал добываются единично. Соня-полочек не заготавливается, хотя запасы этого вида значительны.

На территории района недоопромышляют белку, енотовидную собаку и крота.

В Спокойненском районе первые места по значению в заготовках занимают водяная крыса — 58,6%, затем крот (20,9%). Таким образом, весенне-летние виды в заготовках доминируют. Из зимних видов лисица составляет 8,3%, заяц — 3,9, белка — 2,6, куница — 2,7 и енотовидная собака — 1,5%. Барсук, волк, лесной кот, норка, рысь, слепыш и соня-полчек добываются в незначительном количестве и практически в заготовках не имеют значения.

Запасы белки, водяной крысы, енотовидной собаки, лисицы и сони-полчка недоопромышляются.

В Туапсинском районе 76,9% стоимости пушной продукции дает куница, что свидетельствует о неравномерном и слабом опромышлении запасов других видов. Нельзя считать нормальным такое положение в организации промысла, когда заготовки выполняются в основном за счет одного вида. Заготовки крота составляют всего 6,1%, лисицы — 4,1, лесного кота — 2,7, енотовидной собаки — 2,5, сони-полчка — 1,6, белки — 2,1, шакала — 1,3 и выдры — 1,3%. Еще меньшее значение имеют барсук, волк, заяц, норка и рысь.

В районе совершенно недостаточное внимание уделяется развитию промысла белки, енотовидной собаки, крота и сони-полчка. Заготовки последнего вида по сравнению с предвоенными годами сократились в десятки раз.

В Тульском районе большие половины стоимости заготовляемой пушнины дает куница (58,7%). Второе и третье места занимают крот (19,5%) и белка (9,9%). Удельный вес белки в заготовках по сравнению с другими предгорными и горными районами хотя и большой, но далеко не предельный. Следующие по значению промысловые виды: лисица (5,4%), енотовидная собака (2,4%), заяц (2,0%) и лесной кот (0,9%). Барсук, волк, выдра, норка и соня-полчек добываются в очень небольшом количестве и практически в настоящее время не имеют значения в промысле.

Запасы белки, крота и сони-полчка в большой степени недоопромышляются.

Наибольший удельный вес в заготовках по Ярославскому району имеют куница (43,3%), лисица (19,2%) и заяц (13,4%). Крот в заготовках пушнины составляет 12,6%, белка — 4,8, енотовидная собака — 2,1, лесной кот — 1,3 и норка — 1,7%. Барсук, волк, выдра добываются единично.

Недоопромышляемые виды — белка и крот. Соня-полчек совершенно не добывается, хотя условия для организации промысла на этот вид вполне благоприятные, численность зверьков в лесной части района повсеместно высокая.

Таблица 10

Ценное значение широковой продукции отдельных видов в процентах от общей стоимости заготовленной пушнины по районам

В табл. 40 приводятся средние данные за 7 лет по заготовке местных видов промысловых животных в процентах от общей стоимости пушнины, заготавливаемой в каждом из районов. Из таблицы, видно, что во всех предгорных и горных районах один-два каких-нибудь вида обычно дают большую часть стоимости заготавливаемой пушнины. Такое положение свидетельствует о совершенно неудовлетворительной постановке промысла как в отдельных районах, так и в Краснодарском крае в целом. Подобная неравнозначность отдельных видов в общем балансе заготовок в большинстве случаев отражает не бедность и однобразие промысловой фауны, а предпочтение в промысле какому-нибудь одному виду. Обычно это бывает обусловлено тем, что организация промысла на эти виды проще, чем на другие. Излюбленный объект промысла в крае — куница, дающая в некоторых районах свыше 70% стоимости всех заготовок. И лишь в тех районах, где численность ее низка, первое место занимают другие виды. Шкурки куницы высоко оплачиваются, добыча не составляет большого труда, и охотники в первую очередь добывают ее. Практиковавшаяся формально до последнего времени лицензионная охота на куницу, по существу, была охотой без ограничения. Нормы отстрела устанавливались без учета маточного поголовья, а на основании данных заготовок предыдущего года. Лицензии выдавались районной заготовительной конторе, которая в лучшем случае передавала их своим штатным заготовителям пушно-мехового сырья. Любой охотник мог добывать куниц без ограничения, так как шкурки принимались в неограниченном количестве и зачастую сверх установленных госохотинспекцией норм. В результате такого бесконтрольного промысла численность куниц в крае была подорвана, и с 1959 г. охота на них запрещена на два года.

Запасы других видов, не относящихся к объектам спортивной охоты, в крае полностью недоопромышляются. Промысел крота, водяной крысы и сони-полочка ведется только отдельными лицами, поэтому в заготовках эти виды в большинстве районов играют незначительную роль. Во многих районах Краснодарского края весенне-летние виды пушнины (крот, соня-полочек, водяная крыса) могут быть ведущими в заготовках и занимать одно из первых мест. Но для этого необходимо в первую очередь увеличение числа охотников-промысловиков. Эти «малоценные» виды пушнины могут значительно увеличить стоимость пушно-мехового сырья и тем самым иметь большее значение в общей экономике края (Котов, 1957 б).

Несмотря на неудовлетворительную организацию промысла в целом и большие потери из-за недопромысла отдельных видов, выход пушнины в рублях с единицы площади в Краснодарском крае довольно высок. По предгорным и горным районам в среднем он составляет 40 руб. с 1000 га площади.

Известно, что в густо населенных центральных областях добывают пушнины на единицу площади больше, чем в малонаселенных таежных районах. Основную массу пушнины добывают в южных и центральных областях страны (Вершинин и Реброва, 1950). Но такое положение может сохраняться только при использовании всех возможностей истаежных, относимых к «непромысловой» зоне, районов. За последние 10 лет, и особенно с передачей функций заготовки пушнины Центросоюзу, с ликвидацией объединения «Заготживсырье», в центральных областях, а также в Краснодарском крае, охотничьему промыслу стало уделяться значительно меньшее внимание. Заготовка видов, не являющихся объектами спортивной охоты, и особенно весенне-летних видов, значительно сократилась.

Безусловно, выход пушнины с единицы площади в Краснодарском крае может быть гораздо выше, чем в таежных районах. По имеющимся у нас материалам за 1954—1960 гг. (табл. 41), выход пушнины в рублях с 1000 га угодий в Краснодарском крае лишь немногим выше, чем в некоторых таежных областях, и значительно выше, чем в тундровых районах. По данным В. Скалопа (1959 а), выход пушнины с 1000 га площади в Иркутской области составил в 1955 г. 31,95 руб. и в Амурской области в 1957 г. — 15,37 руб.; т. е. в 1,2 и в 2,6 раза был меньше, чем в предгорных и горных районах Краснодарского края. Для Чукотского округа выход пушнины еще более низкий и составляет 3,56 руб. с 1000 га (Зиссер, 1956). Предгорные и горные районы Краснодарского края дают выход пушнины в 11,2 раза выше.

Практически в Краснодарском крае выход пушнины с единицы площади может быть значительно увеличен за счет более полного использования недоопромышляемых в настоящее время запасов белки, крота, сони-полочка и водяной крысы.

Наибольший выход пушнины (в рублях) с 1000 га угодий в обследованных нами районах отмечается в Спокойненском (103,56), Апперонском (60,32), Лабинском (53,21), Псебайском (63,11) и Тульском (42,26) районах.

Для сравнения укажем, что в степных районах края выход пушнины с 1000 га площади значительно ниже. Для Кавказского района он равен 20,13 р., Красноармейского — 32,55, Курганинского — 28,69 и Приморско-Ахтарского — 18,94 р. В большинстве районов выход пушнины ежегодно сокращается.¹

Одна из причин, способствующих неполному освоению всех видов промысловых животных, — отсутствие контроля за планированием заготовок пушно-мехового сырья. Обычно конт-

¹ Следует иметь в виду, что заготовительные цены на некоторые виды (кунцию, лисицу и некоторые другие) с 1956 г. были увеличены.

Таблица 41

Выход пушинны с 1000 га угодий в рублях по предгорным и горным районам Краснодарского края и виды пушинны, занимающие ведущее место в заготовках

Район	Выход пушинны с 1000 га угодий в рублях	О с и о в н и е и р о м а с л о в и к е в и л и м			
		1-е место	2-е место	3-е место	
		вид	вид	вид	
Абинский	31,7	куница	3,8, 2	лисица	1,9, 3
Алдерский	35,7	заяц	5,0, 9	крот	1,8, 5
Анапский	29,4	куница	3,0, 9	куница	2,8, 1
Апшеронский	60,3	куница	4,8, 4	крот	2,6, 2
Белореченский	40,6	заяц	3,3, 4	заяц	2,3, 0
Геленджикский	39,7	заяц	7,2, 7	лисица	9, 2
Горячечекинской	33,1	заяц	5,2, 7	крот	1,4, 9
Крымский	36,4	заяц	2,9, 1	заяц	1,1, 9
Лабинский	53,2	крот	2,4, 6	лисица	2,0, 4
Лазаревский	23,5	куница	8,0, 4	крот	1,7, 6
Орджоникидзе	45,2	вод. крьса	5,5, 1	лисица	4, 1
Псебайский	63,1	куница	3,9, 0	вод. крьса	2,1, 5
Северский	28,1	заяц	4,1, 7	лисица	1,5, 9
Соколинецкий	103,5	вод. крьса	5,8, 6	крот	1,9, 8
Тулапинский	29,6	куница	7,6, 9	лисица	2,0, 9
Тульский	42,2	заяц	5,8, 7	заяц	6, 1
Ярославский	37,8	заяц	4,3, 3	лисица	1,9, 5
Среднее по всем районам		40,00	куница	3,9, 2	крот
					1,4, 9
					лисица
					1,2, 0

рольные цифры заготовок выражаются в суммарном выражении с указанием повидовых заготовок, но, как правило, эти планы не выполняются по большинству видов, и общее выполнение плана районными конторами исчисляется по всей сумме заготовленной пушнины. Подобный контроль дает заготовительным организациям возможность обращать меньше внимания на организацию промысла многих видов животных. Отсюда вполне естественная тенденция заготовителей уделять внимание в основном только пушнине более высокой стоимости.

По нашему мнению, совершенно не обосновано планирование заготовок пушнины на календарный год, а не на сезонный промысловый год, как это практиковалось раньше. При планировании заготовок на календарный год невозможно учитывать данные прогнозов численности животных, а следовательно, невозможно планировать и размеры заготовок отдельных видов. Подобные непривычности свойственны всей системе Центросоюза и неоднократно служили предметом критики в печати (Соколов, 1959, и др.).

Организации промысла со стороны районных заготовительных контор мало уделяется внимания. В лучшем случае ися работа сводится к заключению договоров с некоторыми охотниками. Важнейшим условием в организации промысла является правильная расстановка охотников в охотугодьях, что связано с размещением животных по отдельным участкам. Обычно для этого рекомендуется предпромысловая разведка. Для густонаселенных районов это не должно быть правилом. Но в условиях многих предгорных и горных районов Краснодарского края проведение предпромысловой разведки необходимо, причем организация этой работы должна осуществляться не по личной инициативе отдельных охотников, а под руководством районной заготовительной конторы. Попутно с этим необходимо проведение пробного отстрела, что в крас практикуется очень редко, лишь в отдельных районах и в основном только по зайцу. В результате сроки охоты на некоторые виды животных устанавливаются госохотнадзором необоснованно.

О методике проведения пробных отстрелов и установлении сроков охоты по этим материалам мы здесь не останавливаемся, так как этот вопрос довольно детально освещен в литературе (Павлова и Голубева, 1938; Павлова, 1947). В качестве примера укажем, что срок охоты на белку устанавливается с большим опозданием. Охотнадзор ежегодно разрешает охоту на белку в Краснодарском крае с 15—20 ноября, т. е. одновременно с началом промысла куницы. Но по срокам спелости колоса белка относится к первой группе, а куница — ко второй (Ларин, 1954). Линька белки в условиях Краснодарского края заканчивается раньше, чем полностью доспевает мех ку-

пицы. Искусственное приравнивание сроков охоты на эти различные виды не может способствовать увеличению заготовок пушнины.

В Краснодарском крае охоту на белку необходимо разрешать не с 15—20 ноября, а с 1—5 числа этого месяца, с предварительным проведением пробных отстрелов (Котов, 1956. 1958 б). Перенесение начала промысла на эти числа не может принести ущерба качеству пушнины и будет способствовать увеличению выхода ее.

Кроме того, учитывая различные физико-географические условия отдельных районов, нельзя устанавливать единые сроки охоты по территории всего края. Сроки охоты должны дифференцироваться в зависимости от положения районов и даваться не в целом по краю, а по группам районов, например, степных, предгорных и горных. Охоту на белку в горных районах возможно открывать на две недели раньше, чем в равнинных.

Заготовительные организации теряют значительные суммы за счет некачественной обработки шкурок охотниками. Зачет на головку белки составляет 78,9%, зайца — 70—77,7, лисицы — 72,6 — 73,8, норки — 73,7—78, куницы — 83,2 — 89,9%.

Таблица 42
Зачет на головку отдельных промысловых видов, добываемых
в Краснодарском крае

Вид пушного сырья	Зачет на головку в %	
	1956 г.	1957 г.
Белка	78,9	78,9
Заяц	70,0	77,7
Крот	92,0	94,0
Крыса водяная	88,0	100,0
Куница	83,2	89,9
Лисица	73,8	72,5
Норка	73,7	78,0
Соля-полочек	100,0	95,0
Слепыш	91,4	88,6

В основном низкий зачет на головку этих видов связан с небрежной первичной обработкой шкурок. Только по видам, указанным в табл. 42, из-за некачественной обработки шкурок и, в меньшей степени, из-за сортности заготовительные организации потеряли в 1956 г. 37 491,5 руб. и в 1957 г. 31 185,0 руб., т. е. за два года около 70 тыс. руб. Наибольшие потери при-

ходятся на долю лисицы — свыше 16,6 тыс. руб. в год. Причиной этих недостатков служит слабая работа с охотниками.

Следует также отметить, что в районах нет специалистов охотоведов ни высшей, ни средней квалификации. Мнение, что охотоведы нужны только в «промышленных» районах, несостоит. В «непромышленных» районах Краснодарского края выход пушнины с единицы площади выше, чем в «промышленных». Само деление областей и районов на промышленные и непромышленные искусственно создано и ничем не оправдано.

В нашем охотниччьем хозяйстве вопрос о недостаточном количестве охотоведов стоит очень остро (Скалон, 1959 б). Достаточно отметить, что этих специалистов выпускает только один Иркутский сельскохозяйственный институт и в таком количестве, что для удовлетворения потребностей охотничьего хозяйства в укомплектовании специалистами потребуется не менее 40 лет. Между тем в США специалистов по охотничьему хозяйству готовят в 17 учебных заведениях (Депарма, 1957). Но ведь, помимо работы в промышленном охотниччьем хозяйстве, охотоведы необходимы и для спортивных охотничьих хозяйств, сеть которых расширяется с каждым годом. Проведенная в свое время ликвидация Московского пушно-мехового института, выпускавшего охотоведов, нанесла огромный ущерб охотничьему хозяйству страны. Помимо Иркутского сельхозинститута, охотоведов должны готовить и другие вузы, причем часть охотоведов должна специализироваться для работы в спортивных охотничьих хозяйствах и в системе Центросоюза «непромышленных» районов, где специфика работы и промысла иная, нежели в таежных областях.

В Краснодарском крае за последние годы сокращается число охотников, занимающихся добычей сони-полочка, крота и водяной крысы. Работа охотников, добывающих пушнину по договорам с заготконторами, не засчитывается в общий трудовой стаж, что впоследствии осложняет оформление пенсий по старости и вынуждает охотников вследствие этого прекращать охоту и переходить на производство или в колхозы. Поэтому добыча весенне-летней пушнины осуществляется отдельными лицами, отчего заготовки этих видов значительно сократились.

Большое внимание в настоящее время уделяется вопросу закрепления угодий за отдельными хозяйствами — промхозами, колхозами и т. п. В условиях Краснодарского края должен быть несколько иной подход к этому мероприятию. Между охотниками нередко возникают споры из-за использования мест охоты, особенно при отлове куниц кулёмками и капканами. В результате обезлички в некоторых уроцищах запасы животных постоянно переопределяются. Необходимо, чтобы при содействии заготконтор было организовано закрепление угодий и путников (линий ловушек) за отдельными охотника-

ми, причем документом на это закрепление должен быть договор. Во избежание перепромысла участки должны закрепляться на длительный срок с обязательством охотника проводить простейшие биотехнические мероприятия. Одновременно это будет служить стимулом для улучшения угодий самими охотниками. Подобное закрепление охотничьих угодий показало хорошие результаты в Канаде (Депарма, 1956 б. в). Закреплению охотугодий обязательно должно предшествовать охотоведение территории.

В местах спортивной охоты метод закрепления охотугодий отдельным охотникам, безусловно, неприменим. В этих случаях целесообразно закрепление угодий или их приписка за отдельными коллективами, способными обеспечить контроль за использованием охотугодий и борьбу с браконьерами.

За последние десятилетия фауна Краснодарского края была пополнена новыми, не свойственными Северному Кавказу видами. В целях акклиматизации были выпущены алтайская белка, енотовидная собака, ондатра и енот-полоскун. Первые три вида широко расселились в крае и стали теперь объектами промысла. В целом по краю заготовка шкурок алтайской белки дает около 2,5% от всей стоимости пушнины, енотовидной собаки — более 3% и ондатры — до 6,5%.¹⁾ Акклиматизация енота-полоскуна проходит менее удачно, зверьки широко расходятся и плотность популяции их повсеместно в местах обитания невысока.

Считать в полном смысле положительным опыт акклиматизации алтайской белки было бы не совсем правильным. В хозяйственном отношении опыт акклиматизации алтайской белки пока не может быть признан удачным, так как во многих районах, особенно на Черноморском побережье, белка приносит значительный вред урожаю орехоплодных. В настоящее время шкурки добывших белок вряд ли могут окупить тот ущерб, который приносят животные ореховым насаждениям. Но следует оговориться, что этот вопрос до сего времени детально не изучался и при полном опромышлении запасов этого вида возможно, что добывая пушину будет компенсировать вред, приносимый белкой. Для этого необходимо полностью использовать запасы белки.

Опыт акклиматизации путрии в плавнях Кубани был неудачным. Все выпущенные зверьки погибли при первом же ледоставе. Рекомендации Н. Верещагина (1930) о возможности

¹⁾ Ондатра распространена в основном в плавнях Кубани, которые нами не обследовались. Поэтому описание этого вида в данной работе не приводится.

акклиматизации этого вида на Северном Кавказе не оправдались, и сдавли можно согласиться с мнением автора, что нутрия при вольном разведении «прекрасно переносит суровые зимы средней Европы».

Спортивное охотничье хозяйство

В нашу задачу не входит детальный анализ спортивного охотничьего хозяйства, поэтому мы ограничиваемся лишь краткой информацией по этому вопросу.

В Краснодарском крае зарегистрировано свыше 49 тыс. охотников, которые объединены в 57 добровольных обществах. Руководство районными и городскими обществами осуществляется Краснодарским краевым обществом «Охотник и рыболов».

Объектами спортивной охоты из млекопитающих в крае служат заяц, лисица, кабан и медведь. На косулю, оленя, тура и серну охота запрещена. Большое значение имеет охота на водоплавающую дичь (охота на гусей и лебедей запрещена) и на перепела. В меньшей степени практикуется охота на вальдшнепа. Охота на серую куропатку, фазана, кавказского тетерева и кавказскую горную индейку запрещена.

На территории Краснодарского края организовано 11 приписных спортивных охотничьих хозяйств. Все они расположены в угодьях, богатых водоплавающей дичью, поэтому мы не будем останавливаться на их характеристике. В предгорных и горных районах приписных охотничьих хозяйств в настоящее время нет.

В густонаселенных районах с большим количеством охотников большую роль в сохранении поголовья дичи играют заказники, организации которых в стране в последнее время стали вновь уделять внимание. В предгорных и горных районах Краснодарского края создано 6 заказников. Мероприятий по воспроизводству дичи в заказниках не проводится. Охрана осуществляется более или менее удовлетворительно. Большинство охотников не нарушают установленного режима в выделенных под заказники угодьях.

Охотниспекцией при Краснодарском крайисполкоме создано 14 егерских участков, занимающих площадь 380,6 тыс. га. В предгорных и горных районах расположено 13 егерских участков. На всех участках имеются штатные егерь госохотниспекции, которым вменяется в обязанность контроль за проведением охоты на участке, проведение учетов животных и выполнение




Рис. 65. Схема расположения земельных участков в промышленных и горных районах Краснодарского края. 1—заказники; 2—сторонние участки (указана номера участков).

ние воспроизводственных мероприятий по плану госохотниспекции. В 1959 г. егерями заложено 190 искусственных солонцов и заготовлено 6,4 т сена для подкормки оленей и косуль. Планом работ на 1960 г., помимо закладки искусственных солонцов, предусматривались посадка топинамбура и посев кукурузы для подкормки кабанов.

На минеральной подкормке диких копытных животных следует остановиться более подробно. Общеизвестно, что копытные животные испытывают большую потребность в минеральных солях, и особенно в солях с элементами щелочной группы. Воды большинства рек Северо-Западного Кавказа отличаются низкой минерализацией (Розмахов, 1940). Несколько выше минерализация вод естественных солонцов, активно посещаемых копытными животными. На Северо-Западном Кавказе такие естественные солонцы встречаются довольно часто. Подробные данные о естественных солонцах приводятся в работе А. Насимовича (1938). Впервые искусственные солонцы для привлечения диких копытных животных стали закладывать во времена Кубанской охоты. В дальнейшем, с организацией Кавказского заповедника, искусственные солонцы постоянно закладываются на его территории. В этом направлении накоплен значительный опыт.

Сама методика закладки искусственных солонцов может быть различной, и возможно, что в различных районах Советского Союза тот или иной метод является более приемлемым. Довольно часто рекомендуется устраивать солонцы в поваленных осинах, вделывая в дерево бруск глыбовой соли (Мантейфель, 1954; Солнышкин, 1959). Рекомендуется такой способ из опасения отравления животных в результате чрезмерного употребления соли при открытой выкладке ее. Мнение это ничем не обосновано. В Кавказском заповеднике соль закладывается большиими порциями (в некоторые солонцы для турков и серн — до 250 кг одновременно). Однако, несмотря на это, гибели животных от отравления поваренной солью никогда не наблюдалось. Закладка соли мелкими порциями, небольшиими кусками, мало оправдывает себя и не может служить постоянной минеральной подкормкой. В условиях Кавказского заповедника суточный расход соли в одном искусственном солонце составляет от 120 г до 3 кг (Котов, 1960, г).

Вопреки утверждению П. Мантейфеля (1954), животные очень быстро обнаруживают искусственные солонцы, и направлять их к ним при помощи «соленых жердей», конечно, не следует.

Потребность в соли у животных особенно велика весной и в начале лета. В это же время и следует закладывать большие соли. Мнение о том, что копытные животные испытывают большую потребность в соли в зимнее время (Мантейфель,

1958; Мишин, 1958; Львов, 1959), для Краснодарского края не подтверждается.

Животным необходимы не только поваренная соль, но также соли с элементами кальция, калия и др. Грызуны, в частности акклиматизированная на Кавказе алтайская белка, с большой охотой грызут сброшенные рога оленей.

Закладка искусственных солонцов на егерских участках в Краснодарском крае пока что носит формальный характер. Соль выкладывается без учета ее потребности, в основном ради выполнения плана. Часто подобные солонцы являются прекрасной находкой для браконьера. Охрана же на егерских участках поставлена пока еще слабо. Достаточно отметить, что из 605 зарегистрированных в 1959 г. в Краснодарском крае случаев браконьерства лишь 64 вскрыты штатными егерями и наблюдателями госохотинспекции.

План закладки искусственных солонцов на егерских участках госохотинспекцией недостаточно продуман, и в дальнейшем это мероприятие следовало бы ограничить, закладывая соль только в действительно необходимых местах, но зато в достаточном количестве. Основным требованием к искусственным солонцам должно быть их постоянство и надежная охрана от браконьеров. В противном случае закладка солонцов принесет только вред охотничьему хозяйству, так как будет способствовать браконьерам. Браконьерство же в Краснодарском крае развито очень сильно, особенно в горных районах, где отдельные охотники до сих пор в любое время года стреляют оленей, косуль, серн и кабанов.

Выводы

1. В Краснодарском крае запасы крота повсеместно не доопрошиваются. Заготовку шкурок можно увеличить не менее чем на 1 млн. штук.

2. Численность бурого медведя в Краснодарском крае со времен путешествий Н. Диппика значительно сократилась. Сузились пути осенних кочевок зверя, что связано с ростом народонаселения в предгорьях и усиленным преследованием хищника со стороны человека. Истребление медведей в некоторых районах продолжается и в настоящее время, несмотря на введение на зверя лицензионной охоты.

Современное распространение бурого медведя в пределах Краснодарского края ограничено в основном территорией высокогорных и среднегорных районов Главного Кавказского

хребта в восточной части края. Наибольшая численность зверя наблюдается в Кавказском заповеднике и в прилегающих к нему охотничих угодьях.

Роль Кавказского заповедника в сохранении запасов бурого медведя весьма односторонняя: осенью, т. е. в охотничий сезон, основная масса медведей покидает высокогорья заповедника в поисках диких плодов и фруктов и уходит в нижние зоны гор, на территорию, где охота открыта.

По характеру питания и отношению к человеку кавказского медведя нельзя считать вредным животным.

Учитывая сокращение численности медведя в Краснодарском крае за последние время, сравнительно медленное его размножение и ограниченную роль Кавказского заповедника в восстановлении поголовья этого зверя, госохотнадзору необходимо усилить контроль за охотой в горных районах. Лицензии на отстрел медведей следует выдавать только обществам охотников, которые могут в организованном порядке проводить спортивную охоту на этого зверя.

3. На территории Краснодарского края волки держались в большом количестве вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Усиление охоты на них после войны в связи с усилением высокой премии привело к значительному сокращению численности хищников. Однако современное распространение волков в Краснодарском крае охватывает еще большую территорию. Волки встречаются как на равнине, так и в горах (преимущественно на северном склоне Главного хребта), где их численность выше всего. Вертикальное распространение волков простирается от уровня моря до высоты примерно в 2600—2700 м.

Значительное количество волков в горных районах Краснодарского края обусловлено отсутствием здесь плановой, хорошо организованной работы по борьбе с этим хищником.

4. На территории Краснодарского края шакал распространяется преимущественно по побережью Черного моря; в горы поднимается до 600—700 м над уровнем моря. Единично встречается в низких предгорьях северного склона Главного хребта, а также севернее, на равнине.

По характеру питания шакал эврифаг с резко выраженным наклонством к хищничеству. Селясь преимущественно вблизи населенных пунктов, шакалы часто нападают на мелкий домашний скот. В лесу нападают на всех животных, которых только могут поймать и одолеть. Пожирая всевозможные отбросы, оставленные человеком, шакалы приносят пользу, играя роль санитаров. Тем не менее их полезная деятельность не в коей мере не покрывает приносимого ими человеку ущерба.

Шакал — вредный хищник, подлежащий уничтожению в течение круглого года. Однако охота на него в Краснодарском крае развита слабо. В целях усиления промысла шакала и повышения заинтересованности охотников следует установить более высокую премию за каждого добытого зверя.

5. На территории Краснодарского края повсеместно распространена лисица. Наибольшая плотность популяции наблюдается на равнине и в широколиственных лесах предгорий, наименьшая — в поясе темнохвойного леса и на высокогорных лугах. На южном склоне Главного хребта лисиц меньше, чем на северном; реже всего лисица встречается здесь в береговой полосе Черного моря. Верхняя граница распространения лисиц в горах — 2600—2700 м.

Основу питания лисицы в горах Краснодарского края и в приазовских плавнях Кубани составляют млекопитающие, главным образом мышевидные грызуны. Реже поедает птиц, беспозвоночных, растительные корма. В степных районах и в предгорьях лисица часто преследует зайцев; не исключено, что она играет здесь существенную роль в сокращении их численности. В местах, где есть фазан, она может уничтожать в значительном количестве и эту ценную птицу.

Лисица на территории Краснодарского края — один из основных промысловых видов, особенно в равнинных районах. В горных районах роль ее менее существенна, хотя она и здесь важный объект промысла.

Учитывая общую высокую численность лисиц на территории Краснодарского края и вред, который они могутносить зайцам и фазанам, ежегодные заготовки шкурок этого зверя целесообразно увеличить в крае примерно до 15—17 тыс. На равнине, в местах разведения фазанов, охоту на лисиц необходимо проводить круглый год. В горах лисица по характеру своего питания может быть отнесена к полезным животным.

Течка у лисиц в горных условиях Северного Кавказа протекает с начала января по февраль; молодые рождаются в марте—апреле в количестве от 3 до 8 шт.

6. В результате акклиматизации енотовидной собаки охотугодия Краснодарского края пополнились новым промысловым видом. За прошедшие 20 с лишним лет с момента выпуска енотовидная собака расселилась почти по всей территории края, и в большинстве мест ее популяция достигла промысловой плотности. В настоящее время она добывается более чем в 50 районах края.

Енотовидных собак много в приазовских и приалагумских плавнях, где этот вид находит наиболее благоприятные места для своего обитания. В горных районах численность енотовидной собаки невелика; чаще всего зверь населяет здесь широколиственные леса предгорий, реже заходит в темнохвойный пояс (преимущественно в нижнюю и среднюю его части); выше 1500—1700 м

над уровнем моря, как правило, не встречается. Ниже всего численность енотовидной собаки на южном склоне Главного Кавказского хребта.

Учитывая сильно возросшую численность енотовидной собаки в ряде районов, расположенных вблизи Азовского моря, и возможность присоединения ее здесь ущерба охотничьей фауне, целесообразно заготовки шкур енотовидной собаки увеличить в этих местах в 2,5–3 раза. В горных районах, где енотовидную собаку считают полезным животным, а численность ее продолжает оставаться невысокой, следует сохранить лимитированный промысел этого зверя.

7. На территории Краснодарского края барсук встречается на равнинах и во всех районах, охватывающих предгорные и высокогорные ландшафты. Высокой численности нигде не достигает. Вертикальное распространение простирается от уровня моря до альпийских лугов включительно (2500 м). Однако верхние зоны гор не являются для барсука типичным местом обитания. Основные места обитания барсука приурочены к широколиственным лесам предгорий, где численность его выше всего.

Промыслового значения в крас барсук почти не имеет, так как охота на него из-за сравнительной малочисленности и дешевизны шкурки развита крайне слабо. Добывают барсука обычно кацканами и петлями, иногда подкарауливают у поры с ружьем или отстреливают случайно при охоте на других животных. Промысловой охоты на барсука с собаками не существует.

По ассортименту кормов барсук может быть причислен больше к полезным животным, чем к вредным. Получаемая от него продукция в виде шкуры, жира и вполне съедобного мяса представляет несомненную ценность. Поэтому к естественным запасам этого зверя необходимо бережное отношение.

Полезную роль в увеличении поголовья барсука в Краснодарском крае могут играть заказчики, организованные в предгорьях, и усиление борьбы с браконьерством. Заготовки барсука в крае в настоящий момент увеличивать не следует.

Зимний сон у барсуков Северо-Западного Кавказа продолжается сравнительно недолго. На северном склоне Главного хребта барсуки, в зависимости от метеорологических условий года, перестают быть активными с 20–25 ноября, иногда с декабря до середины — конца февраля (2,5–3 месяца). На южном склоне Главного хребта, в связи с более теплым климатом, отсутствием спелого покрова в предгорьях и т. п., основная часть барсуков активна в течение всего года.

8. На территории Краснодарского края выдра обитает в бассейне р. Кубани и почти во всех впадающих в Черное море горных реках. Отмечена она и плавнях Тишкского водохранилища и на морском побережье. Численность выдры всюду невелика. В предгорьях и горах встречается несколько чаще, чем на равнинах.

Распределение выдры по горным рекам точно совпадает с расположением форели, за которой она местами поднимается вверх до 2000 м над уровнем моря.

Основной пищей выдры на территории Краснодарского края, как и в других частях ее ареала, служит рыба, в горных реках преимущественно форель. Помимо рыб, выдра ловит лягушек, изредка душит водоплавающих птиц, кустарниковых полевок и поедает ягоды рябины.

Из-за малочисленности выдры промысел ее в Краснодарском крае развит слабо. Чаще всего зверька добывают при случайных встречах, стреляя из ружья. Некоторые охотники используют для отлова выдры капканы.

Охрана выдры путем создания заказников и заповедников в условиях Краснодарского края не принесет эффекта. Препятствием является общая низкая плотность популяции выдры по всей территории и невозможность сконцентрировать зверька на ограниченной площади.

Большое значение в сохранении и увеличении поголовья выдры на территории Краснодарского края может иметь целый запрет охоты на нее на 2—3 года, с последующим сокращением сроков охоты до 1—2 месяцев (декабрь—январь).

9. Кавказская лесная куница на территории Краснодарского края обитает преимущественно в горно-лесных районах. В небольшом количестве она встречается в островных лиственных лесах равнинной части края. В безлесных местах по равнине и в горах выше 2200—2400 м над уровнем моря ее нет.

Плотность поголовья лесной куницы снижается в направлении от горных мест обитания к равнине.

Для восстановления поголовья лесных куниц в Краснодарском крае большое значение имеет Кавказский заповедник, являющийся для них основным резерватом. Из заповедника в окружающие районы ежегодно расселяется большое количество молодняка лесных куниц, обогащая охотничьи угодья. Поэтому районы, примыкающие к заповеднику (4 района из 34, участвующих в промысле куницы), являются основными и типичными в отношении промысла куниц: они дают краю основную массу (от 45 до 56%) куницких шкурок.

Общее количество куниц (лесных и каменных) на территории Краснодарского края определяется примерно в 11,5—12 тыс. Заготовки куниц на территории края не должны превышать 3—3,5 тыс. шт.

10. Кавказская каменная куница, в отличие от лесной, меньше связана с высокоствольным глухим лесом. На территории Краснодарского края она обитает преимущественно в предгорных районах. В горы поднимается до средней части пояса темнохвойных лесов (1000—1200 м над уровнем моря); с удалением от предгорных районов к северу (в равнинной части края) ста-

новится редка. Плотность поголовья каменной куницы с подъемом в горы всюду уменьшается.

В целях обеспечения роста численности кавказской каменной куницы, целесообразно иметь заказники в предгорьях, в лесах широколиственной зоны, в Горяче-Ключевском, Северском, Абинском, Крымском, Анапском и Геленджикском районах. Одновременно они будут служить резерватами и для лесной куницы.

11. Наличие на территории Краснодарского края горностая и обыкновенного или черного хорька в достаточной мере не выяснено. По некоторым данным, горностай единичными экземплярами встречается в Псебайском и Адлерском районах, черный хорек — в Тульском, Северском, Туапсинском и Геленджикском районах. Однако сведения эти нуждаются в уточнении.

12. Степной или светлый хорек на территории Краснодарского края обычен в северных, равнинных районах. Подобно перевязке он предпочитает открытые степи, луга и залежи. Единичные экземпляры светлого хорька встречаются в лесах предгорий на северном склоне Главного хребта. В горы поднимается примерно на такую же высоту, как и перевязка (700—1000 м над уровнем моря). На южных склонах Главного хребта и на Черноморском побережье к юго-востоку от Анапы его нет.

13. На территории Краснодарского края норка распространена преимущественно в равнинных, степных районах. Обитает она здесь по берегам рек, ручьев, заросших тростником и кустарником, каналов оросительной системы и на рисовых полях. Реже поселяется по берегам крупных рек.

В горных районах норка встречается редко. Живет здесь по руслам рек с обрывистыми, лесистыми берегами. В горы поднимается до 1000—1500 м над уровнем моря.

В Краснодарском крае норка имеет промысловое значение. Ежегодные заготовки ее шкурок составляют в среднем более 1500 шт. Специально охотятся за норкой только в северных, равнинных районах края, где этот зверек наиболее многочислен. В предгорных и горных местах Краснодарского края специальной охоты на норку из-за ее малочисленности не ведется.

14. В Краснодарском крае ласка встречается в равнинных районах, предгорьях и горах. Промысел на нее не ведется. Численность ласки всюду довольно высокая. Местами обитания ее на равнине служат леса, где ласка предпочитает просеки и опушки, заросли кустарников, сады, огороды, поля. Широко населяет зверек также все растительные пояса гор, вплоть до альпийских лугов. Местами заходит здесь и в область вечных снегов (2900 м над уровнем моря).

Охота на ласку не может быть признана целесообразной из-за полезной деятельности этого зверька, заключающейся в уничтожении вредных для сельского и лесного хозяйства грызунов.

Кавказские ласки далеко не все подвержены обычной для севера СССР смене летней, темной окраски на зимнюю, чисто белую. В предгорьях с сравнительно мягкими и малоснежными зимами ласка в большинстве мест не белеет или белеет частично. Белые ласки встречаются преимущественно в среднегорных и высокогорных районах с более снежными и холодными зимами.

Осеннняя линька у ласок начинается в среднегорных и высокогорных районах обычно в конце ноября—декабре, заканчивается в январе. Весенняя смена волоссяного покрова происходит во второй половине марта—апреле. В конце марта нередки еще совершенно белые особи.

15. Перевязка принадлежит к типичным степным животным, поэтому на территории Краснодарского края она считается обычной только на равнине, преимущественно в северо-восточной части. Встречается зверек местами и в низких предгорьях северного склона Главного хребта. Селится здесь как на открытых участках, так и среди кустарников и даже в лесах по долинам рек.

На побережье Черного моря и южных склонах Главного хребта отсутствует.

В горы выше 700—1000 м над уровнем моря не проникает.

16. Кавказский лесной кот широко распространен по территории Краснодарского края; наибольшей плотности популяция достигает в лиственных лесах предгорий. С подъемом выше в горы численность повсеместно уменьшается. В незначительном количестве он обитает в лесах темнохвойного пояса и в крайне редких случаях заходит в субальпийские леса (до 1800—2000 м над уровнем моря). На территории Кавказского заповедника лесной кот встречается в периферийных районах. Роль заповедника в расселении этого хищника невелика. В равнинной части края лесной кот зарегистрирован в небольшом количестве всюду, где есть какие-либо участки леса, густые заросли терновника, камышевые крепи.

По своему значению для лесного хозяйства лесной кот может быть причислен к полезным животным. Он уничтожает большое количество мышевидных грызунов, служащих ему основным кормом. С точки зрения интересов охотничьего хозяйства высокая плотность популяции лесного кота в лесах Краснодарского края нежелательна, так как он может стать здесь серьезным конкурентом более ценных пушных зверей — куницы и лисицы, питающихся аналогичными кормами. Кроме того, в местах, заселенных фазанами и зайцами, коты могут наносить существенный вред охотниччьему хозяйству, а вблизи населенных пунктов — птицеводству и кролиководству.

Промысел лесного кота в Краснодарском крае носит в основном случайный характер. Основная масса шкурок этого хищника сдается охотниками-куничатниками, добывающими котов в

кулёмки и капканы, настороженные на куниц. Реже котов отлавливают в курятниках или при случайных встречах в лесу. Это приводит к недопромыслу лесных котов в крае. Заготовки лесных котов можно увеличить, по нашему мнению, примерно до 4,0—4,5 тыс. шт.

17. В Краснодарском крае рысь довольно широко распространена в лесной части предгорных и горных районов. Плотность популяции рыси на территории Кавказского заповедника и в прилежащих к нему урочищах составляет 0,3 экз. на 1000 га. В предгорных районах численность рыси незначительна. Относить ее здесь к хищникам, подлежащим истреблению в течение всего года, нет оснований¹. В заготовках пушнины шкурки рыси практически не имеют значения.

18. Численность леопарда на Западном Кавказе за последние 50 лет значительно сократилась. На территории Краснодарского края в настоящее время это крайне редкое животное. Периодически леопард заходит сюда с юго-востока; держится преимущественно в горах.

Учитывая большую редкость леопарда на Западном Кавказе и его привязанность к глухим горным районам, мы склонны привлечь внимание зоологов к вопросу об охране этого зверя. Исключение, несомненно, должны составить леопарды, нападающие на человека и подлежащие уничтожению.

19. Еноты-полоскуны в Краснодарском крае выпущены в 1951 г. с целью акклиматизации. К 1959 г. ими заселена территория площадью около 7000 км². Но эта площадь пока не является сплошным ареалом. Плотность популяции енотов в лучших для них участках не превышает 3,5 экз. на 1000 га. Условия для обитания енота в Краснодарском крае значительно хуже, чем в Азербайджанской ССР.

20. Заяц-русак на территории Краснодарского края распространен неравномерно. Наибольшая плотность наблюдается в северных степных и лесо-степных районах. Спорадически зайцы встречаются в поясе темнохвойного леса (вблизи населенных пунктов) и в субальпийском поясе. Плотность популяции зайцев на обследованной территории выше всего в Анапском, Крымском, Ярославском и Белореченском районах.

За последние годы численность зайцев в Краснодарском крае значительно сократилась. Причиной этому послужили неумеренный бесконтрольный отстрел и чрезвычайно многоснежная зима 1953/54 гг. Много зайцев гибнет от отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве.

В предгорных и горных районах заяц в заготовках пушнины занимает с 1-го по 11-е места. На первом месте в заготовках пушнины заяц стоит в Анапском районе.

¹ До 1959 г. охота на рысь в Краснодарском крае разрешалась в течение всего года, а с 1959 г. разрешена только с 1 ноября по 15 февраля.

21. В результате осуществленной в 1937 г. акклиматизации алтайской белки этот вид заселил все лесные районы Северо-Западного Кавказа. Теперь встречается как на северном, так и на южном склонах Главного Кавказского хребта.

Под влиянием новых условий обитания мех акклиматизированной белки значительно ухудшился.

Наибольшая плотность популяции белки наблюдается в восточных районах края: Лабинском, Псебайском, Тульском, Апшеронском и Адлерском.

В районах Черноморского побережья белка приносит значительный ущерб, уничтожая урожай фундука и греческого ореха; на отдельных участках сбор этих плодов стал менее эффективен.

Промысел белки в Краснодарском крае развит очень слабо. Белка в основном добывается лишь при случайных встречах; заготовки шкурок в крае можно увеличить до 70 тыс. шт.

22. Соня-полочек заселяет все лесные районы Краснодарского края, исключая высокогорные безлесные участки. Наибольшая плотность популяции отмечается в предгорьях в поясе широколиственных лесов.

Промысел сони-полочка в крас развит слабо. В большинстве районов вид совершенно не заготавливается. Количество добываемых полочек ежегодно уменьшается. Заготовку шкурок сони-полочки в крае возможно увеличить до 200 тыс. шт. в год. Полочка необходимо не просто добывать как промысловый вид, а уничтожать как вредителя.

23. Южная граница распространения слепыша проходит значительно южнее, чем указывалось до этого в литературе. Слепыш встречается в Абинском, Анапском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Лабинском, Отрадненском, Псебайском, Северском, Спокойненском, Туапсинском, Тульском и Ярославском районах Краснодарского края. Нет слепыша на южном склоне Главного Кавказского хребта.

24. Водяная крыса в Краснодарском крае распространена во всех удобных для обитания биотопах. Особенно много ее в плавнях Кубани и ее притоков.

Промысел развит неудовлетворительно. В год по Краснодарскому краю заготавливается до 120 тыс. шкурок этого вида; заготовку их можно довести до 1 млн. шт.

25. За последние годы численность кабана в Краснодарском крае значительно сократилась. Причиной этому, помимо неумеренного промысла, была также эпизоотия, охватившая большинство районов края, и суровые многослойные зимы, последовавшие за эпизоотией.

Введение лицензионной охоты на кабана не дает должного эффекта, так как в крае, особенно в глухих горных районах, сильно развито браконьерство. Браконьеры бьют кабанов не только без лицензий, но и в течении всего года.

Наибольшая плотность популяции кабана наблюдается в прилежащих к Кавказскому заповеднику урочищах, но и здесь она не превышает 6 голов на 1000 га.

Зная, что кабану свойственны широкие перекочевки, следует признать, что создание заказников не может способствовать увеличению численности этого вида. Для сохранения кабана, как интересного объекта спортивной охоты, и увеличения численности этого вида необходимо на несколько лет запретить охоту на него в предгорных и горных районах. В плавнях охоту на кабана запрещать не следует.

26. В Краснодарском крае косуля распространена по всем предгорным и горным районам. За последние годы численность ее всюду значительно сократилась. Особенно пагубной для косули оказалась чрезвычайно многоснежная и продолжительная зима 1953/54 гг. Огромное количество беспомощных животных погибло от собак и браконьеров.

Плотность популяции косуль даже в наиболее отдаленных от населенных пунктов местах теперь не превышает 10 голов на 1000 га.

27. Ареал олена в Краснодарском крае по сравнению с 1900-ми годами значительно сократился. В восточной части края олень распространен только на северном макросклоне Главного Кавказского хребта и лишь в последние годы стали отмечаться заходы животных в зимнее время на южный макросклон. Западный предел распространения олена проходит у станицы Натухаевская Анапского района.

До сих пор в крае имеет место браконьерство, отстрел оленей на местах зимовок, особенно вблизи границ Кавказского заповедника. Для более эффективной охраны необходимо создание в этих районах заказников с надлежащим штатом охраны и привлечение к охране оленей персонала охраны заповедника.

28. Основная область распространения серны на Северо-Западном Кавказе в настоящее время ограничена территорией заповедника, где плотность популяции ее довольно значительна. На некоторых участках заповедника плотность популяции достигает 131,3 экз. на 1000 га. Западнее заповедника серна встречается в отдельных изолированных группах от друга участках. Численность ее здесь всюду низкая, вследствие постоянного преследования браконьерами.

Для восстановления численности серни необходимо усилить охрану этих животных, а на отдельных участках создать заказники.

29. Арсал западнокавказского тура в Краснодарском крае за последние 50 лет существенно не изменился. Туры обитают только в высокогорных частях Псебайского, Тульского и Адлерского районов, в основном на территории Кавказского заповедника.

Крайние западные пункты распространения тура — горы Абато, Атамажи и Чугуш. Северным пределом распространения являются горы Дзюя и Ачешбок. За пределами заповедника туры в небольшом количестве встречаются на горе Агепста (Адлерский район) в верховьях р. Мzymты.

Наибольшая плотность популяции туров отмечается на горах Джуга, Джемарук, Тыбга, Алоус, Ятыргварты, Трю и на хребтах Малые и Большие Балканы. На отдельных участках в летнее время плотность популяции достигает 342 голов на 1000 га.

30. В результате направленной племенной работы, изменения условий содержания и влияния внешней среды на Кавказе восстановлен зубр, приближающийся к типу горного зубра. Положительно разрешен вопрос о переходе зубров к одичанию. В настоящее время зубры выходят далеко за пределы заповедника. Для более эффективной охраны их вне заповедника целесообразно создать по его границам, в местах выходов зубров, специализированные спортивные охотничьи хозяйства. При надлежащей охране здесь через несколько лет можно будет проводить лицензионный отстрел оленей, косуль, а также некоторых выбракованных зубров-самцов.

31. В Краснодарском крае заготавливается пушнина на сумму около 200 тыс. руб. Около 60% от этой суммы составляет пушнина, добываясь в предгорных и горных районах. В целом по краю в заготовках в ценностном выражении первое место занимает куница, на втором и третьем месте стоят крот и лисица.

Выход пушкины с 1000 га площади в предгорных и горных районах края достигает 100 руб., что значительно выше, чем в северных и таежных районах нашей страны.

В целях упорядочения организации промысла в Краснодарском крае назрела необходимость коренной перестройки всей системы планирования заготовок. Считаем, что практика, когда одна и та же организация, в частности Крайпотребсоюз, занимается планированием промысла и заготовкой продукции, не может считаться нормальной. В настоящее время планирование промысла в крае осуществляется Крайпотребсоюзом без учёта запасов промысловых животных. Контрольные цифры заготовок на очередной год даются или по итогам заготовок предыдущего года или с некоторым превышением. Состояние же численности животных при этом не учитывается, так как таких данных не имеется.

Контроль за состоянием численности промысловых животных и их систематический учет возлагается на Госохотинспекцию. Но при существующем штате специалистов для Госохотинспекции это непосильная задача (имеется только 1 охотовед). Данные учётов по егерским участкам для большинства видов животных не соответствуют действительности.

Наиболее целесообразным надо считать сосредоточение вопросов планирования заготовок и учёта животных в ведении одной организации, не связанной с заготовкой продукции охотничьего промысла. Эта же организация обязана осуществлять строгий контроль за выполнением плана заготовок. При этом перевыполнение плана не может быть допустимым для видов, плотность популяции которых является нормальной или ниже нормального уровня. Планирование должно быть для каждого отдельного вида с учетом нормального воспроизводства и использования максимально возможного количества.

ЛИТЕРАТУРА

- Анаков Г. Алтайская белка в лесах Грузии. «Охота и охотничьи хозяйства», № 6, 1957.
- Александров В. Н. К изучению естественного питания зубров в Кавказском заповеднике. Тр. Кавказского гос. заповедн., в. 4, 1958.
- Алиев Ф. Ф. Результаты акклиматизации онота *Riocyon lotor* L. в Кубачинской долине. Докл. АН Азерб. ССР, т. 12, № 1, 1956.
- Андреевский М. В. Охотничьи записки и дневники, 1909.
- Аренс Л. Е. О влиянии заповедности на охотничьи-промышленную фауну Тебердинского заповедника и прилегающих районов. Тр. Тебердинского гос. заповедн., т. 1, 1957.
- Банников А. Кавказский гур и его гибриды. «Охота и охотничьи хозяйства», № 1, 1959.
- Бёме Л. Б. К биологии животных Северного Кавказа, Владикавказ, 1925.
- Бёме Л. Б. Цикл жизни Северо-Кавказского края. Пятигорск, 1936.
- Бобринский Н. А. Дикие кошки СССР. М., 1932.
- Буши Н. А. Ботанико-географический очерк Кавказа. М.—Л., 1935.
- В. А. Как добывают крота на севере Кавказа. «Охотник», № 12, 1930.
- Васильев Я. К. Черноморский округ в охотничьем отношении. «Природа и охота», май, 1893.
- Васильев Я. К. Предельные линии распространения в Кубанско-Черноморском районе красного зверя и птицы. «Природа и охота», февраль, 1896.
- Верещагин Н. К. Нутряк и ее акклиматизация в СССР. «Український зоологічний та рибальський», № 9—10, 1930.
- Верещагин Н. К. Охотничьи и промысловые животные Кавказа. Баку, 1947.
- Верещагин Н. К. Млекопитающие Кавказа. Животный мир СССР, т. 5. Горные области Европейской части СССР, М.—Л., 1958.
- Верещагин Н. К. Млекопитающие Кавказа. (История формирования фауны). М.—Л., 1959.
- Воршин А. А. и Реброва Е. И. Пособие для организатора охотничьего промысла. М., 1950.
- Владимирская М. И., Лебедев В. Д., Насимович А. А. Новые данные по экологии видов. «Бюллетень МОИП». Отд. биол., т. 58, № 3, 1953.
- Воронцов-Вельяминов Б. О животных Малого Карабая. «Охотник», № 11, 1929.
- Волжинский Л. Биологические основы сезонного стандарта шкурок крота. «Пушное дело», № 4, 1927.
- Гвоздецкий Н. А. Физическая география Кавказа. Курс лекций. Вып. I. Общая часть. Большой Кавказ. 1954; Вып. II. Предкавказье, Закавказье. 1953. Изд-во МГУ.
- Гентнер В. Г. Зайцы, М., 1938.
- Гентнер В. Г., Насимович А. А. и Банников А. Г. Млекопитающие Советского Союза, т. 1. Парнокопытные и непарнокопытные. М., 1961.

- Гептнер В. Г. и Формозов А. И. Млекопитающие Дагестана. Сб. тр. Гос-
зоологического музея МГУ, т. 6, 1941.
- Герасимова М. А. Влияние внешней среды на мех белки и зайца-русака в
процессе акклиматизации. Третья экологическая конференция. Тезисы докла-
дов, ч. III. Изд-во Киевского гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко, 1951.
- Герасимова М. А. Изменчивость качества меха белки-телеутки и алтайской
белки, акклиматизированных в Крыму и на Северном Кавказе. Вопросы то-
вароведения пушнино-мехового сырья. Тр. ВНИО, № 15, 1955.
- Глиоза Г. Добыча кабана. «Охота и охотничье хозяйство», № 4, 1956.
- Грудзинская И. А. Широколиственные леса предгорий Северо-Западного
Кавказа. Сб. Широколиственные леса Северо-Западного Кавказа, М., 1953.
- Данилевский С. Серна. «Бюсси-охотник», № 10, 1936.
- Данилов Д. П. и Лавыдов М. М. Из опыта передовых охотников. М., 1951.
- Двойченко Г. Г. Пушные и промысловые звери Ставрополья. Ставрополь, 1955.
- Депарма Н. К. Крот, М., 1951.
- Депарма Н. К. Особенности строения полового аппарата и биологии раз-
множения европейских и сибирских кротов. Тр. ВНИО, в. 13, 1953.
- Депарма Н. К. К методике определения возраста кротов. Бюлл. МСИГ,
 отд. биол., т. 59, в. 6, 1954.
- Депарма Н. К. Крот. «Охота и охотничье хозяйство», № 3, 1956 а.
- Депарма Н. Охотничье хозяйство Канады. «Охота и охотничье хозяйство»,
 № 2, 1956 б.
- Депарма Н. К. Система закрепления охотничих угодий за трапперами в
Канаде. Сб. «Рационализация охотничьего промысла», в. 5, 1956 в.
- Депарма Н. К. Охотничье хозяйство в США. Сб. «Рационализация охот-
ничьего промысла», в. 6, 1957.
- Депарма Н. К. О новой форме крота Сев.-Зап. Кавказа. Бюлл. МОИП,
 отд. биол., т. 64, в. 6, 1959.
- Динесман Л. Г. Вредная деятельность кошачьих в лесхозах СССР. Сб.
 «Роль диких кошачьих животных в лесном хозяйстве» (Сообщения Институ-
 та леса АН СССР, в. 13), 1959.
- Динник Н. Я. Из путешествия по Западному Кавказу. «Природа и ох-
 та», декабрь, 1893.
- Динник Н. Я. Оштен и окружающие его части Кубанской области. Записки
 Кавказского отд. Русского геогр. об-ва, т. 16, 1894.
- Динник Н. Я. Кубанская область в верховых рек Уруштена и Белой. Записки
 Кавказского отд. Русского геогр. об-ва, кн. 19, 1897.
- Динник Н. Я. Рыси и пантеры в горах Западного Кавказа. «Природа и
 охота», кн. 2, 1898.
- Динник Н. Я. Млекопитающие горной полосы Кубанской области. Мате-
 риалы к познанию фауны и флоры Российской империи, отд. зоологический,
 в. 5, 1901.
- Динник Н. Я. На горах Западного Кавказа. «Природа и охота», № 4–7,
 1902.
- Динник Н. Я. Кавказский олень. Материалы к познанию фауны и флоры
 Российской империи, отд. зоологический, в. 6, 1904.
- Динник Н. Я. Истребление дичи в горах Кубанской области. «Природа и
 охота», кн. 10–11, 1909 в.
- Динник Н. Я. Кавказские каменные козлы или туры. Материалы к познанию
 фауны и флоры Российской империи, отд. зоологический, в. 9, 1909 б.
- Динник Н. Я. Звери Кавказа. Ч. I. Записки Кавказского отд. Русского
 геогр. об-ва, кн. 27, п. 1, 1910.
- Динник Н. Я. Звери Кавказа. Ч. 2. Записки Кавказского отд. Русского
 геогр. об-ва, кн. 27, п. 2, 1911.
- Дмитриев В. В. Кошачьи звери Алтайского заповедника и прилежащих
 мест (Восточный Алтай и Западные Саяны). Тр. Алтайского гос. заповедника, п.
 1, 1938.

Донауров С. С., Попов В. К. и Хонякина З. П. Сопля-полочек в районе Кавказского государственного заповедника. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 1, 1938.

Донауров С. С. и Теплов В. П. Кабан в Кавказском заповеднике. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 1, 1938.

Дулькейт Г. Д. Значение рыси и росомахи как хищников в природном комплексе алтайской тайги. Сб. «Преобразование фауны позвоночных нашей страны» (Биотехнические мероприятия), 1953.

Дьячков-Тарасов А. Н. Гагры и их окрестности. Записки Кавказского отд. Русского географического об-ва, кн. 24 в, 1, 1903.

Елагин И. Н. Грушевые леса Северо-Западного Кавказа. М., 1951.

Елагин И. Н. Дубовые леса крайней западной части северного склона Кавказского хребта. Сб. «Широколистственные леса Северо-Западного Кавказа», М., 1953.

Жарков И. В. Материалы к изучению роли хищных птиц в Кавказском заповеднике. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 1, 1938.

Жарков И. В. Результаты учета животных в Кавказском заповеднике в 1939 году. Научно-метод. зап. Гл. упр. по заповедн., в. 7, 1940.

Жарков И. В. Методы учета численности копытных в заповедниках РСФСР. Научно-метод. зап. Гл. упр. по заповедн., в. 13, 1949.

Жарков И. В. Основные методы учета диких копытных животных. Сб. «Методы учета численности и географического распределения наземных позвоночных». 1952.

Жарков И. В. Суровая зима 1955—1956 гг. и ее влияние на оленей Воронежского заповедника. Тр. Воронежского гос. заповедни, в. 7, 1957.

Жарков И. В. О взаимоотношении серни с домашними животными на высокогорных пастбищах Северо-Западного Кавказа. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 5, 1959.

Зиссер В. П. Развитие охотничьего хозяйства в Чукотском национальном округе. Сб. «Рационализация охотничьего промысла», в. 5, 1956.

Зыков И. Косуля. «Охота и охотничье хозяйство», № 6, 1956.

Инякова А. П. К вопросу о численности и распределении охотничьепромысловых животных в Тебердинском заповеднике (1953—1955 гг.). Тр. Тебердинского гос. заповедни, т. I, 1957 а.

Инякова А. П. Опыт содержания серни Rupicapra rupicarpa caucasica Lyd в неволе. Тр. Тебердинского гос. заповедни, т. I, 1957 б.

Каверзnev В. Н. Полорогие фауны СССР и их добывание. М., 1933.

Казневский П. Ф. Взаимоотношение леса и настоящих оленей в заповедниках СССР. Сб. «Роль диких копытных животных в лесном хозяйстве». (Сообщения Института леса АН СССР, в. 13). 1959.

Калугин С. Г. Зубры в естественных условиях Кавказского заповедника. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 4, 1958.

Котов В. Белка в Краснодарском крае. «Охота и охотничье хозяйство», № 10, 1956.

Котов В. А. Белка и охота на нее в Краснодарском крае. Майкоп, 1957 а.

Котов В. Промысел пушных зверей. «Охота и охотничье хозяйство», № 9, 1957 б.

Котов В. А. Питание рыси в Кавказском заповеднике. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 4, 1958 а.

Котов В. А. Результаты акклиматизации алтайской белки в Краснодарском крае. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 4, 1958 б.

Котов В. А. К вопросу о расселении спота-полоскула в Краснодарском крае. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 5, 1959 а.

Котов В. А. Распространение благородного олена в Краснодарском крае. Тр. Кавказского гос. заповедн., в. 5, 1959 б.

Котов В. А. Количественный учет турлов в Кавказском заповеднике и некоторые вопросы их экологии. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 6, 1960 а.

Котов В. А. Самоловы для отлова турлов и серни. Тр. Кавказского гос. заповедни, в. 6, 1960 б.

- Котов В. А.* Количественный учет серн в Кавказском заповеднике. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 6, 1960 в.
- Котов В. А.* Искусственные голонцы Кавказского заповедника. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 6, 1960 г.
- Котов В. А. и Рябов Л. С.* Скращивание полка с собакой. «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1959.
- Краткий*. Восемнадцать дней на охоте. «Природа и охота», декабрь, 1894.
- Круглогорский П.* О молодняке оленей. «Охота и охотничье хозяйство», № 8, 1959.
- Кузнецов Б. А.* Основы товароведения пушно-мехового сырья. М., 1952.
- Курилова М. В. и Степанов И. Н.* Акклиматизация алтайских белок в Тебердинском заповеднике. Научно-метод. зас. Гл. упр. по заповедям, а. б., 1910.
- Куропанова М. В. и Степанов И. Н.* Алтайская белка на Кавказе. «Природа», № 2, 1911.
- Лавров И. И.* Географическое распространение, биология и хозяйственное значение косули в СССР. Тр. по лесному охотнику делу. Центр. лесная опытная станция, отд. биологии и промысловой охоты, в. 6. 1929.
- Лавров И. П.* Пушные ресурсы Краснодарского края. Бюлл. научно-технической информации Научно-исследов. ин-та животного сырья и пушин, в. 1, 1958.
- Ларин Б. А.* Зайцы. М., 1950.
- Ларин С. А.* Охотничья таксация и промысловая разведка. Сб. «Спутник промыслового охотника». М., 1954.
- Лебедева Л. С.* Экологические особенности кабана Беловежской пущи. Ученые записки Московского городского пед. ин-та им. В. И. Потемкина, т. 61, 1956.
- Лерхе А. В.* Дикие звери Северного Кавказа. Ростов-на-Дону, 1933.
- Ловецкий П.* Встречи с леопардами. «Охота и охотничье хозяйство», № 2, 1956.
- Логинов В. В.* Новые данные к познанию биологии кавказского кабана (*Sus scrofa caucasica Thomas*). Бюлл. МОИП, отд. биолог., т. 45, п. 1, 1936.
- Логинов В. В.* Очерк экологии кавказского крота из Западного Кавказа. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 3, 1919.
- Львов И.* Биотехника в лесо-охотниччьем хозяйстве. «Охота и охотничье хозяйство», № 11, 1959.
- Лялин Ф. А.* Хорек и добыча его. М., 1933.
- Максимов А. А.* Географическое распространение и ландшафтно-экологическая структура ареала подиальной красмы. Докл. АН СССР, т. 109, в. 2, 1956.
- Мантефель П. А.* Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах. Сб. «Спутник промыслового охотника», М., 1954.
- Мантефель П.* Зайцы. «Охота и охотничье хозяйство», № 11, 1957.
- Мантефель П.* Жизнь животных зимой. «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1958.
- Марков Е. Л.* Охотничье-промышленные животные Лагодехского заповедника. Тбилиси, 1938.
- Медадзе Л. Д.* К вопросу акклиматизации алтайской белки (*Sciurus vulgaris altaicus Serebr*) в Грузинской ССР. Третья экологическая конференция, темы докладов, ч. 3. Изд-во Киевского гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко, 1954.
- Машин И.* О соловцах. «Охота и охотничье хозяйство», № 2, 1958.
- Навозова Ф.* Краснодарский край. Краснодар, 1955.
- Насимович А. А.* Ципамника запасов благородного оленя в Кавказском заповеднике. Тр. Показательного Кавказского гос. заповедника, т. 1, 1936 а.
- Насимович А. А.* Охота на крупную дичь в горах Черноморского Кавказа. «Бюлл. охотники», № 11, 1936 б.
- Насимович А. А.* О некоторых закономерностях зимнего распространения кошачьих в горах Западного Кавказа. Бюлл. МОИП, отд. биолог., т. 45, в. 1, 1936 в.

- Насимович А. А.* К познанию минерального питания диких животных Кавказского заповедника. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 1, 1938.
- Насимович А. А.* Зима в жизни копытных Западного Кавказа. Вопросы экологии и биотехнологии, № 7, 1939.
- Насимович А. А.* Сезонные миграции и некоторые другие особенности биологии бурого медведя на Западном Кавказе. Научно-метод. записки Гл. упр. по заповеди, в. 7, 1940 а.
- Насимович А. А.* К методике количественного учета поголовья туров. Научно-метод. записки Гл. упр. по заповеди, в. 7, 1940 б.
- Насимович А. А.* Барс на Западном Кавказе. Природа и социалистическое хозяйство, т. 8, 1941 а.
- Насимович А. А.* Количественный учет серы и динамика их поголовья в Кавказском заповеднике. Научно-метод. записки Гл. упр. по заповеди, в. 8, 1941 б.
- Насимович А. А.* Очерк экологии западно-кавказского тура. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 3, 1949 а.
- Насимович А. А.* Новые данные по биологии серны на Западном Кавказе. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 3, 1949 б.
- Насимович А. А.* Об организации заповедника высокогорной природы Центрального Кавказа. «Охрана природы», № 11, 1950.
- Насимович А. А.* Количественный учет росомахи, медведей и зверей из семейства кошачьих. Сб. «Методы учета численности и географического распределения наземных позвоночных». 1952.
- Насимович А. А.* Роль режима снежного покрова в жизни копытных животных на территории СССР. М. — Л., 1955.
- Насимович А. А. и Рудановский В. Я.* Заготовка мяса диких животных. М., 1935.
- Новиков Г. А.* Европейская норка (издание Ленинградского гос. ун-та). Л., 1939.
- Новиков Г. А.* Хищные млекопитающие фауны СССР. М. — Л., 1956.
- Образцов Б.* О серне в Геленджикском лесничестве. «Охрана природы», № 1, 1930.
- Огнев С. И.* Материалы к изучению млекопитающих Кавказа. Ученые зап. Сев.-Кавк. ин-та краснодария, т. 1. Владикавказ, 1926.
- Огнев С. И.* Звери Восточной Европы и Северной Азии, т. 1. М. — Л., 1928.
- Огнев С. И.* Звери Восточной Европы и Северной Азии, т. 2. М. — Л., 1931.
- Огнев С. И.* Звери СССР и прилежащих стран, т. 3. М. — Л., 1935.
- Огнев С. И.* Звери СССР и прилежащих стран, т. 5. М. — Л., 1947.
- Огнев С. И.* Звери СССР и прилежащих стран, т. 6. М. — Л., 1948.
- Орлов А. Я.* Темнохвойные леса Северного Кавказа. М., 1951.
- Орлов А. Я.* Буковые леса Северо-Западного Кавказа. В сб. «Широколиственные леса Северо-Западного Кавказа». М., 1953.
- Павлинин В. Н.* Размножение и сроки промысла крота на Урале. Зоологический журнал, т. 35, в. 4, 1956.
- Павлова Е. А.* Инструкция о порядке пропедевния пробных отстрелов пушных зверей. М., 1947.
- Павлова Е. А. и Голубева В. С.* О рациональных сроках охоты. «Охотничий промысел», № 1, 1938.
- Пастернак Ф. А.* Материалы к систематике и биологии косули. Ученые зап. Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина, т. 38, 1955.
- Подстаканчик А. М.* Половой цикл обыкновенного крота *Talpa europaea* L. Ученые зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина, т. 40, 1947.
- Радде Г. И.* Коллекции Кавказского музея, т. 1, зоология, Тифлис, 1899.
- Рахманин Г. Е.* Охота на зайцев. М., 1951.
- Розанов М.* Промысел крота в Майкопском округе. «Пушное дело», № 13—14, 1928.
- Розмахов И. Г.* К проблеме минерального питания диких животных Кавказского заповедника. Научно-метод. зап. Гл. упр. по заповеди, в. 7, 1940.

- Россиков К. Н. В горах Северо-Западного Кавказа. Известия русского географ. об-ва, т. 26, в. 4, 1890.
- Руковский Н. Н. Акклиматизация енота (*Procyon lotor* L.) в Азербайджанской ССР. Тр. ВНИО, в. 9, 1950.
- Руковский Н. Н. К размножению лесной кошки на Кавказе. Бюллетень МОИП, отд. биолог., т. 60, № 4, 1955.
- Руковский Н. Н. Современное распространение алтайской белки на Кавказе. Вопросы биологии пушных зверей. Тр. ВНИО, в. 16, 1956.
- Руковский Н. Н. Современный и «возможный» ареал енота-полоскуна (*Procyon lotor* L.) в СССР. Сб. «Проблемы зоогеографии суши». Изд. Львовск. ун-та, 1958 а.
- Руковский Н. Н. Современное распространение енота-полоскуна в СССР и перспектива его дальнейшего расселения. Бюллетень научно-техн. информации Всесоюзного научно-исслед. ин-та животного сырья и пушнины, в. 3, 1958 б.
- Рябов Л. С. Биология кавказской лесной куницы и ее промысел в горных лесах Краснодарского края. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 4, 1958 а.
- Рябов Л. С. Некоторые морфологические и экологические данные о кавказской каменной куница. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 4, 1958 б.
- Рябов Л. С. Кавказская лесная и каменная куница в Краснодарском крае (материалы по распространению, динамике заготовок шкурок и району супортной деятельности). Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 5, 1959.
- Саблина Т. Б. Копытные Беловежской пущи. Тр. Ин-та морфологии животных им. А. Н. Северцова, в. 15, 1955.
- Савельев П. А. Туры и серны в Кавказском заповеднике. «Природа», № 3, 1960.
- Сатунин К. А. Млекопитающие степей Северо-Восточного Кавказа. «Природа и охота», кн. 8, 1902.
- Сатунин К. А. Млекопитающие Кавказского края, т. 1. Тифлис, 1915.
- Северцов С. А. и Саблина Т. Б. Олень, косуля и кабан в заповеднике Беловежская пуща. Тр. Ин-та морфологии животных им. А. Н. Северцова, в. 9, 1953.
- Селянинов Г. Т. Общий очерк климата Черноморского побережья Кавказа. «Курортное дело», № 6, 1926.
- Скалон В. Н. Задачи охотниччьего хозяйства в свете решений XXI съезда КПСС. Зоологический журнал, т. 38, в. 8, 1959 а.
- Скалон В. Н. Охотоведческое образование в СССР. Известия Иркутского с.-х. ин-та, в. 10, 1959 б.
- Слепов Е. Охотничьи-промышленные звери и птицы Кубани. Краснодар, 1956.
- Соколов А. Необоснованное планирование. «Охота и охотничье хозяйство», № 8, 1959.
- Соколов И. И. Опыт естественной классификации семейства полорогих (Bovidae). Тр. Зоологического ин-та АН СССР, т. 14, 1953.
- Соколов И. И. Копытные звери (отряды Perissodactyla и Artiodactyla) Фауны СССР. Млекопитающие, т. 1, в. 3. М.—Л., 1959.
- Солнышков Б. Простейшие мероприятия. «Охота и охотничье хозяйство», № 8, 1958.
- Соснин Л. И. Типы леса Кавказского государственного заповедника. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 2, 1939.
- Старосивильский А. Охота на оленей на рев. «Природа и охота», июнь, 1893.
- Стегайлов В. В трудную пору. «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1959.
- Тембатов А. К. Горностай с Центрального Кавказа. Бюлл. МОИП, отд. биолог., т. 65, в. 5, 1960.

- Теплов В. П. Волк в Кавказском заповеднике. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 1, 1938 а.
- Теплов В. П. Материалы по биологии дикого кота (*Felis silvestris caucasica* Sat). в условиях Кавказского заповедника. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 1, 1938 б.
- Теплова Е. И., Теплов В. П. Млекопитающие Петрово-Быльческого заповедника. Тр. Петрово-Быльческого заповедника, в. 5, 1947.
- Трущалова П. М. Материалы по акклиматизации и биологии енотовидной собаки на Северном Кавказе. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 5, 1959.
- Турова С. С. Опыт систематического обзора млекопитающих Осетии. Уч. зап. Северо-Кавказского ин-та краеведения, т. 1, Владикавказ, 1926.
- Устин-Петров Г. Ф. Краснодарский край. В. сб. «Северный Кавказ», М., 1957.
- Федосов А. В. Особенности биологии и экологии кавказского волка и борьба с ним в Кавказском заповеднике. Научно-метод. зап. Гл. упр. по заповедям, в. 1, 1938.
- Фолигарек С. С. Опыт передовых охотников в Западной Сибири по съемке и правке шкурок водяной крысы. Сб. «Рационализация охотниччьего промысла», в. 5, 1956.
- Формозон А. Н. О возможности акклиматизации белки в кубанских лесах Кавказа. «Пущное дело», № 6, 1930.
- Хонякина З. П. Материалы по питанию лисицы в Кавказском заповеднике. Тр. Кавказского гос. заповедника, в. 1, 1938.
- Чашин С. П. Лесная куница Камского Предурала и ее промысловое значение. Автореферат диссертации на соискание учченой степени кандидата биологических наук, 1956.
- Чернявская С. И. Сезонное размещение и кочевки диких копытных и медведя в районе Кавказского заповедника в связи с распределением урожая плодов фруктарников и орехополос. Бюллетень МОИП, отд. биолог., т. 61, в. 4, 1956.
- Шиллов И. А. Особенности распределения и образ жизни водяных крыс в разных природных условиях. Бюлл. МОИП, отд. биолог., т. 60, в. 4, 1955.
- Шильдер В. А. Кубанская охота. «Природа и охота», № 1—12, 1902.
- Шифферс Е. В. Растительность Северного Кавказа и его природные коромыслы угодья. М. — Л., 1953.
- Щукан И. Очерки морфологии Кавказа. Труды Научно-исслед. ин-та географии, в. 2, М., 1926.
- Эквтимишвили З. С. Распределение туров и серн по зонам в разные периоды года на территории Тебердинского заповедника. Сообщения АН Груз. ССР, т. 14, № 3, 1953.
- Эквтимишвили З. С. О сроках окота у тура Северцова и серны. Тр. Ин-та зоологии АН Груз. ССР, т. 13, 1954.
- Юргенсон П. Б. Выдра. М., 1931.
- Юргенсон П. Б. Хорьки. М., 1932.
- Юргенсон П. Б. К экологии рыси в лесах средней полосы СССР. Зоологический журнал, т. 34, в. 3, 1955.
- Янушко П. А. Образ жизни крымских оленей и их влияние на естественное лесовозобновление. Тр. Крымского гос. заповедника им. В. В. Куйбышева, т. 4, 1957 а.
- Янушко П. А. Строение и физиологические изменения половых желез крымских оленей в различные сезоны года. Тр. Крымского гос. заповедника им. В. В. Куйбышева, т. 4, 1957, б.
- Янушко П. А. Динамика численности крымских оленей. Зоологический журнал, т. 37, в. 8, 1958.
- Ястребов К. Почему спала добыча крота? «Охота и охотничье хозяйство», № 6, 1957.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Промеры волка и шакала, добытых в Краснодарском крае
(линейные промеры указаны в мм, вес — в г)

Промеры	Волчица февраль 1959 г.	Шакал- самец, 15/IV 1958 г.
Живой вес	3 8800	—
Длина тела	1160	790
Длина хвоста	310	215
Длина задней ступни	230	155
Высота уха	115	79
Ширина уха у основания	70	—
Вес легких с трахеей	425	106
Вес сердца	243	83
Вес почек	625	417
Вес двух почек	180	45,5
Вес селезенки	95	20,5
Вес желудка без содержимого	220	71,5
Вес внутреннего жира	1380	—
Длина пищевода	450	—
Длина кишечника	5160	—

Таблица 2

Промеры лисиц взрослых самцов, добытых в Краснодарском крае
(линейные промеры указаны в мм, вес — в г)

Промеры	Дата и место добычи			
	15.V-1954 г. Кавказский заповедник	29.III-1957 г. Кавказский заповедник	1.V-1957 г. Кавказский заповедник	XII-1959 г. окрестности Гузерилья
Длина тела	-	690	630	620
Длина хвоста	-	450	400	400
Количество хвостовых позвонков	-	-	-	20
Высота уха	-	98	89	-
Длина задней ступни	-	175	155	-
Общая длина черепа	147	-	-	136,4
Основная длина черепа	134	-	-	122,4
Кондилобазальная длина	141,6	-	-	130,0
Скуловая ширина	79,4	-	-	72,4
Межглазничная ширина	32,0	-	-	29,0
Ширина между концами надглазничных отростков	42,2	-	-	37,7
Заглазничная ширина	23,1	-	-	24,0
Наибольшая ширина черепа	50,7	-	-	49,3
Высота в области <i>bullae osseae</i>	51,0	-	-	48,7
Длина черепной коробки	60,0	-	-	56,0
Длина среднего шва <i>nasalia</i>	53,5	-	-	49,0
Наибольшая длина носовых костей	56,0	-	-	52,2
Ширина их спереди	13,0	-	-	10,0
Ширина черепа над крыльями	24,4	-	-	22,5
Длина твердого нёба	73,3	-	-	67,0
Длина задней нёбной вырезки	25,6	-	-	23,0
Поперечный диаметр глазницы	24,0	-	-	22,5
Длина <i>bullae osseae</i>	22,0	-	-	20,5
Ширина <i>bullae osseae</i>	12,4	-	-	12,3
Расстояние между <i>bullae osseae</i>	10,0	-	-	9,8
Наибольший диаметр наружного слухового отверстия	6,2	-	-	-
Ширина носового отверстия	15,0	-	-	12,2
Высота носового отверстия	17,7	-	-	17,2
Ширина затылочного отверстия	17,0	-	-	16,2
Высота затылочного отверстия	13,0	-	-	11,4
Мастоидная ширина	48,0	-	-	47,0
Длина лицевого отдела	88,5	-	-	86,0
Длина верхнего ряда зубов	65,0	-	-	63,0
Высота верхнего клыка	19,0	-	-	19,0
Длина верхнего хищнического зуба	15,0	-	-	15,0
Высота верхнего хищнического зуба	8,3	-	-	-
Длина нижнего ряда зубов	71,5	-	-	67,5
Наибольшая высота затылочного гребня	6,0	-	-	4,7
Наибольшая высота сигиттального гребня	5,0	-	-	4,0
Высота черепа без нижней челюсти	53,2	-	-	41,0

Дата и место добычи

Промеры

	15/V-1954 г., Кавказский заповедник	29/III-1957 г., Кавказский заповедник	1/IV-1957 г., Кавказский заповедник	XII-1958 г., окрестности Гузериплья
Вес нижней челюсти	26,2	-	-	20,0
Объем мозговой капсулы (в см ³)	54,0	-	-	51,0
Длина os penis	-	-	-	54,0
Наибольшая ширина os penis	-	-	-	4,3
Вес os penis	-	-	-	0,3

Таблица 3

**Результаты обработки взрослых самцов-морок, добытых на территории
Краснодарского края**
(линейные промеры указаны в мм, вес — в г)

Вес и промеры	Дата и место добычи		
	7/V 1953 г. р. Кина	26/III 1955 г. р. Рыбная	1/IV 1958 г. Красный лес
Общий вес	615	886	880
Длина тела	410	385	435
Длина хвоста	170	164	170
Количество хвостовых позвонков	—	—	20
Высота уха	22,7	20,1	20,3
Длина задней ступни	60,4	60,3	60,7
Площадь подошвы передней лапы (в см ²)	6,47	—	5,75
Площадь подошвы задней лапы (в см ²)	6,91	—	7,19
Площадь четырех лап (в см ²)	26,76	—	25,88
Нагрузка на 1 см ² подошвы (в г)	23,0	—	34,0
Общая длина черепа	—	66,7	67,5
Основная длина черепа	—	60,7	61,0
Кондилобазальная длина	—	66,5	67,4
Скуловая ширина	—	37,2	39,0
Межглазничная ширина	—	15,7	15,0
Ширина между концами надглазничных отростков	—	20,7	19,5
Заглазничная ширина	—	13,4	14,1
Наибольшая ширина черепа	—	28,0	28,7
Высота в области <i>bullae osseae</i>	—	22,0	23,1
Длина черепной коробки	—	35,7	35,5
Ширина черепа над клыками	—	15,2	15,4
Длина твердого нёба	—	28,7	28,0
Длина задненёбной вырезки	—	8,0	9,4
Поперечный диаметр глазницы	—	10,7	11,0
Длина <i>bullae osseae</i>	—	18,0	19,3
Ширина <i>bullae osseae</i>	—	10,0	9,8
Расстояние между <i>bullae osseae</i>	—	8,0	8,0
Наибольший диаметр наружного слухового отверстия	—	—	3,5
Ширина носового отверстия	—	6,0	7,4
Высота носового отверстия	—	9,0	9,2
Ширина затылочного отверстия	—	8,5	9,0
Высота затылочного отверстия	—	8,0	8,0
Мастоидная ширина	—	32,3	33,2
Длина лицевого отдела	—	35,0	35,0
Длина верхнего ряда зубов	—	19,7	19,8
Длина нижнего ряда зубов	—	23,5	23,5
Длина верхнего хищнического зуба	—	7,4	7,3
Высота верхнего хищнического зуба	—	—	4,2
Длина верхнего коренного зуба	—	6,2	5,8
Ширина верхнего коренного зуба	—	3,2	3,5

Вес и промеры	Дата и место добычи		
	7/V 1953 г. р. Кинза	26/III 1955 г. р. Рыбная	1/IV 1958 г. Красный лес
Наибольшая высота затылочного гребня	-	4,0	3,4
Наибольшая высота сагиттального гребня	-	0,5	1,0
Вес черепа без нижней челюсти	-	10,0	8,7
Вес нижней челюсти	-	3,6	3,8
Объем мозговой капсулы (в см ³)	-	8,5	9,0
Длина os penis	-	-	38,5
Ширина os penis в области прикрепления пещеристого тела	-	-	6,6
Вес os penis	-	-	0,5

Таблица 4

Результаты обработки взрослых кавказских ласок
(линейные промеры указаны в мм, вес — в г)

Вес и промеры	Пол, дата и место добычи		
	Самец, 19/VIII 1954 г., гора Экседзиния	Самец, 1/III 1958 г., окрестность г. Майкона	Самка, 27/VI 1958 г., гора Алоус
Общий вес	114	95,8	86,0
Длина тела	210	280	200
Длина хвоста	52	60	65
Высота уха	14,4	14,0	-
Длина задней ступни	32,0	35,0	26,5
Площадь подошвы передней лапы (в см ²)	-	-	1,70
Площадь подошвы задней лапы (в см ²)	-	-	1,62
Площадь четырех лап (в см ²)	-	-	6,82
Нагрузка на 1 см ² подошвы (в г)	-	-	12,62
Общая длина черепа	38,4	39,0	-
Основная длина черепа	34,8	34,8	-
Кондилобазальная длина	38,4	38,5	-
Скуловая ширина	21,4	20,6	-
Межглазничная ширина	8,2	8,2	-
Ширина между концами межглазничных отростков	11,0	10,9	-
Затылочная ширина	9,2	8,2	-
Наибольшая ширина черепа	18,0	16,8	-
Высота в области bullae osseae	15,0	13,6	-
Длина черепной коробки	23,0	24,0	-
Ширина черепа над клыками	8,5	-	-
Длина твердого пёбба	14,8	14,5	-
Длина задненёбной вырезки	6,2	6,2	-
Поперечный диаметр глазницы	6,3	6,2	-
Длина bullae osseae	12,2	13,0	-
Ширина bullae osseae	7,2	7,0	-
Расстояние между bullae osseae	4,0	4,0	-
Наибольший диаметр наружного слухового отверстия	3,5	3,2	-
Ширина носового отверстия	4,0	4,0	-
Высота носового отверстия	4,5	4,2	-
Ширина затылочного отверстия	7,0	6,6	-
Высота затылочного отверстия	6,5	5,0	-
Мастоидная ширина	18,5	18,7	-
Длина лицевого отдела	15,8	15,0	-
Длина верхнего ряда зубов	10,5	11,0	-
Длина нижнего ряда зубов	12,0	11,6	-
Длина верхнего хищнического зуба	4,0	4,0	-
Высота верхнего хищнического зуба	2,8	2,5	-
Длина верхнего коренного зуба	3,4	3,0	-
Ширина верхнего коренного зуба	1,7	1,5	-
Наибольшая высота затылочного гребня	1,1	1,3	-

Вес и промеры	Под, дата и место добычи		
	Самец, 19/VIII 1951 г., гора Экспедиции	Самец, 11/II 1958 г., окрестность г. Майкона	Самка, 27/VI 1958 г., гора Алоус
Вес черепа без нижней челюсти	1, 2	1, 4	-
Вес нижней челюсти	0, 4	0, 4	-
Объем мозговой капсулы (в см ³)	2, 7	2, 1	-
Вес сердца	-	-	-
Вес легких с трахеей	-	-	0, 7
Вес печени	-	-	-
Вес селезенки	-	-	0, 2
Вес желудка (без содержимого)	-	-	0, 3
Вес двух почек	-	-	0, 2
Длина кишечника	10, 5	8, 0	-
Длина семенников	5, 0	5, 0	-
Ширина семенников	-	-	-
Наличие жировых отложений	-	-	На брюшной железе не- много жира

Таблица 5

Результаты обработки лесных котов-самцов, добытых в Тульском районе
Краснодарского края
(линейные промеры указаны в мм, вес — в г)

Вес и промеры	Возраст и дата добычи животного		
	Взросл., 30 XI 1953 г.	Молод., XII. 1958 г.	Взросл., 15 I 1959 г.
Общий вес	—	2300	5610
Длина тела	650	550	660
Длина хвоста	290	325	385
Высота уха	—	—	69
Длина задней ступни	—	—	160
Площадь подошвы передней лапы (в см ²)	—	—	17,3
Площадь подошвы задней лапы (в см ²)	—	—	18,1
Площадь четырех лап (в см ²)	—	—	70,9
Нагрузка на 1 см ² подошвы (в г)	—	—	80,0
Общая длина черепа	100,0	—	105,4
Основная длина черепа	82,2	—	86,8
Кондилобазальная длина	92,0	—	96,7
Скуловая ширина	71,4	—	73,6
Межглазничная ширина	20,0	—	19,4
Ширина между концами надглазничных отростков	52,3	—	54,0
Заглазничная ширина	33,5	—	34,2
Наибольшая ширина черепа	46,5	—	47,4
Высота в области bullae osscae	45,0	—	46,0
Высота в области processus postorbitalis	39,0	—	38,0
Длина черепной коробки	53,0	—	53,7
Длина среднего шва nasalia	21,5	—	23,8
Наибольшая длина носовых костей	26,4	—	28,3
Ширина средней части ossea nasalia	7,3	—	7,5
Ширина черепа над клыками	24,2	—	26,2
Длина твердого пёба	36,0	—	38,4
Длина заднепёбной вырезки	19,5	—	19,7
Продольный диаметр глазницы	30,0	—	30,0
Поперечный диаметр глазницы	26,0	—	26,0
Ширина между torus infraorbitale	27,1	—	28,5
Длина bullae osseae	23,0	—	23,2
Ширина bullae osseae	14,2	—	14,1
Расстояние между bullae osseae	10,0	—	9,7
Наибольший диаметр наружного слухового отверстия	7,0	—	6,7
Ширина носового отверстия	11,1	—	—
Высота носового отверстия	13,5	—	14,0
Ширина затылочного отверстия	14,0	—	13,0
Высота затылочного отверстия	13,2	—	—
Мастоидная ширина	43,7	—	45,5
Длина лицевого отдела	63,7	—	64,4

Возраст и дата добычи
животного

Вес и промеры	Взросл., 30/XI 1953 г.	Молод., XII, 1958 г.	Взросл., 15/I 1959 г.
Длина верхнего ряда зубов	32,0	—	33,5
Длина нижнего ряда зубов	34,2	—	36,2
Длина верхнего хищнического зуба	12,0	—	12,0
Высота верхнего хищнического зуба	6,6	—	—
Длина заднего коренного зуба	9,3	—	9,0
Высота заднего коренного зуба	7,2	—	—
Наибольшая высота затылочного гребня	4,0	—	6,0
Наибольшая высота сагиттального гребня	2,8	—	3,5
Вес черепа без нижней челюсти	27,40	—	31,37
Вес нижней челюсти	10,85	—	13,67
Объем мозговой капсулы (в см ³)	39,0	—	—
Вес сердца	—	10,0	24,5
Вес легких с трахеей	—	—	57,0
Вес печени	—	—	109
Вес двух почек	—	20,0	54,0
Вес селезенки	—	2,5	8,0
Вес желудка (пустого)	—	24,0	47,5
Вес внутренних жировых отложений	—	100	382
Вес наружных жировых отложений	—	—	430
Длина пищевода	—	—	295
Длина кишечника	—	1340	1500

Таблица 6

Размеры серии из Краснодарского края

Вес (z) и промеры (см)	Самка зрелая (стареющая)	Самка зрелая (молодая)	Самка зрелая (средний возраст)	Самка зрелая (молодая)	Самец зрелый (стареющий)	Самец зрелый (молодой)	Самец зрелый (молодой)
Живой вес	31000	31000	21300	-	-	27400	-
Высота в холке	90	78	73	82	77	81	87
Косая длина туловища	78	70	67	-	-	-	-
Высота в крестце	97	83	75	90	94	90	93,5
Обхват груди за лопатками	83	80	79	-	-	-	-
Ширина в моклоках	29	20	19	-	-	-	-
Боковая длина зада (таза)	12,5	-	10	-	-	-	-
Высота передней ноги до локтя	5,5	5,4	4,9	-	-	-	-
Длина уха	13,5	13	12,5	14	13	13	13
Длина тела	121	119	103	130	118	115	118
Длина хвоста	9	9	9	13	11,5	11	10,5
Обхват пасты	8,5	8,5	8	-	-	-	-
Длина кисти	30	27,5	26	-	-	-	-
Длина переднего пальца	13	12,5	12,5	-	-	-	-
Длина задней ноги	8,3	8,9	8,0	-	-	-	-
Длина стопы	3,8	3,7	3,6	4,0	3,6	3,4	4,0
Длина заднего пальца	13,5	13,5	12	-	-	-	-
Обхват плюсны	10	8,8	8	-	-	-	-
Длина переднего копыта	5,5	6,3	6	-	-	-	-
Высота переднего копыта	4,4	5,3	4,8	-	-	-	-
Толщина переднего копыта	1,9	2,1	1,7/3,6	-	-	-	-
Длина заднего копыта	5,5	5,5	5,7	-	-	-	-

Вес (г) и промеры (см)

Самое большое расстояние (абсолютно) (абсолютно)	Самое расстояние (октавы)	Самое расстояние (четверти)	Самое расстояние (октавы)	Самое расстояние (октавы)	Самое расстояние (октавы)
Высота заднего коныта	4,2	4,6	4,8	4,8	4,7
Толщина заднего коныта	2/4	1,8/3,8	1,5/3,6	1,6/3,6	1,6/3,6
Вес кожи	3100	2400	19000	13000	13000
Вес туши (убойный)	18100	19000	11000	8000	8000
Вес языка	1050	1100	—	—	—
Вес яичника	100	56	43	—	—
Вес сердца	350	195	178	400	400
Вес легких (без трахеи)	550	550	500	600	600
Длина трахеи	29	35	32	—	—
Диаметр трахеи	2	3	2	—	—
Вес печени	—	430	325	600	600
Вес селезенки	150	77	59	—	—
Вес почек	180	59	55	—	—
Вес пищевода	150	32	25	—	—
Вес содержимого желудка	2700	2800	2250	—	—
Длина тонкого кишечника	1300	1250	1280	—	—
Длина толстого кишечника	400	427	427	—	—
Вес тонкого кишечника с содержимым	600	700	700	—	—
Вес толстого кишечника с содержимым	350	700	400	—	—
Вес семеников	50	—	600	5	5
Вес матки	—	61,3	61,0	—	—
Выход мяса в процентах	58,2	61,3	61,0	57,6	57,6

⁴ Вес с эмбрионом.

Таблица 7

Промеры и вес турров, убитых в Кавказском заповеднике

Вес (г) и промеры (см)	Самец взрослый (лекабри)	Самец взрослый (лекабри)	Самец взрослый (февраль)	Самка взрослая	Самка взрослая	Самка в возрасте 10—14 лет
Живой вес	1 397 00	1 235 00	873 00	66 000	—	—
Высота в холке	1 09	1 09	1 01	92	39	—
Косяя длина туловища	1 02	1 12	1 02	96	—	—
Высота в крестце	1 17	1 18	1 08	96,5	—	—
Обхват груди за лопатками	1 34	1 28	—	108	—	—
Ширина в моклонах	3 6	4 2	—	3 2	—	—
Высота передней ноги (до юколы)	6 3	6 6	—	4 9	—	—
Длина уха	1 3 / 1 1	1 4, 5 / 1 3	1 2, 5	1 2 / 1 3	9	5 5
Длина тела	1 7 6	1 8 7	1 6 9	1 4 6	—	—
Длина хвоста	1 6	1 6	1 4	1 2, 5	6, 5	—
Обхват пясти	1 4	1 5	—	1 0	—	—
Длина кисти	3 3	3 3	—	2 4	—	—
Длина переднего пальца	1 3	1 4, 5	—	1 1	—	—
Длина задней ноги	9 3	9 4	1 1	7 8	—	—
Длина стопы	4 1	4 2	3 2	3 3	—	—
Длина заднего пальца	1 5, 5	1 3, 5	—	1 2	—	—
Обхват плоский	1 5	1 6, 5	—	1 1	—	—
Длина переднего копыта	8, 5	9, 2	—	6, 2	—	—
Высота переднего копыта	5, 3	5, 9	—	5, 2	—	—
Толщина переднего копыта	4, 2 / 6, 8	3, 7 / 7, 2	—	2, 7 / 5, 2	—	—
Длина заднего копыта	8	6, 6	—	5, 2	—	—
Высота заднего копыта	5, 2	4, 5	—	4, 0	—	—

Вес (г) и промеры (см)	Самец взрослый (лекабри)	Самец взрослый (февраль)	Самка взрослая	Самка в возрасте 10—14 дней*
Толщина затыка копыта	3,3/6	2,9/6	—	2,1/4,2
Вес кожи	1,600	1,0900	—	4,600
Вес тушки (убойный)	8,3700	7,1700	4,6600	3,2100
Вес головы с языком	1,2200	0,9500	—	2,5000
Вес языка	1,250	2,00	—	1,50
Вес сердца	1,100	0,60	—	3,59
Вес легких без трахеи	2,500	2,009	—	1,900
Длина трахеи	4,4	5,5	—	4,2
Диаметр трахеи	1,700	1,950	—	2
Вес печени	3,80	1,00	—	—
Вес селезенки	3,00	4,00	—	1,00
Вес почек	2,00	2,00	—	2,00
Вес пищевода	1,400	1,3100	—	1,50
Вес соэзкивого жестулка	2,250	2,220	—	1,2500
Длина тонкого кишечника	1,300	1,250	—	2,600
Длина толстого кишечника	1,600	1,000	—	1,050
Вес тонкого кишечника с содержимым	2,800	1,400	—	1,500
Вес толстого кишечника с содержимым	2,00	2,00	—	1,700
Вес соединников	—	—	—	—
Вес матки	2,00	1,00	—	2,00
Вес мочевого пузыря	1,300	1,700	—	1,00
Вес внутреннего жира	5,9, 8	5,8	5,3	10,00
Выход мяса в процентах				48,7

* Промеры брали по живому животному.

О ГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Краткая характеристика природных условий Краснодарского края	5
Промысловые и ценные млекопитающие предгорных и горных районов Краснодарского края.	11
Кроты	—
Бурый медведь	18
Кубанский волк	24
Шакал	31
Кавказская лисица	35
Енотовидная собака	40
Барсук	44
Выдра	49
Кавказская лесная куница	56
Кавказская каменная куница	64
Обыкновенный хорек	68
Степной хорек	70
Норка	—
Горностай	75
Ласка	76
Перевязка	80
Лесной кот	81
Рысь	88
Леопард	99
Енот-полоскун	102
Заяц-русак	105
Белка	111
Соня-подчек	119
Большой тушканчик	125
Слепыш	—
Волянная крыса	126
Обыкновенный хомяк	128
Кабан	—
Косуля	138
Благородный олень	145
Канкизекля серна	161
Западнокавказский тур	172
Зубр	187
Организация охотничьего промысла в Краснодарском крае	191
Спортивное охотничье хозяйство	204
Выводы	207
Литература	219
Приложение (табл. 1—7)	226

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
37	Табл. 5. По всем районам:	362,7	3621, 7
49	5 сверху	гер—	тер—
64	10 сверху	с начала до	с начала марта до . . .
115	1 сверху	Новопрохладное	Ново-Прохладное
128	19 сверху	правилок	правилок
176	4-5 снизу	субальпийского,	субальпийского,
		альпийского и	альпийского и
		субальпийского	субнивального
223	6-7 сверху	Печоро-Ильческий	Печоро-Ильческий